

**Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC)
Cycle 1.2**

Forces canadiennes

Spécifications des variables dérivées (VD)

Table des matières

ÉCHANTILLONNAGE DES FC/VARIABLES DÉRIVÉES (11 VD)	9
1) CATÉGORIES DE STRATIFICATION DES FC UTILISÉES POUR LA SÉLECTION DE L'ÉCHANTILLON	9
2) GRADE DES FC — REGROUPEMENT DES GRADES AU MOMENT DE LA STRATIFICATION	10
3) GRADE DES FC — GRADES REGROUPÉS D'APRÈS LA VARIABLE DE GRADE ALPHABÉTIQUE MISE À JOUR AU MOYEN DES RENSEIGNEMENTS PROVENANT DES NOTES DE L'INTERVIEWEUR.....	11
4) DESCRIPTION ALPHABÉTIQUE DE L'ENVIRONNEMENT DES MEMBRES DES FC MISE À JOUR D'APRÈS TOUT RENSEIGNEMENT OBTENU LORS DE L'EXERCICE DE DÉPISTAGE	13
5) ENVIRONNEMENT DES MEMBRES DES FC CODÉ NUMÉRIQUEMENT.....	13
6) DESCRIPTION ALPHABÉTIQUE DE LA RÉGION GÉOGRAPHIQUE DE LA BASE DU MEMBRE DES CF MISE À JOUR AU MOYEN DE TOUT RENSEIGNEMENT OBTENU DURANT L'EXERCICE DE DÉPISTAGE.....	14
7) RÉGION GÉOGRAPHIQUE DE LA BASE DU MEMBRE DES FC CODÉE NUMÉRIQUEMENT	14
8) LANGUE PRÉFÉRÉE DU MEMBRE DES FC	14
9) GROUPE DE GROUPES PROFESSIONNELS MILITAIRES DES FC.....	15
10) STATUT DE MEMBRE ACTIF DE LA FORCE RÉGULIÈRE DES CF	19
11) TYPE DE FORCE DES FC	19
VARIABLES CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS DE LOGEMENTS ET DE MÉNAGES (6 VD)	20
1) TAILLE DU MÉNAGE	20
2) NOMBRE DE PERSONNES DE MOINS DE 12 ANS DANS LE MÉNAGE.....	20
3) NOMBRE DE PERSONNES DE CINQ ANS OU MOINS DANS LE MÉNAGE.....	21
4) NOMBRE DE PERSONNES DE 6 À 11 ANS DANS LE MÉNAGE.....	21
5) SITUATION DANS LA FAMILLE ÉCONOMIQUE (TYPE DE MÉNAGE)	22
6) MODALITÉS DE VIE DU RÉPONDANT SÉLECTIONNÉ.....	25
VARIABLES SUR LE NIVEAU DE SCOLARITÉ (4 VD)	28
1) PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ – DU RÉPONDANT, 10 NIVEAUX	28
2) PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ – RÉPONDANT, 4 NIVEAUX.....	29
3) PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ – MÉNAGE, 10 NIVEAUX	29
4) PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ – MÉNAGE, 4 NIVEAUX	29
ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL (1 VD)	30
1) AUTO-ÉVALUATION DE LA SANTÉ (ANTÉRIEUREMENT INDICE DE LA DESCRIPTION DE L'ÉTAT DE SANTÉ)	30
FILTRAGE DES RÉPONDANTS EN FONCTION DES TROUBLES (9 VD)	31
1) SATISFACTION DE VIVRE.....	31
2) AUTOÉVALUATION DE LA SANTÉ PHYSIQUE.....	31
3) AUTOÉVALUATION DE LA SANTÉ MENTALE	32
4) FILTRAGE DES RÉPONDANTS – DÉPRESSION.....	32
5) FILTRAGE DES RÉPONDANTS - MANIE	33
6) FILTRAGE DES RÉPONDANTS – TROUBLE PANIQUE.....	33
7) FILTRAGE DES RÉPONDANTS – PHOBIE SOCIALE	34
8) FILTRAGE DES RÉPONDANTS – AGORAPHOBIE	34
9) FILTRAGE DES RÉPONDANTS – TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE.....	35
DÉTRESSE (3 VD)	36
1) ÉCHELLE DE DÉTRESSE – K6.....	36
2) ÉCHELLE DE DÉTRESSE – K10.....	37
3) ÉCHELLE DE CHRONICITÉ DE LA DÉTRESSE ET DE L'AFFAIBLISSEMENT LIÉ À LA DÉTRESSE.....	38

ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR (51 VD).....	39
ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR – AU COURS DE LA VIE	41
1) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 1.....	41
2) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 2.....	42
2a) Symptôme 1 – humeur dépressive.....	42
2b) Symptôme 2 – diminution de l'intérêt ou du plaisir pour la plupart des activités.....	43
2c) Symptôme 3 – perte ou gain de poids significatif ou changement de l'appétit.....	43
2d) Symptôme 4 - insomnie ou hypersomnie.....	44
2e) Symptôme 5 – agitation ou ralentissement psychomoteur	45
2f) Symptôme 6 – fatigue ou perte d'énergie	45
2g) Symptôme 7 – sentiment de dévalorisation.....	45
2h) Symptôme 8 – diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer	46
2i) Symptôme 9 – pensées de mort récurrentes.....	46
Évaluation du critère A, partie 2 :	46
3) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES)	47
4) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C, PARTIE 1	48
5) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C, PARTIE 2.....	48
5a) Perturbation sociale et professionnelle	49
Évaluation du critère C, partie 2:	49
6) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C, (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES).....	50
7) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E, PARTIE 1	51
8) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E, PARTIE 2	51
8a) Pire épisode dépressif de plus de deux mois.....	52
8b) Plus récent épisode dépressif de plus de deux mois	52
8c) Premier épisode dépressif de plus de deux mois.....	53
8d) Un seul épisode dépressif de plus de deux mois au cours des 12 derniers mois	53
8e) Plus récent épisode dépressif de plus de deux mois au cours des 12 derniers mois.....	54
8f) Plus long épisode dépressif de plus de deux mois	54
Évaluation du critère E, partie 2 :	55
9) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E, PARTIE 3	55
9a) Perturbation sociale et professionnelle	55
9b) Altération du fonctionnement.....	56
9c) Préoccupations de dévalorisation.....	57
9d) Idées suicidaires	57
9e) Ralentissement psychomoteur	57
Évaluation du critère E, partie 3 :	58
10) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E (PARTIES 1, 2, ET 3 COMBINÉES).....	59
11) ALGORITHME POUR UN ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE	60
12) DURÉE DU PIRE ÉPISODE DÉPRESSIF (EN ANNÉES)	60
13) DURÉE DE L'ÉPISODE DÉPRESSIF LE PLUS RÉCENT (EN ANNÉES).....	61
14) DURÉE DU PREMIER ÉPISODE DÉPRESSIF (EN ANNÉES)	61
15) DURÉE DE L'UNIQUE ÉPISODE DÉPRESSIF AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (EN ANNÉES).....	62
16) DURÉE DU PREMIER DE PLUSIEURS ÉPISODES DÉPRESSIFS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (EN ANNÉES).....	62
17) DURÉE DE L'ÉPISODE DÉPRESSIF LE PLUS LONG (EN ANNÉES)	63
18) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR — ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION.....	64
19) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR — ÂGE LORS DU PLUS RÉCENT ÉPISODE	64
20) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR – PERSISTANCE DE LA DÉPRESSION (EN ANNÉES).....	65

ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR– 12 DERNIERS MOIS.....	66
21) DÉPRESSION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE A	66
22) L'ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE B	66
23) L'ÉPISODE DÉPRESSIF AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE C	68
24) ALGORITHME POUR UN ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	69
25) PENSÉES SUICIDAIRES AU COURS DE LA VIE	70
26) PENSÉES SUICIDAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	71
27) TENTATIVE DE SUICIDE AU COURS DE LA VIE	71
28) TENTATIVE DE SUICIDE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.....	72
29) TROUBLE ATTRIBUABLE À LA DÉPRESSION – MOYENNE	72
30) INDICATEUR DU TROUBLE ATTRIBUABLE À LA DÉPRESSION MAJEURE.....	73
TROUBLE PANIQUE (36 VD)	75
ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE.....	77
1) ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A	77
2) ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B.....	78
2a) <i>Symptôme 1 – palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque</i>	79
2b) <i>Symptôme 2 – transpiration</i>	79
2c) <i>Symptôme 3 – frémissements ou tremblements</i>	79
2d) <i>Symptôme 4 – sensation de souffle court</i>	80
2e) <i>Symptôme 5 – sensation d'étouffement</i>	80
2f) <i>Symptôme 6 – douleur ou gêne thoracique</i>	80
2g) <i>Symptôme 7 – nausée ou gêne abdominale</i>	81
2h) <i>Symptôme 8 – sensations de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement</i>	81
2i) <i>Symptôme 9 – déréalisation ou dépersonnalisation</i>	81
2j) <i>Symptôme 10 – peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou</i>	82
2k) <i>Symptôme 11 – peur de mourir</i>	82
2l) <i>Symptôme 12 – paresthésie</i>	82
2m) <i>Symptôme 13 – frissons ou bouffées de chaleur</i>	83
2n) <i>Symptôme 14 – bouche sèche</i>	83
<i>Évaluation du critère B d'attaque de panique :</i>	83
3) ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C	84
4) ALGORITHME POUR ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE	85
TROUBLE PANIQUE AU COURS DE LA VIE	86
5) TROUBLE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 1	86
6) TROUBLE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 2	86
6a) <i>Symptôme 1 – crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique</i>	87
6b) <i>Symptôme 2 – préoccupations à propos des implications possibles de l'attaque ou de ses conséquences</i>	87
6c) <i>Symptôme 3 – changement de comportement important en relation aux attaques</i>	88
<i>Évaluation du critère A, partie 2 de trouble panique :</i>	88
7) TROUBLE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES).....	89
8) ALGORITHME POUR LE TROUBLE PANIQUE AU COURS DE LA VIE	90
9) ATTAQUE DE PANIQUE – ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION	91
10) TROUBLE PANIQUE – ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION	92
11) TROUBLE PANIQUE– ÂGE LORS DE LA PLUS RÉCENTE ATTAQUE	92
12) TROUBLE PANIQUE– PERSISTANCE DU TROUBLE PANIQUE	93
ATTAQUE DE PANIQUE – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.....	93
13) ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.....	93

14)	TROUBLE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE A	94
15)	TROUBLE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE B.....	95
16)	TROUBLE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE C	95
17)	ALGORITHME POUR UN TROUBLE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.....	96
18)	TROUBLE ATTRIBUABLE AU TROUBLE PANIQUE – MOYENNE	97
19)	INDICATEUR DU TROUBLE ATTRIBUABLE AU TROUBLE PANIQUE.....	98
PHOBIE SOCIALE (22 VD).....		99
PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE.....		101
1)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 1	101
2)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 2	102
3)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES).....	102
4)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B.....	103
5)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C.....	104
6)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D, PARTIE 1	104
7)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D, PARTIE 2	105
	7a) Variable temporaire.....	105
	7b) Symptômes d'anxiété ou de panique.....	106
	Évaluation du critère D, partie 2 de la phobie sociale au cours de la vie :	106
8)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES).....	107
9)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E	108
	9a) Perturbation sociale et professionnelle	108
	Évaluation du critère E de la phobie sociale au cours de la vie :	108
10)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE F, PARTIE 1.....	109
11)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE F, PARTIE 2.....	110
12)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE F (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES)	111
13)	ALGORITHME POUR LA PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE	112
14)	PHOBIE SOCIALE – ÂGE AU MOMENT DE L'ÉPISODE LE PLUS RÉCENT.....	113
15)	PHOBIE SOCIALE– ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION.....	114
PHOBIE SOCIALE – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS		114
16)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE A.....	114
17)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE B.....	115
18)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE C.....	115
19)	ALGORITHME POUR LA PHOBIE SOCIALE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.....	116
20)	TROUBLE ATTRIBUABLE À LA PHOBIE SOCIALE – MOYENNE	117
21)	INDICATEUR DE LA PERTURBATION ATTRIBUABLE À LA PHOBIE SOCIALE	118
TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (29 VD)		120
TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE - AU COURS DE LA VIE.....		122
1)	TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 1	122
2)	TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 2	123
3)	TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 3	124
4)	TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A (PARTIES 1, 2 ET 3 COMBINÉES)	125
5)	TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B	125
6)	TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C.....	126
7)	TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D DU DSM-IV	126
8)	TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E, PARTIE 1.....	128
9)	TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E, PARTIE 2.....	128
	9a) Perturbation sociale et professionnelle	128

Évaluation du critère E, partie 2:	129
10) TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES).....	130
11) ALGORITHME POUR LE TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DE LA VIE	130
12) DURÉE DU PLUS LONG ÉPISODE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (EN ANNÉES)	131
13) NOMBRE DE MOIS AVEC UN ÉPISODE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (EN ANNÉES)	132
14) DURÉE D'UN ÉPISODE UNIQUE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (EN ANNÉES).....	132
15) DURÉE DU PREMIER DES ÉPISODES D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE SURVENU AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (EN ANNÉES) 133	
16) DURÉE D'UN ÉPISODE UNIQUE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (EN ANNÉES)	133
17) DURÉE DE L'ÉPISODE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE LE PLUS LONG (EN ANNÉES)	134
18) TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE – ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION.....	134
19) TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE - ÂGE AU MOMENT DE L'ÉPISODE LE PLUS RÉCENT	135
20) TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE - PERSISTANCE DE L'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (EN ANNÉES)	136
TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE– 12 MOIS	137
21) TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE A.....	137
22) TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE B.....	137
23) TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE C.....	138
24) ALGORITHME POUR LE TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.....	139
25) PERTURBATION ATTRIBUABLE AU TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE – MOYENNE	140
26) INDICATEUR DE LA PERTURBATION ATTRIBUABLE AU TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE.....	141
ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (26 VD)	143
ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE – AU COURS DE LA VIE	145
1) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE A, PARTIE 1	145
2) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE A, PARTIE 2	146
3) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE A (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES).....	146
4) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE B, PARTIE 1	147
5) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE B, PARTIE 2	148
6) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE B (PARTIES 1, 2 COMBINÉES)	149
7) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE C, PARTIE 1	150
8) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE C, PARTIE 2	151
9) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE C (PARTIES 1, 2 COMBINÉES)	151
10) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE D, PARTIE 1	152
11) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE D, PARTIE 2	153
12) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE D (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES).....	153
13) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE E	154
14) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE – CRITÈRE F.....	155
15) ALGORITHME POUR L'ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DE LA VIE	156
16) DÉLAI ENTRE LE PIRE ÉVÉNEMENT ET LE DÉBUT DES SYMPTÔMES (EN ANNÉES)	157
17) DURÉE DES SYMPTÔMES ASSOCIÉS AU PIRE ÉVÉNEMENT (EN ANNÉES)	157
18) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE – PERSISTANCE DE L'ESPT (EN ANNÉES).....	158
ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE – 12 DERNIERS MOIS	158
19) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS – CRITÈRE A.....	158
20) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS – CRITÈRE B.....	159
21) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS – CRITÈRE C.....	160
22) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS – CRITÈRE D.....	161
23) ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS – CRITÈRE E	162
24) ALGORITHME POUR UN ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE AU COURS DES 12 MOIS DERNIERS MOIS	162

25) TROUBLE ATTRIBUABLE À L'ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (ESPT) – MOYENNE.....	163
26) INDICATEUR DU TROUBLE ATTRIBUABLE À L'ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (ESPT).....	164
CONSOMMATION D'ALCOOL (3 VD).....	166
1) GENRE DE BUVEUR	166
2) CONSOMMATION HEBDOMADAIRE.....	166
3) MOYENNE QUOTIDIENNE DES CONSOMMATIONS D'ALCOOL	167
DÉPENDANCE À L'ALCOOL/ABUS D'ALCOOL (4 VD).....	168
1) ÉCHELLE DE DÉPENDANCE À L'ALCOOL (COTE DU QUESTIONNAIRE ABRÉGÉ) – 12 MOIS.....	169
2) PROBABILITÉ PRÉVUE POUR LES RÉPONDANTS (DÉPENDANCE À L'ALCOOL) – 12 MOIS.....	170
3) TROUBLE CAUSÉ PAR L'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS – MOYENNE	171
4) INDICATEUR DU TROUBLE CAUSÉ PAR LA CONSOMMATION D'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	172
TROUBLES FIGURANT AU DSM EN GÉNÉRAL (6 VD).....	173
1) DIAGNOSTIC AU COURS DE LA VIE – N'IMPORTE QUEL TROUBLE.....	173
2) DIAGNOSTIC AU COURS DE LA VIE – N'IMPORTE QUEL TROUBLE ANXIEUX	174
3) DIAGNOSTIC AU COURS DES 12 MOIS PRÉCÉDENTS – N'IMPORTE QUEL TROUBLE OU N'IMPORTE QUELLE DÉPENDANCE À UNE SUBSTANCE RETENUS.....	174
4) DIAGNOSTIC AU COURS DES 12 MOIS PRÉCÉDENTS – N'IMPORTE QUEL TROUBLE ANXIEUX	175
5) INDICATEUR DE LA PERTURBATION ATTRIBUABLE À N'IMPORTE QUEL TROUBLE OU N'IMPORTE QUELLE DÉPENDANCE À UNE SUBSTANCE RETENUS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	175
6) ÂGE AU MOMENT DE LA PREMIÈRE MANIFESTATION – N'IMPORTE QUEL TROUBLE RETENU.....	176
TROUBLES ALIMENTAIRES (2 VD).....	177
1) COTE SUR L'ÉCHELLE DES ATTITUDES ALIMENTAIRES - MODIFIÉE	177
2) INDICATEUR DE RISQUE DE TROUBLES ALIMENTAIRES - MODIFIÉE	179
LIMITATION DES ACTIVITÉS (4 VD).....	180
1) INCIDENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ.....	180
2) PARTICIPATION ET LIMITATIONS D'ACTIVITÉS	180
3) A BESOIN D'AIDE POUR CERTAINES TÂCHES.....	181
4) DIFFICULTÉS DANS LES SITUATIONS SOCIALES.....	182
INCAPACITÉ AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES (5 VD).....	183
1) NOMBRE TOTAL DE JOURS D'INCAPACITÉ.....	183
2) NOMBRE TOTAL DE JOURS D'ALITEMENT À CAUSE D'UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE	183
3) NOMBRE DE JOURS DE LIMITATION DES ACTIVITÉS À CAUSE D'UN PROBLÈME LIÉ À LA SANTÉ MENTALE.....	184
4) NOMBRE TOTAL DE JOURS EXIGEANT UN EFFORT SUPPLÉMENTAIRE À CAUSE DE PROBLÈMES LIÉS À LA SANTÉ MENTALE	184
5) NOMBRE TOTAL DE JOURNÉES D'INCAPACITÉ À CAUSE DE PROBLÈMES LIÉS À LA SANTÉ MENTALE	185
UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ PAR LES MEMBRES DES FC – SERVICES 1 (7 VD).....	186
1) INDICATEUR DE CONSULTATION D'UN MÉDECIN EN TITRE POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE AU COURS DE LA VIE.....	186
4) INDICATEUR D'UTILISATION DE TOUTE RESSOURCE POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE AU COURS DE LA VIE.....	188
5) NOMBRE DE CATÉGORIES DE RESSOURCES UTILISÉES, AU COURS DE LA VIE, POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE	189
6) INDICATEUR D'UTILISATION DE TOUTE RESSOURCE POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	190
7) NOMBRE DE CATÉGORIES DE RESSOURCES UTILISÉES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE.....	191

UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ PAR LES MEMBRES DES FC – SERVICES 2 (4 VD)	193
1) INDICATEUR PRÉCISANT SI DE L’AIDE A ÉTÉ REÇUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUE.....	193
2) NOMBRE DE TYPES D’AIDE REÇUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUE	194
3) INDICATEUR PRÉCISANT SI DE L’AIDE ÉTAIT NÉCESSAIRE, MAIS N’A PAS ÉTÉ REÇUE, AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUE	195
4) INDICATEUR PRÉCISANT QUE DE L’AIDE A ÉTÉ REÇUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUE, MAIS QU’ELLE N’ÉTAIT PAS SUFFISANTE.....	195
SOUTIEN SOCIAL (4 VD)	197
1) SOUTIEN CONCRET – SOUS-ÉCHELLE MOS	198
2) AFFECTION – SOUS ÉCHELLE MOS	198
3) INTÉRACTION SOCIALE POSITIVE – SOUS-ÉCHELLE MOS	199
4) SOUTIEN ÉMOTIONNEL OU INFORMATIONNEL – SOUS-ÉCHELLE MOS.....	199
CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES (8 VD)	200
1) CODE DU PAYS DE NAISSANCE	200
2) PAYS DE NAISSANCE (VARIABLE GROUPEE)	200
3) ÂGE AU MOMENT DE L’IMMIGRATION.....	201
4) INDICATEUR D’IMMIGRATION	201
5) NOMBRE D’ANNÉES AU CANADA DEPUIS L’IMMIGRATION	202
6) LANGUE(S) PARLÉE(S) PAR LE RÉPONDANT	202
7) ORIGINE CULTURELLE OU RACIALE	205
8) PREMIÈRE LANGUE OFFICIELLE APPRISE ET ENCORE COMPRISE.....	209
FACTEURS DE STRESS CHEZ L’ENFANT ET CHEZ L’ADULTE (1 VD)	213
1) FACTEURS DE STRESS CHEZ L’ENFANT ET CHEZ L’ADULTE	213
POPULATION ACTIVE DES FORCES CANADIENNES (6 VD)	214
1) SITUATION EN REGARD DE L’ACTIVITÉ LA SEMAINE DERNIÈRE (QUESTIONNAIRE COMPLET).....	214
2) PRINCIPALE RAISON POUR NE PAS TRAVAILLER AU COURS DE LA SEMAINE DERNIÈRE	214
3) EMPLOIS MULTIPLES	215
4) NOMBRE TOTAL D’HEURES TRAVAILLÉES PAR SEMAINE	215
5) EMPLOI À TEMPS PLEIN/TEMPS PARTIEL (POUR LE NOMBRE TOTAL D’HEURES HABITUELLES)	216
6) SITUATION AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE	216
STRESS AU TRAVAIL (6 VD)	218
1) ÉCHELLE DE L’INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – LATITUDE DE DÉCISION : DISCRÉTION RELATIVE À LA COMPÉTENCE (APTITUDES REQUISES).....	219
2) ÉCHELLE DE L’INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – LATITUDE DE DÉCISION : POUVOIR DÉCISIONNEL	219
3) ÉCHELLE DE L’INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – DEMANDES PSYCHOLOGIQUES	220
4) ÉCHELLE DE L’INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – MENACE DE PERDRE SON EMPLOI.....	220
5) ÉCHELLE DE L’INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – EXIGENCES PHYSIQUES	221
6) ÉCHELLE DE L’INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – SOUTIEN SOCIAL	221
REVENU (5 VD)	222
1) REVENU TOTAL DU MÉNAGE, DEUX CATÉGORIES	222
2) REVENU TOTAL DU MÉNAGE, QUATRE CATÉGORIES	223
3) REVENU TOTAL DU MÉNAGE, CINQ CATÉGORIES	224
4) REVENU TOTAL DU MÉNAGE, TOUTES PROVENANCES	225
5) REVENU PERSONNEL, TOUTES PROVENANCES	226

ADMINISTRATION (1 VD)	227
1) INTERVIEW EFFECTUÉE AU TÉLÉPHONE OU SUR PLACE	227
ANNEXE 1 - TITRES ET CODES MOC DES GROUPES PROFESSIONNELS MILITAIRES DE LA FORCE RÉGULIÈRE	228
ANNEXE 2 – TITRES ET CODES MOC DES GROUPES PROFESSIONNELS MILITAIRES DE LA RÉSERVE.....	232

Échantillonnage des FC/Variables dérivées (11 VD)

1) Catégories de stratification des FC utilisées pour la sélection de l'échantillon

Nom de la variable : CF_B_STR

Basée sur : Le sexe et le grade de chaque membre du MDN inclus dans les bases de sondage de la Force régulière et de la Réserve (c.-à-d. les recensements distincts de tous les membres de la Force régulière et de la Réserve fournis par le MDN).

Usage antérieur : Aucun

Description : Les membres de la Force régulière et de la Réserve sont classés en cinq strates aux fins de l'échantillonnage, soit trois strates fondées sur le grade pour les hommes et deux strates fondées sur le grade pour les femmes (les catégories de grade 1 et 2 ont été combinées en une seule strate pour les femmes).

Valeur de CF_B_STR	Condition(s)	Explication
1	Sexe = homme et le grade devrait correspondre à ce qui suit : PteB', 'PTEB', 'PTE (B)', 'PteR', 'PTER', 'PTE (R)', 'PteT', 'PTET', 'PTE(T)', 'OS', 'OSB', 'OS(B)', 'OSB', 'OSR', 'AB', 'LS', 'BDR', 'Bdr', 'Cvr', 'Cpl', 'CPL', 'CPL(1)', 'CPL(2)', 'MS', 'MCpl', 'MCPL', 'MCPL(1)', 'MCPL(2)'	Homme MR subalterne
2	Sexe = homme et le grade devrait correspondre à ce qui suit : 'Sgt', 'SGT', 'SGT(1)', 'SGT(2)', 'PO1', 'PO2', 'WO', 'WO(1)', 'WO(2)', 'Adj', 'CPO2', 'MWO', 'MWO(1)', 'MWO(2)', 'CPO1', 'CWO', 'CWO(1)', 'CWO(2)'	Homme MR supérieur
3	Sexe = homme et le grade devrait correspondre à ce qui suit : 'NCDT', 'OCDT', 'A-Slt', 'A/SLT', '2Lt', '2LT', '2LT CFR', 'SLt', 'SLT', 'SLT CFR', 'Lt', 'LT', 'LT (CFR)', 'Lt(N)', 'LT (N)', 'CAPT', 'Capt', 'CAPT', 'LCdr', 'LCDR', 'Maj', 'MAJ', 'Cdr', 'CDR', 'LCol', 'LCOL', 'Capt(N)', 'CAPT (N)', 'Col', 'COL', 'Cmdre', 'CMDRE', 'BGen', 'BGEN', 'RADM', 'RAdm', 'MGen', 'MGEN', 'VAdm', 'VADM', 'LGen', 'LGEN', 'Gen', 'GEN'	Homme officier
4	Sexe = Femme et le grade devrait correspondre à ce qui suit : PteB', 'PTEB', 'PTE (B)', 'PteR', 'PTER', 'PTE (R)', 'PteT', 'PTET', 'PTE(T)', 'OS', 'OSB', 'OS(B)', 'OSB', 'OSR', 'AB', 'LS', 'BDR', 'Bdr', 'Cvr', 'Cpl', 'CPL', 'CPL(1)', 'CPL(2)', 'MS', 'MCpl', 'MCPL', 'MCPL(1)', 'MCPL(2)' ou 'Sgt', 'SGT', 'SGT(1)', 'SGT(2)', 'PO1', 'PO2', 'WO', 'WO(1)', 'WO(2)', 'Adj', 'CPO2', 'MWO',	Femme MR subalterne/supérieur

	'MWO(1)', 'MWO(2)', 'CPO1', 'CWO', 'CWO(1)', 'CWO(2)'	
5	Sexe = Femme et le grade devrait correspondre à ce qui suit : 'NCDT', 'OCDT', 'A-Slt', 'A/SLT', '2Lt', '2LT', '2LT CFR', 'SLt', 'SLT', 'SLT CFR', 'Lt', 'LT', 'LT (CFR)', 'Lt(N)', 'LT (N)', 'CAPT', 'Capt', 'CAPT', 'LCdr', 'LCDR', 'Maj', 'MAJ', 'Cdr', 'CDR', 'LCol', 'LCOL', 'Capt(N)', 'CAPT (N)', 'Col', 'COL', 'Cmdre', 'CMDRE', 'BGen', 'BGEN', 'RADM', 'RAdm', 'MGen', 'MGEN', 'VAdm', 'VADM', 'LGen', 'LGEN', 'Gen', 'GEN'	Femme officier

2) Grade des FC — regroupement des grades au moment de la stratification

Nom de la variable : CF_BDRKS

Basée sur : CF_B_RKS

Usage antérieur : Aucun

Description : Les grades ont été rassemblés en trois groupes aux fins de l'échantillonnage et de la stratification. Pour la stratification, les catégories 1 et 2 ont été combinées pour les femmes. Pour la Force régulière, le grade manquait dans un enregistrement et a été imputé.

Valeur de CF_BDRKS	Condition(s)	Explication
1	PteB', 'PTEB', PTE (B)', 'PteR', 'PTER', 'PTE (R)', 'PteT', 'PTET', 'PTE(T)', 'OS', 'OSB', 'OS(B)', 'OSB', 'OSR', 'AB', 'LS', 'BDR', 'Bdr', 'Cvr', 'Cpl', 'CPL', 'CPL(1)', 'CPL(2)', 'MS', 'MCpl', 'MCPL', 'MCPL(1)', 'MCPL(2)'	Groupe des militaires du rang (MR) subalternes. Englobe les grades allant de SOLDAT (et les équivalents dans d'autres environnements) à CAPORAL-CHEF. Sont inclus : soldat (Sdt), cavalier (cvr), matelot de 3e classe (Mat3), matelot de 2e classe (Mat2), matelot de 1re classe (Mat1), caporal (Cpl), bombardier (bdr), matelot-chef (Matc), caporal-chef (Cplc).
2	'Sgt', 'SGT', 'SGT(1)', 'SGT(2)', 'PO1', 'PO2', 'WO', 'WO(1)', 'WO(2)', 'Adj', 'CPO2', 'MWO', 'MWO(1)', 'MWO(2)', 'CPO1', 'CWO', 'CWO(1)', 'CWO(2)'	Groupe des MR supérieurs. Englobe les grades allant de SERGENT (et les équivalents dans d'autres environnements) à ADJUDANT-CHEF. Sont inclus : sergent(Sgt), maître de 2e classe (M2), maître de 1re classe (M1), adjudant (Adj), premier maître de 2e classe (PM2), adjudant-maître (Adjum), premier maître de 1re classe (PM1), adjudant-chef (Adjuc).
3	'NCDT', 'OCDT', 'A-Slt', 'A/SLT', '2Lt', '2LT', '2LT CFR', 'SLt', 'SLT', 'SLT CFR', 'Lt', 'LT', 'LT (CFR)',	Groupe des OFFICIERS. Englobe les grades allant de ASPIRANT DE MARINE (et les équivalents dans

	'Lt(N)', 'LT (N)', 'CAPT', 'Capt', 'CAPT', 'LCdr', 'LCDR', 'Maj', 'MAJ', 'Cdr', 'CDR', 'LCol', 'LCOL', 'Capt(N)', 'CAPT (N)', 'Col', 'COL', 'Cmdre', 'CMDRE', 'BGen', 'BGEN', 'RADM', 'RAdm', 'MGen', 'MGEN', 'VAdm', 'VADM', 'LGen', 'LGEN', 'Gen', 'GEN'	d'autres environnements) à GÉNÉRAL. Sont inclus : aspirant de marine (Aspm), élève-officier (Élof), enseigne de vaisseau de 2e classe (Ens2), sous-lieutenant (Sit), enseigne de vaisseau de 1re classe (Ens1), lieutenant (Lt), lieutenant de vaisseau (Ltv), capitaine (Capt), capitaine de corvette (Captc), major (Maj), capitaine de frégate (Captf), lieutenant-colonel (Lcol), capitaine de vaisseau (Captv), colonel (Col), commodore (Cmdre), brigadier-général (Bgén), contre-amiral (Cam), major-général (Mgén), vice-amiral (Vam), lieutenant-général (Lgén), amiral (Am), général (Gén).
--	--	--

3) Grade des FC — grades regroupés d'après la variable de grade alphabétique mise à jour au moyen des renseignements provenant des notes de l'intervieweur

Nom de la variable : CF_BDRKU

Basée sur : CF_B_RKU

Usage antérieur : Aucun

Description : Grades rassemblés en trois groupes.

Valeur de CF_BDRKU	Condition(s)	Explication
1	PteB', 'PTEB', PTE (B)', 'PteR', 'PTER', 'PTE (R)', 'PteT', 'PTET', 'PTE(T)', 'OS', 'OSB', 'OS(B)', 'OSB', 'OSR', 'AB', 'LS', 'BDR', 'Bdr', 'Cvr', 'Cpl', 'CPL', 'CPL(1)', 'CPL(2)', 'MS', 'MCpl', 'MCPL', 'MCPL(1)', 'MCPL(2)'	Groupe des militaires du rang (MR) subalternes. Englobe les grades allant de SOLDAT (et les équivalents dans d'autres environnements) à CAPORAL-CHEF. Sont inclus : soldat (Sdt), cavalier (cvr), matelot de 3e classe (Mat3), matelot de 2e classe (Mat2), matelot de 1re classe (Mat1), caporal (Cpl), bombardier (bdr), matelot-chef (Matc), caporal-chef (Cplc).
2	'Sgt', 'SGT', 'SGT(1)', 'SGT(2)', 'PO1', 'PO2', 'WO', 'WO(1)', 'WO(2)', 'Adj', 'CPO2', 'MWO', 'MWO(1)', 'MWO(2)', 'CPO1', 'CWO', 'CWO(1)', 'CWO(2)'	Groupe des MR supérieurs. Englobe les grades allant de SERGENT (et les équivalents dans d'autres environnements) à ADJUDANT-CHEF. Sont inclus : sergent (Sgt), maître de 2e classe (M2), maître de 1re classe (M1), adjudant (Adj), premier maître de 2e classe (PM2), adjudant-maître (Adjum), premier

		maître de 1re classe (PM1), adjudant-chef (Adjuc).
3	'NCDT', 'OCDT', 'A-Slt', 'A/SLT', '2Lt', '2LT', '2LT CFR', 'SLt', 'SLT', 'SLT CFR', 'Lt', 'LT', 'LT (CFR)', 'Lt(N)', 'LT (N)', 'CAPT', 'Capt', 'CAPT', 'LCdr', 'LCDR', 'Maj', 'MAJ', 'Cdr', 'CDR', 'LCol', 'LCOL', 'Capt(N)', 'CAPT (N)', 'Col', 'COL', 'Cmdre', 'CMDRE', 'BGen', 'BGEN', 'RADM', 'RAdm', 'MGen', 'MGEN', 'VAdm', 'VADM', 'LGen', 'LGEN', 'Gen', 'GEN'	<p>Groupe des OFFICIERS. Englobe les grades allant de ASPIRANT DE MARINE (et les équivalents dans d'autres environnements) à GÉNÉRAL.</p> <p>Sont inclus : aspirant de marine (Aspm), élève-officier (Élof), enseigne de vaisseau de 2e classe (Ens2), sous-lieutenant (Slt), enseigne de vaisseau de 1re classe (Ens1), lieutenant (Lt), lieutenant de vaisseau (Ltv), capitaine (Capt), capitaine de corvette (Captc), major (Maj), capitaine de frégate (Captf), lieutenant-colonel (Lcol), capitaine de vaisseau (Captv), colonel (Col), commodore (Cmdre), brigadier-général (Bgén), contre-amiral (Cam), major-général (Mgén), vice-amiral (Vam), lieutenant-général (Lgén), amiral (Am), général (Gén)</p>

4) Description alphabétique de l'environnement des membres des FC mise à jour d'après tout renseignement obtenu lors de l'exercice de dépistage

Nom de la variable : CF_B_ENV

Basée sur : CF_ENVIRONMENT(échantillon) + CF_ENV(dépistage) pour la Force régulière; ENVIR pour la Réserve.

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable, CF_B_ENV, représente une mise à jour, au moyen de tout nouveau renseignement obtenu lors de l'exercice de dépistage des FC, de la variable d'échantillonnage originale ayant trait à l'environnement du membre fournie par le MDN pour la Force régulière. Une classification à trois niveaux est utilisée pour la Force régulière et une classification à quatre niveaux, pour la Réserve.

Valeur de CF_B_ENV	Explication
LAND	Terre (armée de)
AIR	Force aérienne
SEA	Marine
COMM	Communications (Réserve uniquement)
SHR, SRR, N/A	Inconnu (voir CF_BDENV)

5) Environnement des membres des FC codé numériquement

Nom de la variable : CF_BDENV

Basée sur : CF_B_ENV

Usage antérieur : Aucun

Description : Classification à trois niveaux pour la Force régulière, classification à quatre niveaux pour la Réserve. Pour la Force régulière, dans environ 50 enregistrements, la désignation de l'environnement manquait et a dû être imputée au moyen des autres données d'échantillonnage fournies par le MDN. Environ 50 registres avaient des valeurs autres sur le fichier d'échantillon (SHH, SRR, N/A). Ces registres ont été assignés leur environnement basé sur d'autres informations retrouver sur le registre.

Valeur de CF_BDENV	Condition(s)	Explication
1	CF_B_ENV = 'LAND'	Terre (armée de)
2	CF_B_ENV = 'AIR'	Force aérienne
3	CF_B_ENV = 'SEA'	Marine
4	CF_B_ENV = 'COMM'	Communications (Réserve uniquement)
1, 2, 3 ou 4	SHR, SRR, N/A	Environnement assigné basé sur d'autres informations retrouver sur le registre.

6) Description alphabétique de la région géographique de la base du membre des CF mise à jour au moyen de tout renseignement obtenu durant l'exercice de dépistage

Nom de la variable : CF_B_REG

Basée sur : REGION(échantillon) + BASE_REGION(dépistage) pour la Force régulière; REGION pour la Réserve.

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable, CF_B_REG, représente une mise à jour, au moyen de tout nouveau renseignement obtenu lors de l'exercice de dépistage des FC, de la variable d'échantillonnage originale fournie par le MDN pour la Force régulière ayant trait à la région où est située la base du membre. Une classification à quatre niveaux est utilisée pour la Réserve et pour la Force régulière.

Valeur de CF_B_ENV	Explication
Atlantic	Région atlantique
Quebec	Région du Québec
Central	Région du Centre
Western	Région de l'Ouest

7) Région géographique de la base du membre des FC codée numériquement

Nom de la variable : CF_BDREG

Basée sur : CF_B_REG

Usage antérieur : Aucun

Description : Classification géographique à quatre niveaux de la région où est établie la base de l'unité. Pour la Force régulière, la description de la région manquait dans quatre enregistrements et a dû être imputée d'après les autres renseignements d'échantillonnage fournis par le MDN.

Valeur de CF_BDREG	Condition(s)	Explication
1	CF_B_REG = 'ATLANTIC'	Région atlantique
2	CF_B_REG = 'QUEBEC'	Région du Québec
3	CF_B_REG = 'CENTRAL'	Région du Centre
4	CF_B_REG = 'WESTERN'	Région de l'Ouest

8) Langue préférée du membre des FC

Nom de la variable : CF_B_LAN

Basée sur : MOTHER_TONGUE (Force régulière) et LANGUAGE (Réserve)

Usage antérieur : Aucun

Description : Langue préférée du membre telle que figurant dans le fichier d'échantillonnage fourni par le MDN.

Valeur de CF_B_LAN	Condition(s)	Explication
1	MOTHER_TONGUE = English pour régulier ou LANGUAGE = ENGLISH pour réserve	Anglais
2	MOTHER_TONGUE = French pour régulier ou LANGUAGE = FRENCH pour réserve	Français

9) Groupe de groupes professionnels militaires des FC

Nom de la variable : CF_BDOCN

Basée sur : CF_BDMCD.

Usage antérieur : Aucun

Description : GPM regroupés en 12 catégories agrégées. Voir ci-dessous pour la correspondance entre les catégories agrégées et les GPM. Pour la Force régulière, un enregistrement ne contenait pas de renseignements sur la profession et ceux-ci ont dû être imputés d'après les autres renseignements fournis par le MDN.

		Description	
	TITRE	Sous-catégories et codes (officiers)	Sous-catégories et codes (MR)
1	ARMES DE COMBAT	<ul style="list-style-type: none"> • ARME BLINDÉE (21, 21A, 21U, R21, R25) • ARTILLERIE (CAMPAGNE) (22, 22A, 22U, R27) • INFANTERIE (23, 23A, 23U, R23) • GÉNIE (24, 24A, 24U, R24) • ARME BLINDÉE — RECONNAISSANCE (R26) • ARTILLERIE (ANTI-AÉRIENNE) (28, R28) 	<ul style="list-style-type: none"> • HOMME D'ÉQUIPAGE (011, R011) • HOMME D'ÉQUIPAGE (BLINDÉS) (R012) • HOMME D'ÉQUIPAGE (RECONNAISSANCE) (R013) • ARTILLEUR DE CAMPAGNE (021, R021) • ARTILLEUR DE DÉFENSE ANTI-AÉRIENNE (022, R022) • FANTASSIN (031, R031) • SAPEUR (041, R041) • SAPEUR-OPÉRATEUR D'ÉQUIPEMENT (042, R042) • GÉNIE DE COMBAT (043) • POSEUR DE LIGNES (052, R052)
2	COMMUNICATIONS		<ul style="list-style-type: none"> • TECHNICIEN(NE) DE SYSTÈMES D'INFORMATION STRATÉGIQUES (108) • RADIOTÉLÉTYPISTE (211, R214) • TÉLÉTYPISTE (212, R212) • OPÉRATEUR(TRICE) DE TRANSMISSION (215, R215) • TECHNICIEN(NE) DES COMMUNICATIONS (224, R224) • TECHNICIEN(NE) DE SYSTÈMES D'INFORMATION STRATÉGIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉROSPATIALES (226, R226) • TECHNICIEN(NE) DE SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS TERRESTRES (227, R227) • TECHNICIEN(NE)-RADARISTE (231) • CHERCHEUR(EUSE) EN COMMUNICATIONS (291, R291)
3	MARITIME	<ul style="list-style-type: none"> • GÉNIE MARITIME (44, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44U, R44, R44D) • OPÉRATIONS MARITIMES DE SURFACE ET SOUS-MARINES (71, 71A, 71B, 71C, 71D, 71E, 71U, 71Z, R71) • CONTRÔLE NAVAL DE LA NAVIGATION COMMERCIALE (R86, R86A) 	<ul style="list-style-type: none"> • TECHNICIEN(NE) D'ARMES NAVALES (065) • MANŒUVRIER(ÈRE) (181, R181) • PLONGEUR(EUSE) DÉMINEUR(EUSE) (341, R341) • TECHNICIEN(NE) PLONGEUR(EUSE) DÉMINEUR(EUSE) (342)

			<ul style="list-style-type: none"> • PLONGEUR(EUSE) (R345)
4	MARITIME — COMMUNICATIONS		<ul style="list-style-type: none"> • TECHNICIEN(NE) EN OCÉANOGRAPHIE (191, R191) • SIGNALEUR(EUSE) NAVAL(E) (262, R262) • OPÉRATEUR(TRICE) DE CONTRÔLE NAVAL (R263) • OPÉRATEUR(TRICE) DE DÉTECTEURS ACOUSTIQUES (273) • COMMUNICATEUR(TRICE) NAVAL(E) (274, 277, R277) • OPÉRATEUR(TRICE) D'ÉQUIPEMENT D'INFORMATION DE COMBAT (275, R275) • OPÉRATEUR(TRICE) DE DÉTECTEURS ÉLECTRONIQUES (276, R276) • OPÉRATEUR(TRICE) DE DÉTECTEURS ACOUSTIQUES TACTIQUES (278) • ÉLECTRONICIEN(NE) NAVAL(E) (ACOUSTIQUE) (283)
5	MARITIME — SOUTIEN TECHNIQUE		<ul style="list-style-type: none"> • ÉLECTRONICIEN(NE) NAVAL(E) (COMMUNICATIONS) (284, R284) • ÉLECTRONICIEN(NE) NAVAL(E) (TACTIQUE) (285) • ÉLECTRONICIEN(NE) NAVAL(E) (GESTIONNAIRE) (286) • MÉCANICIEN(NE) DE MARINE (312, R312) • TECHNICIEN(NE) DE MÉCANIQUE NAVALE (313, R313) • MAÎTRE MÉCANICIEN(NE) DE MARINE (314, R314, 315, R315) • TECHNICIEN(NE) DE COQUE (321, R321) • ÉLECTRICIEN(NE) DE MARINE (332, R332)
6	AVIATION	<ul style="list-style-type: none"> • NAVIGATEUR(TRICE) AÉRIEN(NE) (31, 31A, 31B, 31D, 31U, R31) • PILOTE (32, 32A, 32U, R32) • CONTRÔLE AÉROSPATIAL (39, 39A, 39U) • GÉNIE AÉROSPATIAL (41, 41A, 41U, R41) • CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (63, R63) • CONTRÔLE DES ARMES AÉRIENNES (64, R64) • OFFICIER MÉCANICIEN DE BORD (65, R65) • MÉTÉOROLOGIE (73, R73) 	<ul style="list-style-type: none"> • OPÉRATEUR(TRICE) DE DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE AÉROPORTÉ (081, 082, R081) • MÉCANICIEN DE BORD (091, R091) • TECHNICIEN(NE) EN MÉTÉOROLOGIE (121, R121) • TECHNICIEN(NE) EN RECHERCHE ET SAUVETAGE (131, R131) • AGENT(E) DE SOUTIEN DE LA FORCE AÉRIENNE (161, 168, 169, 170, R161)
7	AVIATION — SOUTIEN TECHNIQUE		<ul style="list-style-type: none"> • TECHNICIEN(NE) EN DÉFENSE AÉRIENNE (171, R171) • TECHNICIEN(NE) DE MOTEURS D'AVION (511, R511) • TECHNICIEN(NE) EN SYSTÈMES AÉRONAUTIQUES (513, 514, R514)

			<ul style="list-style-type: none"> • TECHNICIEN(NE) EN SYSTÈMES AVIONIQUES (525, 526, R526, R527, R528) • TECHNICIEN(NE) EN IMAGERIE (541, R541) • TECHNICIEN(NE) D'ARMEMENT (AIR) (571) • TECHNICIEN(NE) EN SYSTÈMES D'ARMEMENT (AIR) (572)
8	SERVICES D'ADMINISTRATION/ LOGISTIQUE/ SÉCURITÉ/ RENSEIGNEMENT/ URGENCE	<ul style="list-style-type: none"> • OFFICIER GÉNÉRAL (11,12, R11) • ADMINISTRATION DU PERSONNEL (68, 68U, R68, R68Y) • LOGISTIQUE (69, 69A, 69B, R69, R69A, R69B, R69C, R69D, R69E, R69G, R69H, 78, 78B, 78C, 78D, 78U, R78, R78C) • SÉLECTION DU PERSONNEL (72, R72) • OFFICIER POLICE MILITAIRE (81, 81A, 81U, R81) • RENSEIGNEMENT (82, 82A, R82) • CADETS (R91, R92, R93) • RANGERS CANADIENS (95) • INSTRUCTION (AIR, GÉNIE, TERRE, MER, SPÉCIAL) (98, 98C, 98D, 98E, R98) 	<ul style="list-style-type: none"> • CADET SANS FORMATION (R091) • SPÉCIALISTE DU RENSEIGNEMENT (111, R111) • POMPIER (651, R651) • POLICE MILITAIRE (811, R811) • COMMIS D'ADMINISTRATION (831, R831) • COMMIS DE SOUTIEN À LA GESTION DES RESSOURCES (836, R836) • COMMIS COMPTABLE (841, R841) • CUISINIER(ÈRE) (861, R861) • STEWARD (862) • TECHNICIEN(NE) EN APPROVISIONNEMENT (911, R911) • TECHNICIEN(NE) DE MUNITIONS (921) • TECHNICIEN(NE) DES MOUVEMENTS (933, R933) • CONDUCTEUR(TRICE) DE MATÉRIEL MOBILE DE SOUTIEN (935, R935)
9	GÉNIE	<ul style="list-style-type: none"> • GÉNIE ÉLECTRONIQUE ET DES COMMUNICATIONS (42, 42B, 42C, 42U, R42) • GÉNIE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE — TERRE (43, 43A, 43U, 43Y, R43) • GÉNIE MILITAIRE (45, R45) • GÉNIE DE L'AIR (46, 46A, R46) 	
10	SOUTIEN TECHNIQUE		<ul style="list-style-type: none"> • TECHNICIEN(NE) EN GÉOMATIQUE (142) • ÉLECTRO-TECHNICIEN(NE) (331, R331) • TECHNICIEN(NE) DE VÉHICULES (411, R411) • TECHNICIEN(NE) D'ARMEMENT (terre) (421, R421) • TECHNICIEN(NE) EN SYSTÈMES DE CONDUITE DU TIR (432,433, 434, 435) • TECHNICIEN(NE) DES MATÉRIAUX (441, R441) • TECHNICIEN(NE) EN STRUCTURES D'AÉRONEFS (565, 566, 567, 568, R565)

			<ul style="list-style-type: none"> • TECHNICIEN(NE) EN RÉFRIGÉRATION ET MÉCANIQUE (641, R641) • TECHNICIEN(NE) EN DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (642, R642) • TECHNICIEN(NE) EN GROUPES ÉLECTROGÈNES (643, R643) • TECHNICIEN(NE) EN PLOMBERIE ET CHAUFFAGE (646, R646) • TECHNICIEN(NE) — EAU, PRODUITS PÉTROLIERS ET ENVIRONNEMENT (647, R647) • TECHNICIEN(NE) DE LA CONSTRUCTION (648, R648) • SURVEILLANT-GÉNIE CONSTRUCTION (649, R649)
11	SERVICES MÉDICAUX	<ul style="list-style-type: none"> • ADMINISTRATION DES SERVICES DE SANTÉ (48, 48A, R48) • PHYSIOTHÉRAPIE (49) • ART DENTAIRE (51, 51A, 51B, 51C, 51D, R51) • OPÉRATIONS DES SERVICES DE SANTÉ (52, 52A, R52) • ÉDUCATION PHYSIQUE ET LOISIRS (53, R53) • PHARMACIE (54, 54A, R54) • MÉDECINE (55, 55A, 55B, 55U, R55) • SERVICES PARAMÉDICAUX (56, 56B, 56J, R56) • SOINS INFIRMIERS (57, 57A, 57U, R57) 	<ul style="list-style-type: none"> • ADJOINT(E) MÉDICAL(E) (711, R711) • ADJOINT(E) MÉDICAL(E) — AUXILIAIRE DE BLOC OPÉRATOIRE (713) • TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE MÉDICAL (714, R714, 732, 733, 734, 737) • TECHNICIEN(NE) EN RADIOLOGIE (715, 735) • TECHNICIEN(NE) MÉDICAL(E) SUPÉRIEUR(E) — MÉDECINE PRÉVENTIVE (716) • TECHNICIEN(NE) EN MÉDECINE AÉRONAUTIQUE (717, R717) • TECHNICIEN(NE) EN ÉLECTRONIQUE BIOMÉDICALE (718) • GESTIONNAIRE TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTÉ (719) • AUXILIAIRE DE CLINIQUE DENTAIRE (722, R722) • TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE DENTAIRE (723) • TECHNICIEN(NE) DE MATÉRIEL DENTAIRE (724) • HYGIÉNISTE DENTAIRE (725) • TECHNICIEN(NE) MÉDICAL(E) — MÉDECINE AÉRONAUTIQUE (731, R731) • TECHNICIEN(NE) EN ÉLECTRONIQUE BIOMÉDICAL(E) (736) • TECHNICIEN(NE) DENTAIRE — ADJOINT CLINIQUE DENTAIRE (738) • MONITEUR(TRICE) D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE LOISIRS (851, R851)
12	OFFICIERS GÉNÉRAUX SPÉCIALISTES (OGS)	<ul style="list-style-type: none"> • TRAVAIL SOCIAL (58) • AUMÔNIER (CATHOLIQUE) (59,62,R62) • AUMÔNIER (PROTESTANT) (61, 	<ul style="list-style-type: none"> • STÉNOGRAPHIE JUDICIAIRE (833) • MUSICIEN(NE) (871, R871) • COMMIS DES POSTES (881)

	61A, R61) <ul style="list-style-type: none"> • AFFAIRES PUBLIQUES (66, 66A, R66, R66A) • DROIT (67, 67A, R67) • SÉLECTION DU PERSONNEL (72, 72A, 72U, R72) • DÉVELOPPEMENT DE L'INSTRUCTION (74, 74U, R74) • MUSIQUE (75, R75) • POSTE (76) 	
--	---	--

10) Statut de membre actif de la Force régulière des CF

Nom de la variable : CF_BDPES

Basée sur : PERSONNEL_EMPLOYMENT_STATUS (variable de type alphabétique disponible pour la Force régulière uniquement, ne s'applique pas à la Réserve).

Usage antérieur : Aucun

Description : Statut de membre actif de la Force régulière, tel que figurant dans le fichier d'échantillonnage fourni par le MDN.

Valeur de CF_BDPES	Condition(s)	Explication
1	PERSONNEL_EMPLOYMENT_STATUS = active	Membre actif
2	PERSONNEL_EMPLOYMENT_STATUS = LOA	Absence autorisée

11) Type de force des FC

Nom de la variable : CF_BDFOR

Basée sur : SAMPTYPE

Usage antérieur : Aucun

Description : Le type de force des FC est soit la Force régulière soit la Réserve, mis à jour d'après les renseignements provenant du dépistage et des notes de l'intervieweur.

Valeur de CF_BDFOR	Condition(s)	Explication
2	SAMPTYPE=Regular+Additional info	Force régulière
3	SAMPTYPE=Reserve+Additional info	Réserve

Variables concernant les enregistrements de logements et de ménages (6 VD)

1) Taille du ménage

Nom de la variable : DHHBDHSZ

Basée sur : SAMPLEID, PERSONID

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : DHHADHSZ

ENSP Cycle 4 : DHC0DHSZ

ENSP Cycle 3 : DHC8DHSZ

ENSP Cycle 2 : DHC6DHSZ

ENSP Cycle 1 : DHC4DHSZ

Description : Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans le ménage.

Spécifications techniques : Trier l'ensemble de données de la liste de composition du ménage par SAMPLEID et PERSONID. Donne un compte du nombre de PERSONID dans chaque SAMPLEID.

Valeur de DHHBDHSZ	Condition(s)	Explication
Compter le nombre de PERSONID dans chaque SAMPLEID. (min: 1; max: 40)	Trier le fichier (fichier des membres du ménage) en fonction de SAMPLEID et de PERSONID.	Nombre de personnes dans le ménage.

2) Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHBDL12

Basée sur : PERSONID, DHHB_AGE

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : DHHADL12

ENSP Cycle 4 : DHC0DL12

ENSP Cycle 3 : DHC8DL12

ENSP Cycle 2 : DHC6DL12

ENSP Cycle 1 : DHC4DL12

Description : Cette variable identifie le nombre de personnes qui vivent dans un ménage et qui sont âgées de moins de 12 ans.

Spécifications techniques : Trier l'ensemble de données de la liste de composition du ménage par SAMPLEID et PERSONID. Donne un compte du nombre de PERSONID qui a une valeur DHHB_AGE inférieure à 12 dans chaque SAMPLEID.

Valeur de DHHBDL12	Condition(s)	Explication
Compter le nombre de PERSONID dans chaque SAMPLEID. (min: 0; max: 40)	DHHB_AGE < 12 (fichier des membres du ménage)	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage.

3) Nombre de personnes de cinq ans ou moins dans le ménage

Nom de la variable : DHHBDLE5

Basée sur : PERSONID, DHHB_AGE

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : DHHADLE5

ENSP Cycle 4 : DHC0DLE5

ENSP Cycle 3 : DHC8DLE5

ENSP Cycle 2 : DHC6DLE5

ENSP Cycle 1 : DHC4DLE5

Description : Cette variable identifie le nombre de personnes qui vivent dans un ménage et qui sont âgées de moins de six ans.

Spécifications techniques : Trier l'ensemble de données de la liste de composition du ménage par SAMPLEID et PERSONID. Donne un compte du nombre de PERSONID qui ont une valeur DHHB_AGE de 5 et moins dans le SAMPLEID

Valeur de DHHBDLE5	Condition(s)	Explication
Compter le nombre de PERSONID dans chaque SAMPLEID. (min: 0; max: 40)	DHHB_AGE <= 5 (fichier des membres du ménage)	Nombre de personnes de moins de 5 ans dans le ménage.

4) Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage

Nom de la variable : DHHBD611

Basée sur : PERSONID, DHHB_AGE

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : DHHAD611

ENSP Cycle 4 : DHC0D611

ENSP Cycle 3 : DHC8D611

ENSP Cycle 2 : DHC6D611

ENSP Cycle 1 : DHC4D611

Description : Cette variable identifie le nombre de personnes qui vivent dans un ménage dont l'âge se situe entre 6 et 11 ans.

Spécifications techniques : Trier l'ensemble de données de la liste de composition du ménage par SAMPLEID et PERSONID. Donne un compte du nombre de PERSONID qui ont une valeur DHHB_AGE de 6 à 11 dans chaque SAMPLEID.

Valeur de DHHBD611	Condition(s)	Explication
Compter le nombre de PERSONID dans chaque SAMPLEID. (min: 0; max: 40)	6 <= DHHB_AGE <= 11 (fichier des membres du ménage)	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage.

5) Situation dans la famille économique (type de ménage)

Nom de la variable : DHHBDECF

Basée sur : RE_REL pour toutes PERSONID dans SAMPLEID, DHHB_AGE, DHHB_SEX, DHHBDHSZ

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : DHHADECF

ENSP Cycle 4 : DHC0DECF

ENSP Cycle 3 : DHC8DECF

ENSP Cycle 2 : DHC6DECF

ENSP Cycle 1 : DHC4DECF

Description : Cette variable indique les liens familiaux au sein du ménage et est recueillie au moyen d'un ensemble de codes de liens qui définissent un lien entre chaque membre d'un ménage. Tous les liens dans chaque échantillon (les rapports que chaque personne dans un ménage entretient avec les autres membres du ménage) sont utilisés dans le calcul de cette variable. La variable se fonde sur l'âge et le lien déclarés de chaque personne par rapport aux autres membres du ménage. La matrice des codes de liens ne figure pas dans le fichier maître.

Reformatages temporaires

Reformatage		Explication
CODES DES LIENS : (*d'après le fichier des liens)		Codes des liens utilisés.
CODES	CATÉGORIE	
A0	Conjoint/conjointe	
B0	Conjoint de fait	
C0	Conjoint de même sexe	
D1	Père/mère biologique	
D2	Père/mère par alliance	
D3	Père/mère adoptif	
E1	Fille/fils biologique	
E2	Beau-fils/belle-fille	
E3	Fils/fille adoptée	
F1	Sœur/frère	
F2	Demi-sœur/demi-frère	
F3	Demi-sœur/demi-frère par alliance	
F4	Sœur/frère adopté	
F5	Sœur/frère de famille d'accueil	
G0	Parent de famille d'accueil	
H0	Enfant en famille d'accueil	
I0	Grands-parents	
J0	Petits-enfants	
K0	Beaux-parents	
L0	Autre lien	
Y1	Célibataire	
Z0	Aucun lien	
A=(Parent)	D1, D2, D3	Codes temporaires pour comprimer les liens.
L=(Autre)	F1, F2, F3, F4, F5*, G0*, H0*, I0, J0, K0, L0, Z0	
M=(Enfant)	E1, E2, E3 (trié selon l'âge)	
X=(Conjoint)	A0, B0, C0	
Y=(Célibataire)	Y1	
Z=(Non déclaré)	ND	

* Tous les liens d'une famille d'accueil (sœur/frère, parent ou enfant) ont été codés de nouveau sous Autre lien.

Valeur de DHHBDECf	Condition(s)	Explication
ND	Tout RE_REL = Z	Non déclaré
1	DHHBDHSZ = 1	Personne sans lien Personne sans lien vivant seule. Taille du ménage = 1.
2	Tout RE_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID dans (L,Y)	Personne sans lien vivant avec d'autres. Personnes sans lien vivant ensemble. Il ne peut y avoir aucune relation matrimoniale, d'union de fait ou parentale, mais d'autres liens, comme des liens fraternels, sont permis.
3	DHHBDHSZ = 2 et RE_REL pour les deux PERSONID dans SAMPLEID = X	Couple seul Marié ou en union de fait, sans enfants à charge. Aucun autre lien n'est permis. Taille du ménage = 2.
4	DHHBDHSZ > 2 et au moins deux PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un RE_REL = X et RE_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID <> A et M	Couple sans enfants à charge, autres Marié ou en union de fait, sans enfants à charge. Il ne peut y avoir aucun lien de parent/enfants. D'autres liens sont permis.
5	DHHBDHSZ > 2 et au moins deux PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un RE_REL = X et au moins un doit avoir un RE_REL = A. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là au moins un est DHHB_AGE < 25	Couple avec enfant(s) à charge de moins de 25 ans Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent de l'enfant à charge. Aucun autre lien n'est permis.
6	DHHBDHSZ > 2 et au moins deux PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un RE_REL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un RE_REL = A. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir un RE_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un est DHHB_AGE < 25	Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres Au moins l'un des partenaires doit être le parent d'un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage. D'autres liens sont permis.
7	DHHBDHSZ > 2 et au moins deux PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un RE_REL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un RE_REL = A. Tous les autres PERSONID dans	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants ont 25 ans et plus. Aucun autre lien n'est permis.

	SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là DHHB_AGE >= 25	
8	DHHBDHSZ > 2 et au moins deux PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un RE_REL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un RE_REL = A. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = M avec les PERSONID ci- dessus et de ceux-ci DHHB_AGE >= 25	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants ont 25 ans et plus. D'autres liens sont permis.
9	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = F. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là au moins un DHHB_AGE < 25	Mère seule avec enfant(s) de moins 25 ans Un enfant doit avoir moins de 25 ans. Aucun autre lien n'est permis.
10	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = F. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = M avec le PERSONID ci- dessus et de ceux-là au moins un DHHB_AGE < 25.	Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres Un enfant doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens sont permis.
11	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = F. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là DHHB_AGE >= 25	Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. Aucun autre lien n'est permis.
12	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = F. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = M avec le PERSONID ci- dessus et de ceux-là DHHB_AGE >= 25.	Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres. Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens sont permis.
13	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = M. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là au moins un DHHB_AGE < 25	Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans. Un enfant doit avoir moins de 25 ans. Aucun autre lien n'est permis.

14	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = M. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un DHHB_AGE < 25.	Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres Un enfant doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens sont permis.
15	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = M. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là DHHB_AGE >= 25	Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. Aucun autre lien n'est permis.
16	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = M. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là DHHB_AGE >= 25.	Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens sont permis.
17	Autre	Autres types de famille Tous les autres types de ménage.

6) Modalités de vie du répondant sélectionné

Nom de la variable : DHHBDLVG

Basée sur : RE_REL du répondant sélectionné seulement

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : DHHADLVG

ENSP Cycle 4 : DHC0DLVG

ENSP Cycle 3 : DHC8DLVG

ENSP Cycle 2 : DHC6DLVG

ENSP Cycle 1 : DHC4DLVG

Description : Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage et est recueillie au moyen d'un ensemble de codes de liens qui établissent un lien entre chaque personne du ménage. Toutes les relations avec le répondant sélectionné dans chaque échantillon (la relation qu'entretient le répondant sélectionné avec tous les autres membres du ménage) sont utilisées dans le calcul de cette variable.

Reformatages temporaires

Reformatage		Explication
CODES DES LIENS : (*d'après le fichier des liens)		Codes des liens utilisés.
CODES	CATÉGORIE	
A0	Conjoint/conjointe	
B0	Conjoint de fait	
C0	Conjoint de même sexe	
D1	Père/mère biologique	
D2	Père/mère par alliance	
D3	Père/mère adoptif	
E1	Fille/fils biologique	
E2	Beau-fils/belle-fille	
E3	Fils/fille adoptée	
F1	Sœur/frère	
F2	Demi-sœur/demi-frère	
F3	Demi-sœur/demi-frère par alliance	
F4	Sœur/frère adopté	
F5	Sœur/frère de famille d'accueil	
G0	Parent de famille d'accueil	
H0	Enfant en famille d'accueil	
I0	Grand-parent	
J0	Petit-enfant	
K0	Beau-parent	
L0	Autre lien	
Y1	Célibataire	
Z0	Aucun lien	
A1=(Parent)	D1, D2, D3	Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens.
B1=(Enfant)	E1, E2, E3	
C1=(Frère/sœur)	F1, F2, F3, F4	
K1=(Autre lien de parenté)	I0, J0, K0, L0	
L1=(Aucun lien de parenté)	F5*, G0*, H0*, Z0	
X1=(conjoint(e)/partenaire)	A0, B0, C0	
Z1=(Non déclaré)	ND	

* Tous les liens d'une famille d'accueil (sœur/frère, parent ou enfant) ont été codés de nouveau sous Aucun lien.

Valeur de DHHBDLVG	Condition(s)	Explication
ND	Tout RE_REL = Z1	Non déclaré
1	DHHBDHSZ = 1	Personne sans lien vivant seule Le répondant sélectionné vit seul. Taille du ménage = 1.
2	Tous les RE_REL <> X1 et A1	Personne sans lien vivant avec d'autres Le répondant sélectionné vit avec d'autres personnes. Il ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d'union de fait ou parental, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels, sont permis.
3	DHHBDHSZ = 2, et RE_REL = X1	Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire

		Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire uniquement. Taille du ménage = 2.
4	DHHBDHSZ > 2 et un RE_REL = X1 et tous les autres RE_REL = A1	Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et des enfants Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants.
5	Tous les RE_REL = A1	Parent seul vivant avec enfant(s) Le répondant sélectionné vit avec un ou des enfants. Aucun autre lien n'est permis.
6	DHHBDHSZ = 2 et RE_REL = B1	Enfant vivant avec un parent seul Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul. Taille du ménage = 2.
7	DHHBDHSZ > 2 et un RE_REL = B1 et tous les autres RE_REL = C1	Enfant vivant avec un parent seul et des frères et(ou) des sœurs Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul et des frères et(ou) des sœurs.
8	DHHBDHSZ = 3 et tous RE_REL = B1	Enfant vivant avec deux parents Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents. Taille du ménage = 3.
9	DHHBDHSZ > 3 et deux RE_REL = B1 et tous les autres RE_REL = C1	Enfant vivant avec deux parents et des frères et(ou) des sœurs Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents et des frères et(ou) des sœurs.
10	Autre	Autres Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici.

Variables sur le niveau de scolarité (4 VD)

1) Plus haut niveau de scolarité – du répondant, 10 niveaux

Nom de la variable : EDUBDR10

Basée sur : EDUB_1, EDUB_2, EDUB_3, EDUB_4

Usage Antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : EDUADR10

Description : La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

Valeur de EDUBDR10	Condition(s)	Explication
1	EDUB_1 = 1 et EDUB_3 = 2	Huitième année ou moins (Québec : deuxième secondaire ou moins)
2	EDUB_1 = 2 et EDUB_3 = 2	Neuvième ou dixième année (QC : troisième ou quatrième secondaire; TN : première année du secondaire)
3	EDUB_1 = 3 et EDUB_2 = 2 et EDUB_3 = 2	Onzième à treizième années (QC : cinquième secondaire; TN : deuxième à quatrième années du secondaire)
4	EDUB_2 = 1 et EDUB_3 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire
5	EDUB_4 = 1	Études postsecondaires partielles
6	EDUB_4 = 2	Certificat commercial ou diplôme d'une école de métiers ou formation d'apprenti
7	EDUB_4 = 3	Diplôme ou certificat d'un collège communautaire, CEGEP, école de nursing, etc.
8	EDUB_4 = 4	Certificat universitaire inférieur au baccalauréat
9	EDUB_4 = 5	Baccalauréat
10	EDUB_4 = 6	Grade/certificat d'études supérieures
ND	[(EDUB_1 = NSP, R, ND) et EDUB_2 = 2] ou (EDUB_2 = NSP, R, ND) ou (EDUB_3 = NSP, R, ND) ou (EDUB_4 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Plus haut niveau de scolarité – répondant, 4 niveaux

Nom de la variable : EDUBDR04

Basée sur : EDUB_1, EDUB_2, EDUB_3, EDUB_4

Usage Antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : EDUADR04

Description : La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

Valeur de EDUBDR04	Condition(s)	Explication
1	[(EDUB_1 = 1, 2) ou EDUB_2 = 2] et EDUB_3 = 2	Études secondaires partielles
2	EDUB_2 = 1 et EDUB_3 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire
3	EDUB_4 = 1	Études postsecondaires partielles
4	2 <= EDUB_4 <= 6	Grade/diplôme d'études postsecondaires
ND	(EDUB_2 = NSP, R, ND) ou (EDUB_3 = NSP, R, ND) ou (EDUB_4 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

3) Plus haut niveau de scolarité – ménage, 10 niveaux

Nom de la variable : EDUBDH10

Basée sur : EDUBDR10 pour chaque membre du ménage.

Usage Antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : EDUADH10

Description: La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

Spécifications techniques : Établir temporairement EDUBDR10 pour chaque membre du ménage (tous PERSONID dans SAMPLEID). Comparer les valeurs de EDUBDR10 dans le ménage et donner la valeur supérieure. Si un PERSONID a EDUBDR10 de ND (non déclaré), donner ND. Si tous les EDUBDR10 sont SO (sans objet), alors donne SO.

4) Plus haut niveau de scolarité – ménage, 4 niveaux

Nom de la variable : EDUBDH04

Basée sur : EDUBDR04 pour chaque membre du ménage.

Usage Antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : EDUADH04

Description: La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

Spécifications techniques : Établir temporairement EDUBDR04 pour chaque membre du ménage (tous PERSONID dans SAMPLEID). Comparer ces valeurs de EDUBDR04 dans le ménage et donner la valeur supérieure. Si un PERSONID a EDUBDR04 de ND (non déclaré), donner ND. Si tous les EDUBDR04 sont SO (sans objet), alors donne SO.

État de santé général (1 VD)

1) Auto-évaluation de la santé (antérieurement Indice de la description de l'état de santé)

Nom de la variable : GENBDHDI

Basée sur : GENB_01

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : GENADHDI

ENSP Cycle 4 : GHC0DHDI

ENSP Cycle 3 : GHC8DHDI

ENSP Cycle 2 : GHC6DHDI

ENSP Cycle 1 : GHC4DHDI

Description : La variable décrit l'état de santé du répondant d'après son propre jugement. Une cote élevée indique qu'il a évalué positivement son propre état de santé.

Valeur de GENBDHDI	Condition(s)	Explication
ND	GENB_01 > 6	Inconnue
0	GENB_01 = 5	Mauvaise
1	GENB_01 = 4	Passable
2	GENB_01 = 3	Bonne
3	GENB_01 = 2	Très bonne
4	GENB_01 = 1	Excellente

Filtrage des répondants en fonction des troubles (9 VD)

Cette enquête évalue cinq troubles mentaux : l'épisode dépressif majeur, la phobie sociale, le trouble panique, le trouble d'anxiété généralisée, et l'état de stress post-traumatique. Afin de réduire le fardeau de réponse, les modules sur l'épisode dépressif majeur, la phobie sociale, le trouble panique, et le trouble d'anxiété généralisée sont précédés d'une « section-filtre » qui comprend des « questions-filtres » correspondant à chacun de ces troubles. Les répondants qui ont fourni des réponses négatives aux « questions-filtres » ne se sont pas fait poser la liste complète des questions associées aux modules correspondants. Ces répondants ont été exclus du ou des modules en question sur la base de leurs réponses aux « questions-filtres » puis, en conséquence, ont été classés comme ne répondant pas aux critères du ou des troubles en question. Les variables créées ici indiquent si le répondant, sur la base de ses réponses aux « questions-filtres », a été dirigé ou non vers chacun de ces modules sur les troubles de santé mentale. En plus de ces « questions-filtres », il y a plusieurs questions qui évaluent l'état de santé général du répondant ainsi que sa satisfaction à l'égard de la vie.

1) Satisfaction de vivre

Nom de la variable : SCRBDSAT

Basée sur : SCRB_01

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit la satisfaction du répondant face à la vie en général. Des scores plus élevés signalent une plus grande satisfaction.

Valeur de SCRBDSAT	Condition(s)	Explication
1	SCRB_01 = 5	Très insatisfait
2	SCRB_01 = 4	Insatisfait
3	SCRB_01 = 3	Ni satisfait ni insatisfait
4	SCRB_01 = 2	Satisfait
5	SCRB_01 = 1	Très satisfait
ND	(SCRB_01 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2) Autoévaluation de la santé physique

Nom de la variable : SCRBDPHY

Basée sur : SCRB_081

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit la santé physique du répondant selon ses propres déclarations. Des scores plus élevés signalent une meilleure santé.

Valeur de SCRBDPHY	Condition(s)	Explication
0	SCRB_081 = 5	Mauvaise
1	SCRB_081 = 4	Passable
2	SCRB_081 = 3	Bonne
3	SCRB_081 = 2	Très bonne
4	SCRB_081 = 1	Excellente
ND	(SCRB_081 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

3) Autoévaluation de la santé mentale

Nom de la variable : SCRBDMEN

Basée sur : SCRB_082

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit la santé mentale du répondant selon ses propres déclarations. Des scores plus élevés signalent une meilleure santé.

Valeur de SCRBDMEN	Condition(s)	Explication
0	SCRB_082 = 5	Mauvaise
1	SCRB_082 = 4	Passable
2	SCRB_082 = 3	Bonne
3	SCRB_082 = 2	Très bonne
4	SCRB_082 = 1	Excellente
ND	(SCRB_082 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

4) Filtrage des répondants – Dépression

Nom de la variable : SCRBFDEP

Basée sur : SCRB_21, SCRB_22, SCRB_23

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module de la dépression.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBFDEP	Condition(s)	Explication
1	SCRB_21 = 1 ou SCRB_22 = 1 ou SCRB_23 = 1	Répondant retenu pour le module de la dépression.
2	SCRB_21 = 2 et SCRB_22 = 2 et SCRB_23 = 2	Répondant non retenu pour le module de la dépression.
ND	(SCRB_21 = NSP, R, ND) ou (SCRB_22 = NSP, R, ND) ou (SCRB_23 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Filtrage des répondants - Manie

Nom de la variable : SCRBFMIA

Basée sur : SCRB_24, SCRB_25, SCRB_25A

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module de la manie. Il est à noter que la présente enquête ne comprend pas de module sur la manie.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBFMIA	Condition(s)	Explication
1	SCRB_24 = 1 ou SCRB_25A = 1	Répondant retenu pour le module de la manie.
2	(SCRB_24 = 2 et SCRB_25 = 2) ou (SCRB_24 = 2 et SCRB_25A = 2)	Répondant non retenu pour le module de la manie.
ND	(SCRB_24 = NSP, R, ND) ou (SCRB_25 = NSP, R, ND) ou (SCRB_25A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

6) Filtrage des répondants – Trouble panique

Nom de la variable : SCRBFPAD

Basée sur : SCRB_20, SCRB_20A

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module du trouble panique.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBFPAD	Condition(s)	Explication
1	SCRB_20 = 1 ou SCRB_20A = 1	Répondant retenu pour le module du trouble panique.
2	SCRB_20 = 2 et SCRB_20A = 2	Répondant non retenu pour le module du trouble panique.
ND	(SCRB_20 = NSP, R, ND) ou (SCRB_20A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

7) Filtrage des répondants – Phobie sociale

Nom de la variable : SCRBF SOP

Basée sur : SCR B_29A, SCR B_291, SCR B_292, SCR B_293

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module de la phobie sociale.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBF SOP	Condition(s)	Explication
1	SCR B_291 = 1 et (SCR B_292 = 1 ou SCR B_293 = 1)	Répondant retenu pour le module de la phobie sociale.
2	SCR B_29A = 2 ou SCR B_291 = 2 ou (SCR B_292 = 2 et SCR B_293 = 2)	Répondant non retenu pour le module de la phobie sociale.
ND	(SCR B_29A = NSP, R, ND) ou (SCR B_291 = NSP, R, ND) ou (SCR B_292 = NSP, R, ND) ou (SCR B_293 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8) Filtrage des répondants – Agoraphobie

Nom de la variable : SCRBF AGP

Basée sur : SCR B_30

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module de l'agoraphobie. Il est à noter que la présente enquête ne comprend pas de module sur l'agoraphobie.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBF AGP	Condition(s)	Explication
1	SCR B_30 = 1	Répondant retenu pour le module de l'agoraphobie.
2	SCR B_30 = 2	Répondant non retenu pour le module de l'agoraphobie.
ND	(SCR B_30 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

9) Filtrage des répondants – Trouble d’anxiété généralisée

Nom de la variable : SCRBFAD

Basée sur : SCRB_26, SCRB_26A, SCRB_26B

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module du trouble d’anxiété généralisée.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBFAD	Condition(s)	Explication
1	SCRB_26 = 1 ou SCRB_26A = 1 ou SCRB_26B = 1	Répondant retenu pour le module du trouble d’anxiété généralisée.
2	SCRB_26 = 2 et SCRB_26A = 2 et SCRB_26B = 2	Répondant non retenu pour le module du trouble d’anxiété généralisée.
ND	(SCRB_26 = NSP, R, ND) ou (SCRB_26A = NSP, R, ND) ou (SCRB_26B = NSP, R, ND)	Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Détresse (3 VD)

Les questions et les cotes utilisées pour calculer l'échelle de détresse s'appuient sur les travaux de Kessler et Mroczek (de l'Université du Michigan). L'indice se fonde sur un sous-ensemble de questions de la « Composite International Diagnostic Interview » (CIDI). La CIDI est un instrument de diagnostics structuré qui a été conçu pour produire des diagnostics conformes aux définitions et critères du DSM-III-R et des critères diagnostiques pour la recherche de la Classification internationale des maladies, 10e révision (CIM-10). La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

Le DSM réfère au Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders utilisé par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux internationalement reconnue qui existe en plusieurs versions.

Les troubles ou problèmes mentaux que l'on trouve dans l'ESCC sont partiellement opérationnalisés selon les définitions et les classifications du DSM-IV et DSM-III-R.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si DISB_10A <= 5 alors DISRQ01A = 5 – DISB_10A Si DISB_10B <= 5 alors DISRQ01B = 5 – DISB_10B Si DISB_10C <= 5 alors DISRQ01C = 5 – DISB_10C Si DISB_10D <= 5 alors DISRQ01D = 5 – DISB_10D Si DISB_10E <= 5 alors DISRQ01E = 5 – DISB_10E Si DISB_10F <= 5 alors DISRQ01F = 5 – DISB_10F Si DISB_10G <= 5 alors DISRQ01G = 5 – DISB_10G Si DISB_10H <= 5 alors DISRQ01H = 5 – DISB_10H Si DISB_10I <= 5 alors DISRQ01I = 5 – DISB_10I Si DISB_10J <= 5 alors DISRQ01J = 5 – DISB_10J	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions DISB_10A à DISB_10J de 1 à 5, à 4 à 0 de sorte que 0 = jamais, et 4 = tout le temps.

1) Échelle de détresse – K6

Nom de la variable : DISBDK6

Basée sur : DISB_10B, DISB_10D, DISB_10E, DISB_10H, DISB_10I, DISB_10J

Usage Antérieur :

ESCC cycle 1.1 : DISADDS

ENSP cycle 4 : MHC0DDS

ENSP cycle 3 : MHC8DDS

ENSP cycle 2 : MHC6DDS

ENSP cycle 1 : MHC4DDS (*antérieurement DVMHDS94*)

Description : La variable qui suit détermine le niveau de détresse du répondant sur une échelle à six questions. La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

Nota : DISBDK6 est identique à l'échelle de détresse utilisée dans les enquêtes précédentes de l'ESCC 1.1 et l'ENSP. La variable a été renommée pour la distinguer de la variable K10.

Site Internet : « National Comorbidity Survey » : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/

« Composite International Diagnostic Interview » (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Valeur de DISBDK6	Condition(s)	Explication
ND	(DISB_10B = NSP, R, ND) ou (DISB_10D = NSP, R, ND) ou (DISB_10E = NSP, R, ND) ou (DISB_10H = NSP, R, ND) ou (DISB_10I = NSP, R, ND) ou (DISB_10J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
DISRQ01B + DISRQ01D + DISRQ01E + DISRQ01H +	(DISRQ01B <= 4) et (DISRQ01D <= 4) et	Résultat obtenu par le répondant sur l'échelle de détresse - K6. La

DISRQ01I + DISRQ01J (min : 0; max : 24)	(DISRQ01E <= 4) et (DISRQ01H <= 4) et (DISRQ01I <= 4) et (DISRQ01J <= 4)	détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.
--	---	--

2) Échelle de détresse – K10

Nom de la variable : DISBDDSX

Basée sur : DISB_10A, DISB_10B, DISB_10C, DISB_10D, DISB_10E, DISB_10F, DISB_10G, DISB_10H, DISB_10I, DISB_10J

Usage antérieur : Aucun

Description : La variable qui suit détermine le niveau de détresse du répondant sur une échelle de dix questions. La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

Nota : DISBDDSX est similaire à l'échelle de détresse de l'ESCC 1.1 et les enquêtes antérieures de l'ENSP. Cette variable dérivée est fondée sur dix questions et est connue sous le nom de K10.

Site Internet : « National Comorbidity Survey » : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/

« Composite International Diagnostic Interview » (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Valeur de DISBDDSX	Condition(s)	Explication
ND	(DISB_10A = NSP, R, ND) ou (DISB_10B = NSP, R, ND) ou (DISB_10C = NSP, R, ND) ou (DISB_10D = NSP, R, ND) ou (DISB_10E = NSP, R, ND) ou (DISB_10F = NSP, R, ND) ou (DISB_10G = NSP, R, ND) ou (DISB_10H = NSP, R, ND) ou (DISB_10I = NSP, R, ND) ou (DISB_10J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
DISRQ01A + DISRQ01B + DISRQ01C + DISRQ01D + DISRQ01E + DISRQ01F + DISRQ01G + DISRQ01H + DISRQ01I + DISRQ01J (min : 0; max : 40)	DISRQ01A <= 4 et DISRQ01B <= 4 et DISRQ01C <= 4 et DISRQ01D <= 4 et DISRQ01E <= 4 et DISRQ01F <= 4 et DISRQ01G <= 4 et DISRQ01H <= 4 et DISRQ01I <= 4 et DISRQ01J <= 4	Résultat obtenu par le répondant sur l'échelle de détresse - K10. La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

3) Échelle de chronicité de la détresse et de l'affaiblissement lié à la détresse

Nom de la variable : DISBDCHR

Basée sur : DISB_10K, DISB_10L, DISB_10M

Usage Antérieur :

ESCC cycle 1.1 : DISADCH

ENSP cycle 4 : MHC0DCH

ENSP cycle 3 : MHC8DCH

ENSP cycle 2 : MHC6DCH

ENSP cycle 1 : MHC4DCH (*antérieurement DVMHCH94*)

Description : Les variables DISB_10K, DISB_10L et DISB_10M, qui évaluent la chronicité de la détresse et de l'affaiblissement lié à la détresse au cours du derniers mois, sont appariées avec le résultat obtenu par le répondant sur l'échelle de détresse (DISB_10A, DISB_10B, DISB_10C, DISB_10D, DISB_10E, DISB_10F, DISB_10G, DISB_10H, DISB_10I, DISB_10J).

Nota : Cette variable a la même opérationnalisation que la variable DISADCH de l'ESCC 1.1. Toutefois, puisque les sentiments de référence se réfèrent maintenant à dix variables plutôt qu'aux six variables utilisées dans l'ESCC 1.1 et antérieurement dans l'ENSP, elle a été renommée.

Site Internet : « National Comorbidity Survey » : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/

« Composite International Diagnostic Interview » (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Valeur de DISBDCHR	Condition(s)	Explication
ND	(DISB_10K = NSP, R, ND) ou (DISB_10L = NSP, R, ND) ou (DISB_10M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
1	DISB_10L = 1	Beaucoup plus souvent qu'à l'habitude
2	DISB_10L = 2	Plus souvent qu'à l'habitude
3	DISB_10L = 3	Un peu plus souvent qu'à l'habitude
4	DISB_10K = 3	Sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude
5	DISB_10M = 3	Un peu moins souvent qu'à l'habitude
6	DISB_10M = 2	Plutôt moins souvent qu'à l'habitude
7	DISB_10M = 1	Beaucoup moins souvent qu'à l'habitude
8	DISB_10K = 4	N'a jamais ressenti ces sentiments

Épisode dépressif majeur (51 VD)

Pour les besoins de l'ESCC 1.2, l'épisode dépressif majeur est une période de deux semaines ou plus durant laquelle persiste une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités normales, associée à des symptômes tels qu'une réduction de l'énergie, un changement du sommeil et de l'appétit, des difficultés à se concentrer et un sentiment de culpabilité, de désespoir et des idées suicidaires.

Les questions sur l'épisode dépressif majeur sont fondées sur une version reconnue du «World Mental Health du Composite International Diagnostic Interview» (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l'ESCC. L'instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le monde.

Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l'évaluation des troubles mentaux conformément à une opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L'abréviation DSM désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l'ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV ou le DSM-III-R. L'ESCC 1.2 n'offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10.

Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC (interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de travail qui examinera les différences méthodologiques pour s'assurer que les comparaisons entre pays soient faites de façon appropriée.

L'épisode dépressif majeur est l'un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic de l'épisode dépressif majeur au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s'entend des 12 mois qui ont précédé l'interview.

La documentation qui accompagne les données de l'ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récurrence, à la durée, à l'âge au moment de l'apparition et à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses.

En ce qui concerne l'épisode dépressif majeur, les variables d'intérêt sont :

Variable	Concept	Numéro de la variable
DEPBDDPS	Algorithme – vie	11
DEPBDDY	Algorithme - 12 mois	24
DEPBDON	Apparition	18
DEPBDREC	Récurrence	19
DEPBDPER	Persistence	20
DEPBD22Y DEPBD23Y DEPBD7CY DEPBD8AY DEPBD8BY DEPBD3AY	Durée	12 à 17

DEPBDINT	Perturbation / trouble – 12 mois	29
DEPBFSLT DEPBFSYT DEPBFSLA DEPBFSYA	Variables sur le suicide	25 à 28

Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées à un épisode dépressif majeur, ainsi que leurs variables temporaires respectives sont opérationnalisés de façon à satisfaire partiellement aux définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire.

L'instrument de l'ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d'informations sur le nombre de symptômes, la gravité, la durée et l'intensité globale du trouble. Toutefois, l'approche structurée utilisée pour l'instrument informatisé n'est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n'existe aucun algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du trouble. En outre, bien que l'instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour l'opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe.

En plus de l'information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l'utilisation des services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l'ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé que les données de l'ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l'information canadienne déjà recueillie dans le cadre de l'ESCC 1.1 et des cycles de l'ENSP réalisés antérieurement.

Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. Cette correspondance vise uniquement à faciliter l'interprétation des résultats en permettant un langage commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l'existence d'une correspondance directe entre nos critères et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au questionnaire et aux algorithmes.

Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode dépressif majeur au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir d'une durée de deux semaines ou plus ET au moins cinq symptômes supplémentaires;
2. une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social ou professionnel;
3. que les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois :

1. répondent aux critères diagnostiques d'un trouble dépressif majeur au cours de la vie;
2. déclarent un trouble au cours des 12 derniers mois;

3. déclarent une altération marquée du fonctionnement professionnel ou social.

Épisode dépressif majeur – Au cours de la vie

1) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère A, partie 1

Nom de la variable : DEPBD1

Basée sur : DEP1_09, DEP1_12, DEP1_24A, DEP1_24B, DEP1_24C, DEP1_24D, DEP1_24E, DEP1_24F

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré l'apparition au cours de leur vie des symptômes de dépression qui ont persisté durant une même période de deux semaines et au moins un des symptômes est :

1. une humeur déprimée ou
2. une perte d'intérêt ou de plaisir.

Valeur de DEPBD1	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_09 = 1 ou DEPB_12 = 1) et (DEPB_24A = 1 ou DEPB_24B = 1 ou DEPB_24C = 1 ou DEPB_24D = 1 ou DEPB_24E = 1 ou DEPB_24F = 1)	Le répondant remplit le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes ont persisté durant une même période de deux semaines et qu'au moins un des symptômes était une humeur déprimée ou une perte d'intérêt ou de plaisir.
2	(DEPB_09 = 2, SO) et (DEPB_12 = 2, SO) ou (DEPB_24A = 2, SO) et (DEPB_24C = 2, SO) et (DEPB_24E = 2, SO) et (DEPB_24F = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que les symptômes ont persisté durant une même période de deux semaines et qu'au moins un des symptômes était une humeur déprimée ou une perte d'intérêt ou de plaisir.
ND	(DEPB_09 = NSP, R, ND) ou (DEPB_12 = NSP, R, ND) ou (DEPB_24A = NSP, R, ND) ou (DEPB_24B = NSP, R, ND) ou (DEPB_24C = NSP, R, ND) ou (DEPB_24D = NSP, R, ND) ou (DEPB_24E = NSP, R, ND) ou (DEPB_24F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère A, partie 2

Nom de la variable : DEPBD A2

Basée sur : DEPBD A21, DEPBD A22, DEPBD A23, DEPBD A24, DEPBD A25, DEPBD A26, DEPBD A27, DEPBD A28, DEPBD A29

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a déclaré au moins cinq des neuf symptômes associés à la dépression. Ces symptômes doivent représenter un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Les symptômes sont :

1. une humeur dépressive;
2. une diminution de l'intérêt pour les passe-temps ou les activités;
3. une perte ou un gain de poids significatif ou un changement de l'appétit;
4. une insomnie ou une hypersomnie;
5. une agitation ou un ralentissement psychomoteur;
6. une fatigue ou une perte d'énergie;
7. un sentiment de dévalorisation;
8. une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer;
9. des pensées de mort récurrentes.

Les valeurs pour ces symptômes sont calculées ci-après, puis utilisées pour évaluer le critère.

2a) Symptôme 1 – humeur dépressive

Nom de la variable : DEPBD A21

Basée sur : DEP B_24A, DEP B_24B, DEP B_24C, DEP B_24D

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent une humeur dépressive la majeure partie de la journée.

Valeur de DEPBD A21	Condition(s)	Explication
1	DEPB_24A = 1 ou DEPB_24B = 1 ou DEPB_24C = 1 ou DEPB_24D = 1	Le répondant a déclaré une humeur dépressive.
2	(DEPB_24A = 2, SO) et (DEPB_24C = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'humeur dépressive. Nota : DEP B_24B et DEP B_24D sont sautées si DEP B_24A et DEP B_24C = Non.
ND	(DEPB_24A = NSP, R, ND) ou (DEPB_24B = NSP, R, ND) ou (DEPB_24C = NSP, R, ND) ou (DEPB_24D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2b) Symptôme 2 – diminution de l'intérêt ou du plaisir pour la plupart des activités**Nom de la variable :** DEPBD22**Basée sur :** DEP24E, DEP24F**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes, ou presque toutes, les activités la majeure partie de la journée, presque tous les jours.

Valeur de DEPBD22	Condition(s)	Explication
1	DEPB_24E = 1 ou DEPB_24F = 1	Le répondant a déclaré une diminution de l'intérêt ou du plaisir pour la plupart des activités.
2	(DEPB_24E = 2, SO) et (DEPB_24F = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de diminution de l'intérêt ou du plaisir pour la plupart des activités.
ND	(DEPB_24E = NSP, R, ND) ou (DEPB_24F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2c) Symptôme 3 – perte ou gain de poids significatif ou changement de l'appétit**Nom de la variable :** DEPBD23**Basée sur :** DEP26A, DEP26B, DEP26C, DEP261, DEP26D, DEP262, DEP26E, DEP263, DEP26F, DEP264**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une perte ou un gain de poids significatif en l'absence d'un régime, ou une diminution ou une augmentation de l'appétit presque tous les jours. Un changement significatif de poids est défini comme correspondant à 10 livres/4 kg. Sont exclus les gains de poids dû à la grossesse et la perte de poids due à une maladie.

Valeur de DEPBD23	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26A = 1 ou DEPB_26B = 1 ou (DEPB_26C = 1 et DEPB_261 = 2 et 10 <= DEP26D <= 300 et DEPB_262 = 1) ou (DEPB_26C = 1 et DEPB_261 = 2 et 4 <= DEP26D <= 300 et DEPB_262 = 2) ou (DEPB_26E = 1 et DEPB_263 = 2 et 10 <= DEP26F <= 300 et DEPB_264 = 1) ou (DEPB_26E = 1 et DEPB_263 = 2 et 4 <= DEP26F <= 300 et DEPB_264 = 2)	Le répondant a déclaré une perte ou un gain significatif de poids ou un changement d'appétit.

2	(DEPB_26A = 2, SO) et (DEPB_26B = 2, SO) et [(DEPB_26C = 2, SO) et (DEPB_26E = 2, SO) ou DEPB_261 = 1 ou (DEPB_26D < 10 et DEPB_262 = 1) ou (DEPB_26D < 4 et DEPB_262 = 2) ou DEPB_263 = 1 ou (DEPB_26F < 10 et DEPB_264 = 1) ou (DEPB_26F < 4 et DEPB_264 = 2)]	Le répondant n'a pas déclaré de perte ni de gain significatif de poids ni un changement d'appétit.
ND	(DEPB_26A = NSP, R, ND) ou (DEPB_26B = NSP, R, ND) ou (DEPB_26C = NSP, R, ND) ou (DEPB_261 = NSP, R, ND) ou (DEPB_26D = NSP, R, ND) ou (DEPB_26E = NSP, R, ND) ou (DEPB_263 = NSP, R, ND) ou (DEPB_26F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2d) Symptôme 4 - insomnie ou hypersomnie

Nom de la variable : DEPBD24

Basée sur : DEPB_26G, DEPB_26H

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré souffrir d'insomnie (difficulté à s'endormir ou à demeurer endormi ou réveil précoce) ou d'hypersomnie (sommeil plus long qu'à l'ordinaire) associée à la dépression.

Valeur de DEPBD24	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26G = 1 ou DEPB_26H = 1	Le répondant a déclaré une insomnie ou une hypersomnie.
2	(DEPB_26G = 2, SO) et (DEPB_26H = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'insomnie ni d'hypersomnie.
ND	(DEPB_26G = NSP, R, ND) ou (DEPB_26H = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2e) Symptôme 5 – agitation ou ralentissement psychomoteur

Nom de la variable : DEPBD25

Basée sur : DEP26M, DEP26O

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des modifications psychomotrices comprenant une agitation (p. ex., impossibilité de rester en place) ou un ralentissement (p. ex., lenteur du discours ou des mouvements) observables par les autres.

Valeur de DEPBD25	Condition(s)	Explication
1	DEP26M = 1 ou DEP26O = 1	Le répondant a déclaré une agitation ou un ralentissement psychomoteur.
2	(DEP26M = 2, SO) et (DEP26O = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'agitation ni de ralentissement psychomoteur.
ND	(DEP26M = NSP, R, ND) ou (DEP26O = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2f) Symptôme 6 – fatigue ou perte d'énergie

Nom de la variable : DEPBD26

Basée sur : DEP26J

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent une fatigue ou une diminution de l'énergie presque tous les jours.

Valeur de DEPBD26	Condition(s)	Explication
1	DEP26J = 1	Le répondant a déclaré une fatigue ou une diminution de l'énergie.
2	(DEP26J = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de fatigue ni de diminution de l'énergie.
ND	(DEP26J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2g) Symptôme 7 – sentiment de dévalorisation

Nom de la variable : DEPBD27

Basée sur : DEP26V

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent un sentiment de dévalorisation pratiquement tous les jours.

Valeur de DEPBD27	Condition(s)	Explication
1	DEP26V = 1	Le répondant a déclaré un sentiment de dévalorisation.
2	(DEP26V = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de sentiment de dévalorisation.

ND	(DEPB_26V = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
----	-------------------------	--

2h) Symptôme 8 – diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer

Nom de la variable : DEPBD28

Basée sur : DEP26P, DEP26R, DEP26S

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer presque tous les jours.

Valeur de DEPBD28	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26P = 1 ou DEPB_26R = 1 ou DEPB_26S = 1	Le répondant a déclaré une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer.
2	(DEPB_26P = 2, SO) et (DEPB_26R = 2, SO) et (DEPB_26S = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de diminution de l'aptitude à penser ni à se concentrer.
ND	(DEPB_26P = NSP, R, ND) ou (DEPB_26R = NSP, R, ND) ou (DEPB_26S = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2i) Symptôme 9 – pensées de mort récurrentes

Nom de la variable : DEPBD29

Basée sur : DEP6A, DEP6B, DEP6C

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des pensées de mort récurrentes.

Valeur de DEPBD29	Condition(s)	Explication
1	DEPB_6A = 1 ou DEPB_6B = 1 ou DEPB_6C = 1	Le répondant a déclaré des pensées de mort récurrentes.
2	(DEPB_6A = 2, SO) et (DEPB_6B = 2, SO) et (DEPB_6C = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de pensées de mort récurrentes.
ND	(DEPB_6A = NSP, R, ND) ou (DEPB_6B = NSP, R, ND) ou (DEPB_6C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère A, partie 2 :

Valeur de DEPBD2	Condition(s)	Explication
1	Au moins 5 de (DEPBDA21, DEPBDA22, DEPBD23, DEPBDA24, DEPBD25, DEPBDA26, DEPBD27, DEPBDA28 ou DEPBD29) = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré au moins cinq symptômes associés à la dépression qui représentent un changement par rapport au fonctionnement antérieur.

2	Au moins 5 de (DEPBDA21, DEPBA22, DEPBA23, DEPBA24, DEPBA25, DEPBA26, DEPBA27, DEPBA28 ou DEPBA29) = 2	Le répondant ne répond pas au critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré au moins cinq symptômes associés à la dépression.
ND	DEPBDA21 = ND ou DEPBDA22 = ND ou DEPBDA23 = ND ou DEPBDA24 = ND ou DEPBDA25 = ND ou DEPBDA26 = ND ou DEPBDA27 = ND ou DEPBDA28 = ND ou DEPBDA29 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

3) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère A (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : DEPBA

Basée sur : DEPBA1, DEPBA2

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de l'algorithme ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode dépressif majeur au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant déclare :

1. une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir ayant persisté au moins deux semaines et
2. au moins cinq symptômes associés à la dépression qui représentent un changement de fonctionnement.

Valeur de DEPBA	Condition(s)	Explication
1	DEPBA1 = 1 et DEPBA2 = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir ayant persisté pendant deux semaines ou plus et au moins cinq symptômes associés à la dépression.
2	DEPBA1 = 2 ou DEPBA2 = 2	Le répondant ne répond pas au critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré d'humeur dépressive ni de perte d'intérêt ou de plaisir ayant persisté pendant deux semaines ou plus, ou n'a pas déclaré au moins cinq symptômes associés à la dépression.
ND	DEPBA1 = ND ou DEPBA2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

4) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère C, partie 1

Nom de la variable : DEPBD1

Basée sur : DEP1_17, DEP1_18, DEP1_19, DEP1_24B

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes dépressifs au cours de la vie ont causé une détresse cliniquement significative.

Valeur de DEPBD1	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_17 = 2, 3, 4) ou (DEPB_18 = 1, 2) ou (DEPB_19 = 1, 2, 3) ou DEPB_24B = 1	Le répondant remplit le critère C, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes causent une détresse cliniquement significative.
2	(DEPB_17 = 1, SO) et (DEPB_18 = 3, 4, SO) et (DEPB_19 = 4, SO) et (DEPB_24B = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que les symptômes causent une détresse cliniquement significative.
ND	(DEPB_17 = NSP, R, ND) ou (DEPB_18 = NSP, R, ND) ou (DEPB_19 = NSP, R, ND) ou (DEPB_21 = NSP, R, ND) ou (DEPB_24B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère C, partie 2

Nom de la variable : DEPBD2

Basée sur : DEP1_19, DEP1_28, DEP1_281, DEP1_28A, DEP1_68, DEPBD664

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes dépressifs au cours de la vie ont induit une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

5a) Perturbation sociale et professionnelle

Nom de la variable : DEPBD664

Basée sur : DEPBD66A, DEPBD661, DEPBD662, DEPBD66C, DEPBD66D

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si, durant la période d'un mois ou plus au cours des 12 derniers mois avant l'interview où les symptômes ont été les plus sévères, les sentiments dépressifs du répondant ont significativement troublé sa capacité vis-à-vis ses responsabilités au niveau des tâches ménagères, à l'école ou au travail, ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.

Valeur de DEPBD664	Condition(s)	Explication
1	4 <= DEPBD66A <= 10 ou 4 <= DEPBD661 <= 10 ou 4 <= DEPBD662 <= 10 ou 4 <= DEPBD66C <= 10 ou 4 <= DEPBD66D <= 10	Le répondant a éprouvé une perturbation vis-à-vis ses responsabilités au niveau des tâches ménagères, à l'école ou au travail, ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.
2	[0 <= DEPBD66A <= 3 ou DEPBD66A = SO] et [0 <= DEPBD661 <= 3 ou (DEPBD661 = 11, SO)] et [0 <= DEPBD662 <= 3 ou (DEPBD662 = 11, SO)] et [0 <= DEPBD66C <= 3 ou DEPBD66C = SO] et [0 <= DEPBD66D <= 3 ou DEPBD66D = SO]	Le répondant n'a pas éprouvé de perturbation significative vis-à-vis ses responsabilités au niveau des tâches ménagères, à l'école ni au travail, ni au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.
ND	(DEPBD66A = NSP, R, ND) ou (DEPBD661 = NSP, R, ND) ou (DEPBD662 = NSP, R, ND) ou (DEPBD66C = NSP, R, ND) ou (DEPBD66D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère C, partie 2:

Valeur de DEPBD664	Condition(s)	Explication
1	(DEPBD19 = 1, 2, 3) ou (DEPBD28 = 3, 4, 5) ou (DEPBD281 = 3, 4, 5) ou (DEPBD28A = 1, 2, 3) ou DEPBD664 = 1 ou 5 <= DEPBD68 < SO	Le répondant remplit le critère C, partie 2 au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes ont causé une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

2	(DEPB_19 = 4, SO) et (DEPB_28 = 1 ou DEPB_281 = 1 ou DEPB_28 = 2 et DEPB_28A = 4 ou DEPB_281 = 2 et DEPB_28A = 4 ou DEPB_28 = SO et DEPB_281 = SO) et [((DEPB_38 = 2, SO) ou DEPBD664 = 2) et (0 <= DEPB_68 < 5 ou DEPB_68 = SO)]	Le répondant ne remplit pas le critère C, partie 2 au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré d'altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	(DEPB_19 = NSP, R, ND) ou (DEPB_28 = NSP, R, ND) ou (DEPB_281 = NSP, R, ND) ou (DEPB_28A = NSP, R, ND) ou DEPBD664 = ND ou (DEPB_68 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

6) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère C, (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : DEPBDC

Basée sur : DEPBDC1, DEPBDC2

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère C de l'algorithme de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant déclare :

1. que les symptômes ont causé une détresse cliniquement significative ou
2. une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Valeur de DEPBDC	Condition(s)	Explication
1	DEPBDC1 = 1 ou DEPBDC2 = 1	Le répondant remplit le critère C, au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes ont causé une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement.
2	DEPBDC1 = 2 et DEPBDC2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère C, au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que les symptômes ont causé une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement.
ND	DEPBDC1 = ND ou DEPBDC2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

7) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E, partie 1

Nom de la variable : DEPBDE1

Basée sur : DEPB_30, DEPB_30A

Usage antérieur : Aucun

Description : Le critère E, partie 1 est que les épisodes dépressifs majeurs au cours de la vie n'ont pas été toujours expliqués par le deuil (p. ex, précédés par le décès d'une personne proche). Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes n'ont pas toujours été précédés par le décès d'une personne proche.

Valeur de DEPBDE1	Condition(s)	Explication
1	DEPB_30 = 2 ou DEPB_30A = 2	Le répondant remplit le critères E, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que les symptômes étaient toujours associés à un deuil.
2	(DEPB_30A = 1, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère E, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes ont toujours été associés à un deuil ou la question ne lui a pas été posée
ND	(DEPB_30 = NSP, R, ND) ou (DEPB_30A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E, partie 2

Nom de la variable : DEPBDE2

Basée sur : DEPBDE21, DEPBDE22, DEPBDE23, DEPBDE24, DEPBDE25, DEPBDE26

Usage antérieur : Aucun

Description : Le critère E, partie 2 est que, s'il y a eu un deuil, les symptômes ont duré plus de deux mois. Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré au cours de leur vie un épisode dépressif qui a duré plus de deux mois. Pour évaluer cela, on commence par créer une variable pour chaque épisode (p. ex., le pire, le premier, au cours des 12 derniers mois, le plus récent, le plus long) pour déterminer s'il a duré plus de deux mois.

8a) Pire épisode dépressif de plus de deux mois**Nom de la variable :** DEPBDE21**Basée sur :** DEPB_22B, DEPB_22C, DEPB_22D, DEPB_22E**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un pire épisode dépressif qui a duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBDE21	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_22B = 1 et 60 < DEPB_22C <= 900) ou (DEPB_22B = 2 et 8 < DEPB_22D <= 104) ou (DEPB_22B = 3 et 2 < DEPB_22E <= 36) ou DEPB_22B = 4	Le répondant a déclaré un pire épisode dépressif qui a duré plus de deux mois.
2	(DEPB_22B = 1 et 0 <= DEPB_22C <= 60) ou (DEPB_22B = 2 et 0 <= DEPB_22D <= 8) ou (DEPB_22B = 3 et 0 <= DEPB_22E <= 2) ou DEPB_22B = SO	Le répondant n'a pas déclaré de pire épisode dépressif ayant duré plus de deux mois.
ND	(DEPB_22B = NSP, R, ND) ou (DEPB_22C = NSP, R, ND) ou (DEPB_22D = NSP, R, ND) ou (DEPB_22E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8b) Plus récent épisode dépressif de plus de deux mois**Nom de la variable :** DEPBDE22**Basée sur :** DEPB_23B, DEPB_23C, DEPB_23D, DEPB_23E**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un plus récent épisode dépressif ayant duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBDE22	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_23B = 1 et 60 < DEPB_23C <= 900) ou (DEPB_23B = 2 et 8 < DEPB_23D <= 104) ou (DEPB_23B = 3 et 2 < DEPB_23E <= 36) ou DEPB_23B = 4	Le répondant a déclaré que le plus récent épisode dépressif avait duré plus de deux mois.
2	(DEPB_23B = 1 et 0 <= DEPB_23C <= 60) ou (DEPB_23B = 2 et 0 <= DEPB_23D <= 8) ou (DEPB_23B = 3 et 0 <= DEPB_23E <= 2) ou DEPB_23B = SO	Le répondant n'a pas déclaré que le plus récent épisode dépressif avait duré plus de deux mois.
ND	(DEPB_23B = NSP, R, ND) ou (DEPB_23C = NSP, R, ND) ou (DEPB_23D = NSP, R, ND) ou (DEPB_23E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8c) Premier épisode dépressif de plus de deux mois**Nom de la variable :** DEPBDE23**Basée sur :** DEPB_7CA, DEPB_7CB, DEPB_7CC, DEPB_7CD**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un tout premier épisode dépressif ayant duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBDE23	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_7CA = 1 et 60 < DEPB_7CB <= 900) ou (DEPB_7CA = 2 et 8 < DEPB_7CC <= 104) ou (DEPB_7CA = 3 et 2 < DEPB_7CD <= 36) ou DEPB_7CA = 4	Le répondant a déclaré que le tout premier épisode dépressif avait duré plus de deux mois.
2	(DEPB_7CA = 1 et 0 <= DEPB_7CB <= 60) ou (DEPB_7CA = 2 et 0 <= DEPB_7CC <= 8) ou (DEPB_7CA = 3 et 0 <= DEPB_7CD <= 2) ou DEPB_7CA = SO	Le répondant n'a pas déclaré que le tout premier épisode dépressif avait duré plus de deux mois.
ND	(DEPB_7CA = NSP, R, ND) ou (DEPB_7CB = NSP, R, ND) ou (DEPB_7CC = NSP, R, ND) ou (DEPB_7CD = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8d) Un seul épisode dépressif de plus de deux mois au cours des 12 derniers mois**Nom de la variable :** DEPBDE24**Basée sur :** DEPB_8AA, DEPB_8AB, DEPB_8AC, DEPB_8AD**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un seul épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBDE24	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_8AA = 1 et 60 < DEPB_8AB <= 900) ou (DEPB_8AA = 2 et 8 < DEPB_8AC <= 104) ou (DEPB_8AA = 3 et 2 < DEPB_8AD <= 36) ou DEPB_8AA = 4	Le répondant a déclaré un seul épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.
2	(DEPB_8AA = 1 et 0 <= DEPB_8AB <= 60) ou (DEPB_8AA = 2 et 0 <= DEPB_8AC <= 8) ou (DEPB_8AA = 3 et 0 <= DEPB_8AD <= 2) ou DEPB_8AA = SO	Le répondant n'a pas déclaré d'épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.
ND	(DEPB_8AA = NSP, R, ND) ou (DEPB_8AB = NSP, R, ND) ou (DEPB_8AC = NSP, R, ND) ou (DEPB_8AD = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8e) Plus récent épisode dépressif de plus de deux mois au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : DEPBD25

Basée sur : DEP8BA, DEP8BB, DEP8BC, DEP8BD

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré le plus récent épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBD25	Condition(s)	Explication
1	(DEP8BA = 1 et 60 < DEP8BB ≤ 900) ou (DEP8BA = 2 et 8 < DEP8BC ≤ 104) ou (DEP8BA = 3 et 2 < DEP8BD ≤ 36) ou DEP8BA = 4	Le répondant a déclaré le plus récent épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.
2	(DEP8BA = 1 et 0 ≤ DEP8BB ≤ 60) ou (DEP8BA = 2 et 0 ≤ DEP8BC ≤ 8) ou (DEP8BA = 3 et 0 ≤ DEP8BD ≤ 2) ou DEP8BA = SO	Le répondant n'a pas déclaré un plus récent épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.
ND	(DEP8BA = NSP, R, ND) ou (DEP8BB = NSP, R, ND) ou (DEP8BC = NSP, R, ND) ou (DEP8BD = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8f) Plus long épisode dépressif de plus de deux mois

Nom de la variable : DEPBD26

Basée sur : DEP39A, DEP39B, DEP39C, DEP39D

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leur épisode dépressif le plus long avait duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBD26	Condition(s)	Explication
1	(DEP39A = 1 et 60 < DEP39B ≤ 900) ou (DEP39A = 2 et 8 < DEP39C ≤ 104) ou (DEP39A = 3 et 2 < DEP39D ≤ 36) ou DEP39A = 4	Le répondant a déclaré que l'épisode dépressif le plus long a duré plus de deux mois.
2	(DEP39A = 1 et 0 ≤ DEP39B ≤ 60) ou (DEP39A = 2 et 0 ≤ DEP39C ≤ 8) ou (DEP39A = 3 et 0 ≤ DEP39D ≤ 2) ou DEP39A = SO	Le répondant n'a pas déclaré que l'épisode dépressif le plus long a duré plus de deux mois.
ND	(DEP39A = NSP, R, ND) ou (DEP39B = NSP, R, ND) ou (DEP39C = NSP, R, ND) ou (DEP39D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère E, partie 2 :

Valeur de DEPBDE2	Condition(s)	Explication
1	DEPBDE21 = 1 ou DEPBDE22 = 1 ou DEPBDE23 = 1 ou DEPBDE24 = 1 ou DEPBDE25 = 1 ou DEPBDE26 = 1	Le répondant remplit le critère E, partie 2 au cours de la vie. Le répondant a déclaré un épisode dépressif ayant duré plus de deux mois.
2	DEPBDE21 = 2 et DEPBDE22 = 2 et DEPBDE23 = 2 et DEPBDE24 = 2 et DEPBDE25 = 2 et DEPBDE26 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère E, partie 2 au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré d'épisode dépressif ayant duré plus de deux mois.
ND	DEPBDE21 = ND ou DEPBDE22 = ND ou DEPBDE23 = ND ou DEPBDE24 = ND ou DEPBDE25 = ND ou DEPBDE26 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

9) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E, partie 3**Nom de la variable :** DEPBDE3**Basée sur :** DEPBDE3A, DEPBDE3B, DEPBDE3C, DEPBDE3E**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Le critère E, partie 3 est que, s'il existe un deuil, les symptômes au cours de la vie sont caractérisés par :

1. une altération marquée du fonctionnement,
2. des préoccupations morbides de dévalorisation,
3. des idées suicidaires et
4. un ralentissement psychomoteur.

Pour procéder à cette évaluation, on commence par créer des variables pour les diverses composantes.

9a) Perturbation sociale et professionnelle**Nom de la variable :** DEPBD667**Basée sur :** DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable indique les répondants qui ont déclaré que les sentiments associés à la dépression troublaient significativement leurs activités à la maison, à l'école ou au travail ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.

Valeur de DEPBD667	Condition(s)	Explication
1	7 <= DEPB_66A <= 10 ou 7 <= DEPB_661 <= 10 ou 7 <= DEPB_662 <= 10 ou 7 <= DEPB_66C <= 10 ou 7 <= DEPB_66D <= 10	Le répondant a déclaré un trouble significatif de ses activités à la maison, au travail ou à l'école ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.

2	(0 <= DEP_B_66A <= SO ou DEP_B_66A = SO) et [0 <= DEP_B_661 <= SO ou (DEP_B_661 = 11, SO)] et [0 <= DEP_B_662 <= SO ou (DEP_B_662 = 11, SO)] et (0 <= DEP_B_66C <= SO ou DEP_B_66C = SO) et (0 <= DEP_B_66D <= SO ou DEP_B_66D = SO)	Le répondant n'a pas déclaré un trouble significatif de ses activités à la maison, au travail ou à l'école ni de ses au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.
ND	(DEP_B_66A = NSP, R, ND) ou (DEP_B_661 = NSP, R, ND) ou (DEP_B_662 = NSP, R, ND) ou (DEP_B_66C = NSP, R, ND) ou (DEP_B_66D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

9b) Altération du fonctionnement

Nom de la variable : DEPBDE3A

Basée sur : DEP_B_19, DEP_B_28, DEP_B_281, DEP_B_28A, DEPBD667, DEP_B_68

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une altération marquée du fonctionnement associée à la dépression.

Valeur de DEPBDE3A	Condition(s)	Explication
1	DEP_B_19 = 1 ou (DEP_B_28 = 4, 5) ou (DEP_B_281 = 4, 5) ou (DEP_B_28A = 1, 2) ou DEPBD667 = 1 ou 10 <= DEP_B_68 < SO	Le répondant a déclaré une altération marquée de son fonctionnement associée à la dépression.
2	(DEP_B_19 = 2, 3, 4, SO) et ((DEP_B_28 = 1 ou (DEP_B_28 = 2, 3) et (DEP_B_28A = 3, 4)) ou (DEP_B_281 = 1 ou (DEP_B_281 = 2, 3) et (DEP_B_28A = 3, 4)) ou DEP_B_28 = NA et DEP_B_281 = NA) et DEPBD667 = 2 et (DEP_B_68 < 10 ou DEP_B_68 = SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'altération marquée de son fonctionnement associée à la dépression.
ND	(DEP_B_19 = NSP, R, ND) ou (DEP_B_28 = NSP, R, ND) ou (DEP_B_281 = NSP, R, ND) ou (DEP_B_28A = NSP, R, ND) ou (DEPBD667 = NSP, R, ND) ou (DEP_B_68 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

9c) Préoccupations de dévalorisation

Nom de la variable : DEPBDE3B

Basée sur : DEPB_26V

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des préoccupations de dévalorisation associées à la dépression.

Valeur de DEPBDE3B	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26V = 1	Le répondant a déclaré des préoccupations de dévalorisation associées à la dépression.
2	(DEPB_26V = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de préoccupations de dévalorisation.
ND	(DEPB_26V = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

9d) Idées suicidaires

Nom de la variable : DEPBDE3C

Basée sur : DEPB_A

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des idées suicidaires.

Valeur de DEPBDE3C	Condition(s)	Explication
1	DEPB_A = 1	Le répondant a déclaré des idées suicidaires.
2	(DEPB_A = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'idées suicidaires.
ND	(DEPB_A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

9e) Ralentissement psychomoteur

Nom de la variable : DEPBDE3E

Basée sur : DEPB_26L, DEPB_26M

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un ralentissement psychomoteur associé à la dépression.

Valeur de DEPBDE3E	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26L = 1 ou DEPB_26M = 1	Le répondant a déclaré un ralentissement psychomoteur.
2	(DEPB_26L = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de ralentissement psychomoteur. Nota : Si DEPB_26L est Non (2), DEPB_26M est sautée.
ND	(DEPB_26L = NSP, R, ND) ou (DEPB_26M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère E, partie 3 :

Valeur de DEPBDE3	Condition(s)	Explication
1	DEPBDE3A = 1 ou DEPBDE3B = 1 ou DEPBDE3C = 1 ou DEPBDE3E = 1	Le répondant remplit le critères E, partie 3 de dépression au cours de la vie. Le répondant a déclaré une altération marquée du fonctionnement, des préoccupations de dévalorisation, des idées suicidaires ou un ralentissement psychomoteur associés à la dépression.
2	DEPBDE3A = 2 et DEPBDE3B = 2 et DEPBDE3C = 2 et DEPBDE3E = 2	Le répondant ne remplit pas le critère E, partie 3 de dépression au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré d'altération marquée du fonctionnement, de préoccupations de dévalorisation, d'idées suicidaires, ni de ralentissement psychomoteur.
ND	DEPBDE3A = ND ou DEPBDE3B = ND ou DEPBDE3C = ND ou DEPBDE3E = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

10) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E (parties 1, 2, et 3 combinées)

Nom de la variable : DEPBDE

Basée sur : DEPBDE1, DEPBDE2, DEPBDE3

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode dépressif majeur au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant déclare :

1. que ses épisodes dépressifs n'étaient pas tous associés à un deuil (p. ex., survenus après la mort d'une personne proche), ou
2. qu'il a vécu un épisode dépressif ayant duré plus de deux mois ou
3. qu'un épisode a été caractérisé par une altération marquée du fonctionnement, des préoccupations de dévalorisation, des idées suicidaires ou un ralentissement psychomoteur.

Valeur de DEPBDE	Condition(s)	Explication
1	DEPBDE1 = 1 ou DEPBDE2 = 1 ou DEPBDE3 = 1	Le répondant remplit le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) que les épisodes ne sont pas tous associés à un deuil, ou (2) que les symptômes persistent pendant plus de deux mois, ou (3) que les symptômes sont caractérisés par une altération marquée du fonctionnement, des préoccupations de dévalorisation, des idées suicidaires ou un ralentissement psychomoteur.
2	DEPBDE1 = 2 et DEPBDE2 = 2 et DEPBDE3 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) un deuil et (2) qu'aucun épisode n'a duré plus de deux mois et (3) que les symptômes ne sont pas caractérisés par une altération marquée du fonctionnement, des préoccupations morbides de dévalorisation, des idées suicidaires ou un ralentissement psychomoteur.
ND	DEPBDE1 = ND ou DEPBDE2 = ND ou DEPBDE3 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

11) Algorithme pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie

Nom de la variable : DEPBDPDS

Basée sur : DEPBDA, DEPBDC, DEPBDE

Usage antérieur : Aucun

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si les répondants remplissent ou non les critères de l'algorithme l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères ont déclaré :

1. une humeur déprimée ou une perte d'intérêt ou de plaisir d'une durée de deux semaines ou plus et au moins cinq symptômes associés à la dépression qui représentent un changement par rapport au fonctionnement antérieur,
2. que les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants et
3. que les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil, ou qu'ils persistent pendant plus de deux mois ou qu'ils s'accompagnent d'une altération marquée du fonctionnement, de préoccupations morbides de dévalorisation, d'idées suicidaires ou d'un ralentissement psychomoteur.

Valeur de DEPBDPDS	Condition(s)	Explication
1	DEPBDA = 1 et DEPBDC = 1 et DEPBDE = 1	Le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie.
2	DEPBDA = 2 ou DEPBDC = 2 ou DEPBDE = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie.
ND	DEPBDA = ND ou DEPBDC = ND ou DEPBDE = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

12) Durée du pire épisode dépressif (en années)

Nom de la variable : DEPBD22Y

Basée sur : DEPB_22B, DEPB_22C, DEPB_22D, DEPB_22E, DEPB_22F

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique la durée (en années) du pire épisode dépressif vécu par le répondant.

Valeur de DEPBD22Y	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_22B = SO	Les questions nécessaires au calcul n'ont pas été posées au répondant.
ND	(DEPB_22B = NSP, R, ND) ou (DEPB_22C = NSP, R, ND) ou (DEPB_22D = NSP, R, ND) ou (DEPB_22E = NSP, R, ND) ou (DEPB_22F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à DEPB_22C / 365 (arrondir à .01)	DEPB_22B = 1	Durée du pire épisode dépressif vécu par le répondant (en années).
Valeur à DEPB_22D / 52 (arrondir à .01)	DEPB_22B = 2	Durée du pire épisode dépressif vécu par le répondant (en années).
Valeur à DEPB_22E / 12 (arrondir à .01)	DEPB_22B = 3	Durée du pire épisode dépressif vécu par le répondant (en années).

Valeur à DEPBD22F (arrondir à .01)	DEPB_22B = 4	Durée du pire épisode dépressif vécu par le répondant (en années).
---------------------------------------	--------------	--

13) Durée de l'épisode dépressif le plus récent (en années)

Nom de la variable : DEPBD23Y

Basée sur : DEPBD23B, DEPBD23C, DEPBD23D, DEPBD23E, DEPBD23F

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique la longueur (en années) de l'épisode dépressif vécu le plus récemment par le répondant.

Valeur de DEPBD23Y	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_23B = SO	Les questions nécessaires au calcul n'ont pas été posées au répondant.
ND	(DEPB_23B = NSP, R, ND) ou (DEPB_23C = NSP, R, ND) ou (DEPB_23D = NSP, R, ND) ou (DEPB_23E = NSP, R, ND) ou (DEPB_23F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à DEPBD23C / 365 (arrondir à .01)	DEPB_23B = 1	Durée du plus récent épisode dépressif vécu par le répondant (en années).
Valeur à DEPBD23D / 52 (arrondir à .01)	DEPB_23B = 2	Durée du plus récent épisode dépressif vécu par le répondant (en années).
Valeur à DEPBD23E / 12 (arrondir à .01)	DEPB_23B = 3	Durée du plus récent épisode dépressif vécu par le répondant (en années).
Valeur à DEPBD23F (arrondir à .01)	DEPB_23B = 4	Durée du plus récent épisode dépressif vécu par le répondant (en années).

14) Durée du premier épisode dépressif (en années)

Nom de la variable : DEPBD7CY

Basée sur : DEPBD7CA, DEPBD7CB, DEPBD7CC, DEPBD7CD, DEPBD7CE

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique la longueur (en années) du premier épisode dépressif vécu par le répondant.

Valeur de DEPBD7CY	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_7CA = SO	Les questions nécessaires au calcul n'ont pas été posées au répondant.
ND	(DEPB_7CA = NSP, R, ND) ou (DEPB_7CB = NSP, R, ND) ou (DEPB_7CC = NSP, R, ND) ou (DEPB_7CD = NSP, R, ND) ou (DEPB_7CE = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à DEPBD7CB / 365 (arrondir à .01)	DEPB_7CA = 1	Durée du premier épisode dépressif du répondant (en années).

Valeur à DEPBD8AY / 52 (arrondir à .01)	DEPB_7CA = 2	Durée du premier épisode dépressif du répondant (en années).
Valeur à DEPBD8BY / 12 (arrondir à .01)	DEPB_7CA = 3	Durée du premier épisode dépressif du répondant (en années).
Valeur à DEPBD8BY (arrondir à .01)	DEPB_7CA = 4	Durée du premier épisode dépressif du répondant (en années).

15) Durée de l'unique épisode dépressif au cours des 12 derniers mois (en années)

Nom de la variable : DEPBD8AY

Basée sur : DEPBD8AA, DEPBD8AB, DEPBD8AC, DEPBD8AD, DEPBD8AE

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique la durée de l'unique épisode dépressif vécu par le répondant au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de DEPBD8AY	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_8AA = SO	Les questions nécessaires au calcul n'ont pas été posées au répondant.
ND	(DEPB_8AA = NSP, R, ND) ou (DEPB_8AB = NSP, R, ND) ou (DEPB_8AC = NSP, R, ND) ou (DEPB_8AD = NSP, R, ND) ou (DEPB_8AE = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à DEPBD8AB / 365 (arrondir à .01)	DEPB_8AB = 1	Durée de l'unique épisode dépressif vécu par le répondant au cours des 12 derniers mois (en années).
Valeur à DEPBD8AC / 52 (arrondir à .01)	DEPB_8AC = 2	Durée de l'unique épisode dépressif vécu par le répondant au cours des 12 derniers mois (en années).
Valeur à DEPBD8AD / 12 (arrondir à .01)	DEPB_8AD = 3	Durée de l'unique épisode dépressif vécu par le répondant au cours des 12 derniers mois (en années).
Valeur à DEPBD8AE (arrondir à .01)	DEPB_8AE = 4	Durée de l'unique épisode dépressif vécu par le répondant au cours des 12 derniers mois (en années).

16) Durée du premier de plusieurs épisodes dépressifs au cours des 12 derniers mois (en années)

Nom de la variable : DEPBD8BY

Basée sur : DEPBD8BA, DEPBD8BB, DEPBD8BC, DEPBD8BD, DEPBD8BE

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique la durée du premier de plusieurs épisodes dépressifs vécu par le répondant au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de DEPBD8BY	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_8BA = SO	Les questions nécessaires au calcul n'ont pas été posées au répondant.

ND	(DEPB_8BA = NSP, R, ND) ou (DEPB_8BB = NSP, R, ND) ou (DEPB_8BC = NSP, R, ND) ou (DEPB_8BD = NSP, R, ND) ou (DEPB_8BE = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à DEPB_8BB/ 365 (arrondir à .01)	DEPB_8BB = 1	Durée du premier de plusieurs épisodes dépressifs vécu par le répondant au cours des 12 derniers mois (en années).
Valeur à DEPB_8BC / 52 (arrondir à .01)	DEPB_8BC = 2	Durée du premier de plusieurs épisodes dépressifs vécu par le répondant au cours des 12 derniers mois (en années).
Valeur à DEPB_8BD / 12 (arrondir à .01)	DEPB_8BD = 3	Durée du premier de plusieurs épisodes dépressifs vécu par le répondant au cours des 12 derniers mois (en années).
Valeur à DEPB_8BE (arrondir à .01)	DEPB_8BE = 4	Durée du premier de plusieurs épisodes dépressifs majeur vécu par le répondant au cours des 12 derniers mois (en années).

17) Durée de l'épisode dépressif le plus long (en années)

Nom de la variable : DEPBD39Y

Basée sur : DEPB_39A, DEPB_39B, DEPB_39C, DEPB_39D, DEPB_39E

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique la durée du plus long épisode dépressif. Il convient de souligner que cette question n'a pas été posée à tous les répondants (par exemple ceux qui n'ont déclaré qu'un seul épisode dépressif au cours de la vie).

Valeur de DEPBD39Y	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_39A = SO	Les questions nécessaires au calcul n'ont pas été posées au répondant.
ND	(DEPB_39A = NSP, R, ND) ou (DEPB_39B = NSP, R, ND) ou (DEPB_39C = NSP, R, ND) ou (DEPB_39D = NSP, R, ND) ou (DEPB_39E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à DEPB_39B/ 365 (arrondir à .01)	DEPB_39A = 1	Durée du plus long épisode dépressif (en années).
Valeur à DEPB_39C / 52 (arrondir à .01)	DEPB_39A = 2	Durée du plus long épisode dépressif (en années).
Valeur à DEPB_39D/ 12 (arrondir à .01)	DEPB_39A = 3	Durée du plus long épisode dépressif (en années).
Valeur à DEPB_39E (arrondir à .01)	DEPB_39A = 4	Durée du plus long épisode dépressif (en années).

18) Épisode dépressif majeur — âge au moment de l'apparition

Nom de la variable : DEPBDON

Basée sur : DEPB_22, DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_37B, DEPBDOPS

Usage antérieur : Aucun

Description : L'âge de l'apparition de l'épisode dépressif majeur est l'âge qu'avait le répondant au début du premier épisode déclaré de dépression. La variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères d'un épisode dépressif majeur.

Valeur de DEPBDON	Condition(s)	Explication
SO	(DEPBDOPS = 2)	Le répondant ne remplit pas les critères pour un épisode dépressif majeur.
ND	(DEPB_37B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
Valeur minimale à (DEPB_22A, DEPB_37A, DEPB_37B) (min : 0; max : Âge actuel)	DEPBDOPS = 1 et DEPB_22 = 1 et (DEPB_22A < 996 ou DEPB_37A < 996 ou DEPB_37B < 996)	Âge du répondant au moment du premier épisode dépressif majeur.
Valeur minimale à (DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_37B) (min : 0; max : Âge actuel)	DEPBDOPS = 1 et (DEPB_22 = 2, NSP, R, ND) et (DEPB_23A < SO ou DEPB_37A < SO ou DEPB_37B < SO)	Âge du répondant au moment du premier épisode dépressif majeur.
ND	DEPBDOPS = ND ou (DEPB_22 = NSP, R, ND) ou (DEPB_22A = NSP, R, ND) ou (DEPB_23A = NSP, R, ND) ou (DEPB_37B = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

19) Épisode dépressif majeur — âge lors du plus récent épisode

Nom de la variable : DEPBDREC

Basée sur : DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_38, DEPB_38C, DEPBDOPS, DHHB_AGE

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique l'âge du répondant lors de l'épisode dépressif le plus récent. La valeur de la variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'épisode dépressif majeur.

Valeur de DEPBDREC	Condition(s)	Explication
SO	(DEPBDOPS = 2)	Le répondant ne remplit pas les critères de l'épisode dépressif majeur.
ND	(DEPB_23A = NSP, R, ND) et (DEPB_38C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
DHHB_AGE	DEPB_38 = 1 et DEPBDOPS = 1	L'âge au moment du plus récent épisode est l'âge courant.

Valeur maximale à (DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_37B, DEPB_38C) lorsque < SO (min : 0; max : Âge actuel)	DEPBDDPS = 1 et (DEPB_38 = 2, NSP, R) et (DEPB_22A < SO ou DEPB_23A < SO ou DEPB_37A < SO ou DEPB_37B < SO ou DEPB_38C < SO)	L'âge au moment du plus récent épisode est l'âge le plus récent pour tous les épisodes dépressifs majeurs rapportés.
ND	DEPBDDPS = ND ou (DEPB_22A = NSP, R, ND) ou (DEPB_23A = NSP, R, ND) ou (DEPB_37A = NSP, R, ND) ou (DEPB_37B = NSP, R, ND) ou (DEPB_38C = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

20) Épisode dépressif majeur – persistance de la dépression (en années)

Nom de la variable : DEPBDPER

Basée sur : DEPBD22Y, DEPBD23Y, DEPBD7CY, DEPBD8AY, DEPBD8BY, DEPBD39Y, DEPBDPS

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique le plus long épisode de dépression vécu par le répondant. Sa valeur est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'épisode dépressif majeur.

Valeur de DEPBDPER	Condition(s)	Explication
SO	(DEPBDDPS = 2)	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'épisode dépressif majeur.
ND	DEPBD39Y = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
Valeur maximale à (DEPBD22Y, DEPBD23Y, DEPBD7CY, DEPBD8AY, DEPBD8BY, DEPBD39Y) lorsque < SO (min : 0; max : Âge actuel)	DEPBDDPS = 1 et (DEPBD22Y < SO ou DEPBD23Y < SO ou DEPBD7CY < SO ou DEPBD8AY < SO ou DEPBD8BY < SO ou DEPBD39Y < SO)	Durée de l'épisode dépressif le plus long vécu par le répondant (en années).
ND	DEPBDDPS = ND ou DEPBD22Y = ND ou DEPBD23Y = ND ou DEPBD7CY = ND ou DEPBD8AY = ND ou DEPBD8BY = ND ou DEPBD39Y = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Épisode dépressif majeur– 12 derniers mois

21) Dépression au cours des 12 derniers mois - critère A

Nom de la variable : DEPBDYA

Basée sur : DEPBDDPS

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l'épisode dépressif majeur au cours de la vie.

Valeur de DEPBDYA	Condition(s)	Explication
1	DEPBDDPS = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant remplit les critères pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie.
2	DEPBDDPS = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant ne remplit pas les critères pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie.
ND	DEPBDDPS = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

22) L'épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois - critère B

Nom de la variable : DEPBDYB

Basée sur : DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_37B, DEPB_38, DEPB_38C, DHHB_AGE

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de DEPBDYB	Condition(s)	Explication
1	DEPB_38 = 1 ou DEPB_22A = DHHB_AGE ou DEPB_23A = DHHB_AGE ou DEPB_37A = DHHB_AGE ou DEPB_37B = DHHB_AGE ou DEPB_38C = DHHB_AGE	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

2	(DEPB_38 = 2, SO) et DEPB_22A < DHHB_AGE ou DEPB_22A = SO et DEPB_23A < DHHB_AGE ou DEPB_23A = SO et DEPB_37A < DHHB_AGE ou DEPB_37A = SO et DEPB_37B < DHHB_AGE ou DEPB_37B = SO et DEPB_38C < DHHB_AGE ou DEPB_38C = SO	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(DEPB_38 = NSP, R, ND) ou (DEPB_22A = NSP, R, ND) ou (DEPB_23A = NSP, R, ND) ou (DEPB_37A = NSP, R, ND) ou (DEPB_37B = NSP, R, ND) ou (DEPB_38C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

23) L'épisode dépressif au cours des 12 derniers mois - critère C

Nom de la variable : DEPBDYC

Basée sur : DEPB_64A, DEPB_64B, DEPB_64C, DEPB_65A, DEPB_65B, DEPB_65C, DEPB_65D, DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D, DEPB_68, DEPB_86

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des symptômes qui induisent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de DEPBDYC	Condition(s)	Explication
1	[DEPB_64A = 3, 4) ou (DEPB_64B = 1, 2) ou (DEPB_64C = 3, 4) ou (DEPB_65A = 3, 4) ou (DEPB_65B = 3, 4) ou (DEPB_65C = 3, 4) ou (DEPB_65D = 3, 4)] ou (4 <= DEPB_66A <= 10 ou 4 <= DEPB_661 <= 10 ou 4 <= DEPB_662 <= 10 ou 4 <= DEPB_66C <= 10 ou 4 <= DEPB_66D <= 10 ou 5 <= DEPB_68 <= 365 ou DEPB_86 = 1)	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(DEPB_64A = 1, 2, SO) et (DEPB_64B = 3, 4, SO) et (DEPB_64C = 1, 2, SO) et (DEPB_65A = 1, 2, SO) et (DEPB_65B = 1, 2, SO) et (DEPB_65C = 1, 2, SO) et (DEPB_65D = 1, 2, SO) et (0 <= DEPB_66A <= 3 ou DEPB_66A = SO) et (0 <= DEPB_661 <= 3 ou DEPB_661 = 11, SO) et (0 <= DEPB_662 <= 3 ou DEPB_662 = 11, SO) et (0 <= DEPB_66C <= 3 ou DEPB_66C = SO) et (0 <= DEPB_66D <= 3 ou DEPB_66D = SO) et (0 <= DEPB_68 <= 4 ou DEPB_68 = SO) et (DEPB_86 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré de détresse cliniquement significative ni d'altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

ND	(DEPB_64A = NSP, R, ND) ou (DEPB_64B = NSP, R, ND) ou (DEPB_64C = NSP, R, ND) ou (DEPB_65A = NSP, R, ND) ou (DEPB_65B = NSP, R, ND) ou (DEPB_65C = NSP, R, ND) ou (DEPB_65D = NSP, R, ND) ou (DEPB_66A = NSP, R, ND) ou (DEPB_661 = NSP, R, ND) ou (DEPB_662 = NSP, R, ND) ou (DEPB_66C = NSP, R, ND) ou (DEPB_66D = NSP, R, ND) ou (DEPB_68 = NSP, R, ND) ou (DEPB_86 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

24) Algorithme pour un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : DEPBDY

Basée sur : DEPBDYA, DEPBDYB, DEPBDYC

Usage antérieur : Aucun

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'algorithme l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères ont déclaré :

1. répondre aux critères d'un épisode dépressif majeur au cours de la vie,
2. avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et
3. une détresse cliniquement significative ou une altération de leur fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Valeur de DEPBDY	Condition(s)	Explication
1	DEPBDYA = 1 et DEPBDYB = 1 et DEPBDYC = 1	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI sont remplis pour l'épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré (1) remplir les critères pour l'épisode dépressif majeur au cours de la vie, (2) avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, et (3) une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

2	DEPBDYA = 2 ou DEPBDYB = 2 ou DEPBDYC = 2	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI ne sont pas remplis pour l'épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré (1) remplir les critères pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie, (2) avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, ni (3) une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	DEPBDYA = ND ou DEPBDYB = ND ou DEPBDYC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

25) Pensées suicidaires au cours de la vie

Nom de la variable : DEPBFSLT

Basée sur : DEPB_A, DEPB_A1

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu'il a déjà pensé à se suicider au cours de sa vie.

Valeur de DEPBFSLT	Condition(s)	Explication
1	DEPB_A = 1 ou DEPB_A1 = 1	Le répondant a sérieusement pensé à se suicider.
2	DEPB_A1 = 2	Le répondant n'a jamais sérieusement pensé à se suicider. Nota : Si DEPB_A = 2, alors la question DEPB_A1 était posée.
ND	(DEPB_A1 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

26) Pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : DEPBFSTY

Basée sur : DEPBA1A, DEPBA1B, DEPBFSLT

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu'il a pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois.

Nota : Dans le questionnaire, la question demandant au répondant s'il avait pensé à se suicider au cours des 12 mois précédents n'a pas été posée à certains répondants. Pour ces répondants, une procédure d'imputation a été utilisée pour attribuer les valeurs pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. La variable qui indique quels répondants ont fait l'objet de cette procédure d'imputation est IMPBFSTY. Pour plus d'information, voir le guide de l'utilisateur.

Valeur de DEPBFSTY	Condition(s)	Explication
1	DEPBA1A = 1 ou DEPBA1B = 1	Le répondant a sérieusement pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois.
2	DEPBFSLT = 2 ou DEPBA1A = 2 ou DEPBA1B = 2	Le répondant n'a jamais sérieusement pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois.
ND	(DEPBA1A = NSP, R, ND) ou (DEPBA1B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
ND	DEPBA1A = SO et DEPBA1B = SO et DEPBFSLT = 1	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant à cause d'une erreur dans les spécifications du questionnaire.

27) Tentative de suicide au cours de la vie

Nom de la variable : DEPBFSLA

Basée sur : DEPBC, DEPBCB, DEPBC1, DEPBFSLT

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu'il a déjà fait une tentative de suicide au cours de sa vie.

Valeur de DEPBFSLA	Condition(s)	Explication
1	DEPBC = 1 ou DEPBCB = 1 ou DEPBC1 = 1	Le répondant a déjà fait une tentative de suicide.
2	DEPBFSLT = 2 ou DEPBCB = 2 ou DEPBC1 = 2	Le répondant n'a jamais fait de tentative de suicide. Nota : Si DEPBC = 2, alors la question DEPBCB était posée.
ND	(DEPBC = NSP, R, ND) ou (DEPBCB = NSP, R, ND) ou (DEPBC1 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

28) Tentative de suicide au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : DEPBFSSYA

Basée sur : DEP_B_C1A

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu'il a déjà fait une tentative de suicide au cours des 12 derniers mois.

Nota : Dans le questionnaire, la question demandant au répondant s'il avait fait une tentative de suicide au cours des 12 mois précédents n'a pas été posée à certains répondants. Pour ces répondants, une procédure d'imputation a été utilisée pour attribuer les valeurs de tentatives de suicide au cours des 12 derniers mois. La variable qui indique quels répondants ont fait l'objet de cette procédure d'imputation est IMPBFSSYA. Pour plus d'information, voir le guide de l'utilisateur.

Valeur de DEPBFSSYA	Condition(s)	Explication
ND	DEPB_A = 1 et DEPB_C = 1 et DEPB_CA = 2	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant à cause d'une erreur dans les spécifications du questionnaire.
1	DEPB_C1A = 1	Le répondant a fait une tentative de suicide au cours des 12 derniers mois.
2	(DEPB_C1A = 2, SO)	Le répondant n'a pas fait de tentative de suicide au cours des 12 derniers mois.
ND	(DEPB_C1A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

29) Trouble attribuable à la dépression – Moyenne

Nom de la variable : DEPBDINT

Basée sur : DEP_B_66A, DEP_B_661, DEP_B_662, DEP_B_66C, DEP_B_66D, DEPBDY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit le trouble que l'épisode dépressif majeur a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois.

Valeur de DEPBDINT	Condition(s)	Explication
SO	DEPBDDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la dépression au cours des 12 derniers mois.
ND	DEPB_66A = SO et DEPB_661 = SO et DEPB_662 = SO et DEPB_66C = SO et DEPB_66D = SO	Le répondant a répondu avoir vécu un épisode de dépression majeure au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'interview mais les questions concernant l'épisode n'ont pas été posées au répondant parce qu'il y avait incohérence dans ses réponses.

ND	DEPBDDY = ND ou (DEPB_66A = NSP, R, ND) ou (DEPB_661 = NSP, R, ND) ou (DEPB_662 = NSP, R, ND) ou (DEPB_66C = NSP, R, ND) ou (DEPB_66D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$(DEPB_66A + DEPB_661 + DEPB_662 + DEPB_66C + DEPB_66D) / 5$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	DEPBDDY = 1 et 0 <= DEPB_66A <= 10 et 0 <= DEPB_661 <= 10 et 0 <= DEPB_662 <= 10 et 0 <= DEPB_66C <= 10 et 0 <= DEPB_66D <= 10	Trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
$(DEPB_66A + DEPB_662 + DEPB_66C + DEPB_66D) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	DEPBDDY = 1 et DEPB_661 = 11 et 0 <= DEPB_662 <= 10 et 0 <= DEPB_66A <= 10 et 0 <= DEPB_66C <= 10 et 0 <= DEPB_66D <= 10	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. DEPB_661 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
$(DEPB_66A + DEPB_661 + DEPB_66C + DEPB_66D) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	DEPBDDY = 1 et 0 <= DEPB_661 <= 10 et DEPB_662 = 11 et 0 <= DEPB_66A <= 10 et 0 <= DEPB_66C <= 10 et 0 <= DEPB_66D <= 10	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. DEPB_662 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
$(DEPB_66A + DEPB_66C + DEPB_66D) / 3$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	DEPBDDY = 1 et DEPB_661 = 11 et DEPB_662 = 11 et 0 <= DEPB_66A <= 10 et 0 <= DEPB_66C <= 10 et 0 <= DEPB_66D <= 10	Trouble = moyenne de trois items qui s'appliquaient au répondant. DEPB_661 et DEPB_662 ne s'appliquaient pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

30) Indicateur du trouble attribuable à la dépression majeure

Nom de la variable : DEPBFINT

Basée sur : DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D, DEPBDDY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit le trouble que l'épisode de dépression majeure a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si l'épisode de dépression majeure perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois.

Valeur de DEPBFINT	Condition(s)	Explication
SO	DEPBDDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode de dépression majeure au cours des 12 derniers mois.

ND	DEPB_66A = SO et DEPB_661 = SO et DEPB_662 = SO et DEPB_66C = SO et DEPB_66D = SO	Le répondant a répondu avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'interview mais les questions concernant l'épisode n'ont pas été posées au répondant parce qu'il y avait incohérence dans ses réponses.
1	DEPBDDY = 1 et (4 <= DEPB_66A <= 10 ou 4 <= DEPB_661 <= 10 ou 4 <= DEPB_662 <= 10 ou 4 <= DEPB_66C <= 10 ou 4 <= DEPB_66D <= 10)	L'épisode dépressif majeur a troublé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
2	DEPBDDY = 1 et 0 <= DEPB_66A <= 3 et (0 <= DEPB_661 <= 3 ou DEPB_661 = 11) et (0 <= DEPB_662 <= 3 ou DEPB_662 = 11) et 0 <= DEPB_66C <= 3 et 0 <= DEPB_66D <= 3	L'épisode dépressif majeur n'a pas troublé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
ND	DEPBDDY = ND ou (DEPB_66A = NSP, R, ND) ou (DEPB_661 = NSP, R, ND) ou (DEPB_662 = NSP, R, ND) ou (DEPB_66C = NSP, R, ND) ou (DEPB_66D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Trouble panique (36 VD)

Pour les besoins de l'ESCC 1.2, le trouble panique est caractérisé par des attaques récurrentes et inattendues de crainte intense et d'anxiété en l'absence d'un vrai danger accompagnées de symptômes physiologiques, comme des palpitations, une douleur à la poitrine, une sensation d'étouffement, une sensation de vertige, de la transpiration, des nausées ou une gêne abdominale, des tremblements ou des bouffées de chaleur ou des frissons.

Les questions sur le trouble panique sont fondées sur une version reconnue du World Mental Health du Composite International Diagnostic Interview (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l'ESCC. L'instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le monde.

Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l'évaluation des troubles mentaux conformément à une opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L'abréviation DSM désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l'ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV ou le DSM-III-R. L'ESCC 1.2 n'offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10.

Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC (interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de travail qui examinera les différences méthodologiques pour s'assurer que les comparaisons entre pays soient faites de façon appropriée.

Le trouble panique est l'un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic du trouble panique au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s'entend des 12 mois qui ont précédé l'interview.

La documentation qui accompagne les données de l'ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récurrence, à la durée, à l'âge au moment de l'apparition et à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses.

En ce qui concerne le trouble panique, les variables d'intérêt sont :

Variable	Concept	Numéro de la variable
PADBATT	Algorithme – vie- attaque	4
PADBDPDS	Algorithme – vie - trouble	8
PADBDATY	Algorithme - 12 mois - attaque	13
PADBDDY	Algorithme – 12 mois - trouble	17
PADBDONA	Apparition – attaque	9
PADBDON	Apparition - trouble	10
PADBDREC	Récurrence	11

PADBDPER	Persistance	12
PADBDINT	Perturbation / trouble – 12 mois	18

Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales ainsi que leurs variables temporaires respectives sont opérationnalisés de façon à satisfaire partiellement aux définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire.

L'instrument de l'ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d'informations sur le nombre de symptômes, la gravité, la durée et l'intensité globale du trouble. Toutefois, l'approche structurée utilisée pour l'instrument informatisé n'est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n'existe aucun algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du trouble. En outre, bien que l'instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour l'opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe.

En plus de l'information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l'utilisation des services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l'ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé que les données de l'ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l'information canadienne déjà recueillie dans le cadre de l'ESCC 1.1 et des cycles de l'ENSP réalisés antérieurement.

Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. Cette correspondance vise uniquement à faciliter l'interprétation des résultats en permettant un langage commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l'existence d'une correspondance directe entre nos critères et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au questionnaire et aux algorithmes.

Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI du trouble panique au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. des attaques de panique récurrentes et inattendues dont au moins une a été suivie pendant un mois ou plus de la crainte d'avoir d'autres attaques ou de préoccupations à propos de leurs conséquences ou d'un changement de comportement important en relation avec les attaques;

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI du trouble panique au cours des 12 derniers mois sont ceux qui :

1. remplissent les critères de diagnostic d'un trouble panique au cours de la vie,
2. déclarent avoir eu une attaque au cours des 12 derniers mois et
3. déclarent avoir éprouvé une détresse émotionnelle.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour une attaque de panique au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. qu'ils ont vécu une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense,
2. qu'ils ont éprouvé au moins quatre symptômes physiologiques et
3. que les symptômes sont survenus de façon brutale ou ont atteint leur niveau le plus fort dans les 10 premières minutes survenu leur apparition.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour une attaque de panique au cours des 12 derniers mois sont ceux qui :

1. remplissent les critères d'une attaque de panique au cours de la vie et
2. déclarent avoir vécu une attaque de panique au cours des 12 derniers mois.

Attaque de panique au cours de la vie

1) Attaque de panique au cours de la vie - critère A

Nom de la variable : PADBDA

Basée sur : SCRB_20, SCRB_20A

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable évalue le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'attaque de panique au cours de la vie. Elle identifie les répondants qui déclarent avoir vécu une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense à un moment donné de leur vie.

Valeur de PADBDA	Condition(s)	Explication
1	SCRB_20 = 1 ou SCRB_20A = 1	Le répondant remplit le critère A d'attaque de panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense.
2	SCRB_20 = 2 et SCRB_20A = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A d'attaque de panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense.
ND	(SCRB_20 = NSP, R, ND) ou (SCRB_20A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une des questions nécessaires au calcul.

2) Attaque de panique au cours de la vie - critère B

Nom de la variable : PADBDB

Basée sur : PADBDB01, PADBDB02, PADBDB03, PADBDB04, PADBDB05, PADBDB06, PADBDB07, PADBDB08, PADBDB09, PADBDB10, PADBDB11, PADBDB12, PADBDB13, PADBDB14

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable évalue le critère B d'attaque de panique au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant a déclaré qu'au moins quatre des 14 symptômes suivants accompagnait l'attaque de panique :

1. palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque,
2. transpiration,
3. tremblements ou frémissements,
4. souffle court,
5. sensation d'étouffement,
6. douleur ou gêne à la poitrine,
7. nausée ou gêne abdominale,
8. sensation de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou impression d'évanouissement,
9. sentiments d'irréalité ou être détaché de soi,
10. peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou,
11. peur de mourir,
12. sensations d'engourdissement ou de picotements,
13. frissons ou bouffées de chaleur,
14. bouche sèche.
- 15.

On crée d'abord les variables pour ces symptômes, puis on les utilise pour calculer la valeur pour le critère B.

Nota : Le questionnaire a été conçu de sorte que l'intervieweur passait à la question PADB_03 aussitôt que le répondant avait répondu par « oui » à quatre des questions PADB_01A à PADB_01P. On a supposé que, une fois qu'une réponse affirmative avait été recueillie pour quatre questions, le critère B de l'attaque de panique ayant trait à la manifestation d'au moins quatre symptômes était rempli. Cependant, cette stratégie de saut de questions ne tenait pas compte du fait que PADB_01G (bouche sèche) n'était pas l'un des symptômes figurant dans l'algorithme original DSM-IV et du fait que PADB_01D et PADB_01M contribuent toutes deux à l'évaluation du même symptôme (sensations de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou impression d'évanouissement). Cela signifiait que les répondants qui avaient répondu affirmativement à quatre questions et sautaient le reste de la liste avant d'atteindre PADB_01P ne déclaraient que trois symptômes et ne remplissaient pas le critère B d'attaque de panique. Le même constat s'applique à ceux qui avaient répondu affirmativement à PADB_01G ou PADB_01D et PADB_01M. Ils ne rencontreront pas le critère B pour une attaque de panique. Ce dernier est un critère nécessaire pour l'attaque de panique et le trouble panique. Après avoir consulté l'équipe du WMH2000, on a ajouté le symptôme 14 (bouche sèche) afin de tenir compte de PADB_01G. Aucune modification n'a été faite pour accommoder PADB_01D et PADB_01M.

2a) Symptôme 1 – palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque

Nom de la variable : PADBDB01

Basée sur : PADB_01A

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des palpitations, des battements de cœur ou une accélération du rythme cardiaque en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB01	Condition(s)	Explication
1	PADB_01A = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de palpitations, de battements de cœur ou d'accélération du rythme cardiaque.
2	(PADB_01A = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de palpitations, de battements de cœur ni d'accélération du rythme cardiaque.
ND	(PADB_01A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2b) Symptôme 2 – transpiration

Nom de la variable : PADBDB02

Basée sur : PADB_01E

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré transpirer en tant que symptôme accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB02	Condition(s)	Explication
1	PADB_01E = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de transpiration.
2	(PADB_01E = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de transpiration.
ND	(PADB_01E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2c) Symptôme 3 – frémissements ou tremblements

Nom de la variable : PADBDB03

Basée sur : PADB_01F

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des tremblements ou des frémissements en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB03	Condition(s)	Explication
1	PADB_01F = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de tremblements ou de frémissements.
2	(PADB_01F = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de tremblements ni de frémissements.
ND	(PADB_01F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2d) Symptôme 4 – sensation de souffle court**Nom de la variable :** PADBDB04**Basée sur :** PADB_01B**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une sensation de souffle court en tant que symptôme accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB04	Condition(s)	Explication
1	PADB_01B = 1	Le répondant a déclaré une sensation de souffle court.
2	(PADB_01B = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de sensation de souffle court.
ND	(PADB_01B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2e) Symptôme 5 – sensation d'étouffement**Nom de la variable :** PADBDB05**Basée sur :** PADB_01H**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une sensation d'étouffement en tant que symptôme accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB05	Condition(s)	Explication
1	PADB_01H = 1	Le répondant a déclaré une sensation d'étouffement.
2	(PADB_01H = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de sensation d'étouffement.
ND	(PADB_01H = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2f) Symptôme 6 – douleur ou gêne thoracique**Nom de la variable :** PADBDB06**Basée sur :** PADB_01I**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une douleur ou une gêne à la poitrine en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB06	Condition(s)	Explication
1	PADB_01I = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de douleur ou de gêne à la poitrine.
2	(PADB_01I = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de douleur ou de gêne à la poitrine.
ND	(PADB_01I = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2g) Symptôme 7 – nausée ou gêne abdominale

Nom de la variable : PADBDB07

Basée sur : PADB_01C

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré de la nausée ou une gêne abdominale en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB07	Condition(s)	Explication
1	PADB_01C = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de nausée ou de gêne abdominale.
2	(PADB_01C = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de nausée ni de gêne abdominale.
ND	(PADB_01C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2h) Symptôme 8 – sensations de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement

Nom de la variable : PADBDB08

Basée sur : PADB_01D, PADB_01M

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des sensations de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou d'évanouissement en tant que symptômes associés à une attaque de panique.

Valeur de PADBDB08	Condition(s)	Explication
1	PADB_01D = 1 ou PADB_01M = 1	Le répondant a déclaré des sensations de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou d'évanouissement.
2	(PADB_01D = 2, SO) et (PADB_01M = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré des sensations de vertige, ni d'instabilité, d'étourdissement et d'évanouissement.
ND	(PADB_01D = NSP, R, ND) ou (PADB_01M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2i) Symptôme 9 – déréalisation ou dépersonnalisation

Nom de la variable : PADBDB09

Basée sur : PADB_01K, PADB_01L

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu la sensation qu'ils « n'étaient pas réellement là » (dépersonnalisation) ou avoir eu la sensation que les choses autour d'eux n'étaient pas réelles ou avaient l'air d'un rêve (déréalisation) en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB09	Condition(s)	Explication
1	PADB_01K = 1 ou PADB_01L = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de déréalisation ou de dépersonnalisation.
2	(PADB_01K = 2, SO) et	Le répondant n'a pas déclaré de

	(PADB_01L = 2, SO)	symptômes de déréalisation ni de dépersonnalisation.
ND	(PADB_01K = NSP, R, ND) ou (PADB_01L = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2j) Symptôme 10 – peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou

Nom de la variable : PADBDB10

Basée sur : PADB_01J

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB10	Condition(s)	Explication
1	PADB_01J = 1	Le répondant a déclaré avoir eu peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou.
2	(PADB_01J = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu peur de perdre le contrôle de soi ni de devenir fou.
ND	(PADB_01J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2k) Symptôme 11 – peur de mourir

Nom de la variable : PADBDB11

Basée sur : PADB_01N

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu peur de mourir en tant que symptôme accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB11	Condition(s)	Explication
1	PADB_01N = 1	Le répondant a déclaré avoir eu peur de mourir.
2	(PADB_01N = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu peur de mourir.
ND	(PADB_01N = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2l) Symptôme 12 – paresthésie

Nom de la variable : PADBDB12

Basée sur : PADB_01P

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu des sensations d'engourdissement ou de picotements (paresthésie) en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB12	Condition(s)	Explication
1	PADB_01P = 1	Le répondant a déclaré de la paresthésie.
2	(PADB_01P = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de paresthésie.

ND	(PADB_01P = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
----	-------------------------	--

2m) Symptôme 13 – frissons ou bouffées de chaleur

Nom de la variable : PADBDB13

Basée sur : PADB_01O

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu des frissons ou des bouffées de chaleur en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB13	Condition(s)	Explication
1	PADB_01O = 1	Le répondant a déclaré avoir eu des frissons ou des bouffées de chaleur.
2	(PADB_01O = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu des frissons ni des bouffées de chaleur.
ND	(PADB_01O = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2n) Symptôme 14 – bouche sèche

Nom de la variable : PADBDB14

Basée sur : PADB_01G

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu la bouche sèche en tant que symptôme accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB14	Condition(s)	Explication
1	PADB_01G = 1	Le répondant a déclaré avoir eu la bouche sèche.
2	(PADB_01G = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu la bouche sèche.
ND	(PADB_01G = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère B d'attaque de panique :

Valeur de PADBDB	Condition(s)	Explication
1	Au moins 4 de (PADBDB01, PADBDB02, PADBDB03, PADBDB04, PADBDB05, PADBDB06, PADBDB07, PADBDB08, PADBDB09, PADBDB10, PADBDB11, PADBDB12, PADBDB13, PADBDB14) = 1	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré au moins quatre des symptômes accompagnant une attaque de panique.
2	Au moins 11 de (PADBDB01, PADBDB02, PADBDB03, PADBDB04, PADBDB05, PADBDB06, PADBDB07, PADBDB08, PADBDB09,	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la vie.

	PADBDB10, PADBDB11, PADBDB12, PADBDB13 PADBDB14) = 2	Le répondant n'a pas déclaré au moins quatre des symptômes accompagnant une attaque de panique.
ND	PADBDB01 = ND ou PADBDB02 = ND ou PADBDB03 = ND ou PADBDB04 = ND ou PADBDB05 = ND ou PADBDB06 = ND ou PADBDB07 = ND ou PADBDB08 = ND ou PADBDB09 = ND ou PADBDB10 = ND ou PADBDB11 = ND ou PADBDB12 = ND ou PADBDB13 = ND ou PADBDB14 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

3) Attaque de panique au cours de la vie - critère C

Nom de la variable : PADBDC

Basée sur : PADB_03

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable évalue le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la vie. Elle identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes de panique ont débuté subitement et ont atteint leur plus fort niveau dans les 10 minutes qui ont suivi le début de l'attaque.

Valeur de PADBDC	Condition(s)	Explication
1	PADB_03 = 1	Le répondant remplit le critère C d'attaque de panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes de panique ont débuté subitement et atteint leur plus fort niveau dans les 10 premières minutes.
2	(PADB_03 = 2, SO, NSP)	Le répondant ne remplit pas le critère C d'attaque de panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré ou ne sait pas si les symptômes ont débuté subitement ou qu'ils ont atteint leur plus fort niveau dans les 10 premières minutes.
ND	(PADB_03 = R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

4) Algorithme pour attaque de panique au cours de la vie

Nom de la variable : PADBDATT

Basée sur : PADBDA, PADBDB, PADBDC

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense;
2. au moins quatre des 14 symptômes suivants associés à la panique : palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque; transpiration; tremblements ou frémissements; sensation de souffle court; sensation d'étouffement; douleur ou gêne thoracique; nausées ou gêne abdominale; sensations de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou impression d'évanouissement; sentiment d'irréalité ou d'être détaché de soi; peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou; peur de mourir; sensations d'engourdissement ou de picotements; frissons ou bouffées de chaleur; bouche sèche; et
3. que les symptômes sont survenus de façon subite et ont atteint leur niveau le plus fort dans les 10 minutes qui ont suivi le début de l'attaque.

Valeur de PADBDATT	Condition(s)	Explication
1	PADBDA = 1 et PADBDB = 1 et PADBDC = 1	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) avoir vécu une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense; (2) avoir éprouvé au moins quatre des symptômes associés à la panique et (3) que les symptômes sont survenus de façon subite et ont atteint leur niveau le plus fort dans les 10 premières minutes.
2	PADBDA = 2 ou PADBDB = 2 ou PADBDC = 2	Le répondant ne remplit pas tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'une attaque de panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré (1) avoir vécu une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense; (2) avoir éprouvé au moins quatre des symptômes associés à la panique ni (3) que les symptômes sont survenus de façon subite et ont atteint leur niveau le plus fort dans les 10 premières minutes (ou le répondant ne sait pas si les symptômes sont survenus de façon subite et on atteint leur niveau le plus fort dans les 10 premières minutes).
ND	PADBDA = ND ou PADBDB = ND ou PADBDC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Trouble panique au cours de la vie

5) Trouble panique au cours de la vie - critère A, partie 1

Nom de la variable : PADBDDA1

Basée sur : PADBDATT, PADB_04, PADB_17A,

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable évalue le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie. La variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir vécu au moins 4 attaques de panique récurrentes et inattendues.

Valeur de PADBDDA1	Condition(s)	Explication
1	PADBDATT = 1 et 3 < PADB_17A < SO	Le répondant remplit le critère A, partie 1 de trouble panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré avoir vécu 4 attaques ou plus de panique récurrentes et inattendues.
2	PADBDATT = 2 ou (PADB_17A = 1, 2, 3, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 1 de trouble panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré avoir vécu des attaques de panique récurrentes et inattendues
ND	PADBDATT = ND ou (PADB_17A = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

6) Trouble panique au cours de la vie - critère A, partie 2

Nom de la variable : PADBDDA2

Basée sur : PADBDAA, PADBDAB, PADBDAC

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable évalue le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie. La variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu, à la suite d'au moins une attaque, pendant un mois ou plus, au moins un des symptômes suivants :

1. crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique;
2. crainte que quelque chose de terrible puisse lui arriver à cause des attaques comme un accident de voiture, une crise cardiaque ou la perte du contrôle de soi-même;
3. avoir changé ses activités quotidiennes à cause des attaques ou avoir évité certaines situations par peur d'avoir d'autres attaques.

On commence par créer une variable pour chaque symptôme, puis on les utilise pour calculer la valeur pour le critère A, partie 2.

6a) Symptôme 1 – crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique**Nom de la variable :** PADBDDAA**Basée sur :** PADB_13A**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel ils ont souvent craint d'avoir une autre attaque.

Valeur de PADBDDAA	Condition(s)	Explication
1	PADB_13A = 1	Le répondant a déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel il a souvent craint d'avoir une autre attaque.
2	(PADB_13A = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel il a souvent craint d'avoir une autre attaque.
ND	(PADB_13A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

6b) Symptôme 2 – préoccupations à propos des implications possibles de l'attaque ou de ses conséquences**Nom de la variable :** PADBDDAB**Basée sur :** PADB_13B**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel ils ont craint que quelque chose de terrible puisse leur arriver à cause de leurs attaques, comme un accident de voiture, une crise cardiaque ou la perte du contrôle de soi.

Valeur de PADBDDAB	Condition(s)	Explication
1	PADB_13B = 1	Le répondant a déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel il a craint que quelque chose de terrible puisse lui arriver à cause de ses attaques.
2	(PADB_13B = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel il a craint que quelque chose de terrible puisse lui arriver à cause de ses attaques.
ND	(PADB_13B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

6c) Symptôme 3 – changement de comportement important en relation aux attaques

Nom de la variable : PADBDDAC

Basée sur : PADB_13C, PADB_13D, PADB_42

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si au moins l'une des attaques a été suivie par un mois ou plus de changement de comportement important en relation aux attaques. Ces répondants ont déclaré avoir changé leurs activités quotidiennes ou évité certaines situations par peur d'avoir une autre attaque.

Valeur de PADBDDAC	Condition(s)	Explication
1	PADB_13C = 1 ou PADB_13D = 1 ou (PADB_42 = 1, 2)	Le répondant a déclaré un mois ou plus de changement de comportement important en relation aux attaques.
2	(PADB_13C = 2, SO) et (PADB_13D = 2, SO) et (PADB_42 = 3, 4, 5, SO)	Le répondant n'a pas déclaré un mois ou plus de changement de comportement important en relation aux attaques.
ND	(PADB_13C = NSP, R, ND) ou (PADB_13D = NSP, R, ND) ou (PADB_42 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaire au calcul.

Évaluation du critère A, partie 2 de trouble panique :

Valeur de PADBDDA2	Condition(s)	Explication
1	PADBDDAA = 1 ou PADBDDAB = 1 ou PADBDDAC = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 2 de trouble panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré avoir eu un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou de préoccupations à propos des implications des attaques ou de changement de comportement en relation aux attaques.
2	PADBDDAA = 2 et PADBDDAB = 2 et PADBDDAC = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 2 de trouble panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré avoir eu un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ni de préoccupations à propos des implications des attaques ni de changement de comportement en relation aux attaques.
ND	PADBDDAA = ND ou PADBDDAB = ND ou PADBDDAC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

7) Trouble panique au cours de la vie - critère A (Parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : PADBDDA

Basée sur : PADBDDA1, PADBDDA2

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de L'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère ont déclaré :

1. avoir vécu 4 attaques de panique récurrentes et inattendues ou plus et
2. qu'au moins une des attaques était accompagnée pendant un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou de préoccupations à propos des implications de l'attaque ou de ses conséquences ou d'un changement de comportement important en relation aux attaques.

Valeur de PADBDDA	Condition(s)	Explication
1	PADBDDA1 = 1 et PADBDDA2 = 1	Le répondant remplit le critère A de trouble panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) avoir eu 4 attaques de panique récurrentes et inattendues ou plus et (2) qu'au moins une des attaques était accompagnée pendant un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou d'un changement de comportement en relation aux attaques.
2	PADBDDA1 = 2 ou PADBDDA2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de trouble panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré (1) avoir eu 4 attaques de panique récurrentes et inattendues ou plus ou (2) avoir eu un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou de changement de comportement en relation aux attaques.
ND	PADBDDA1 = ND ou PADBDDA2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

8) Algorithme pour le trouble panique au cours de la vie

Nom de la variable : PADBDPDS

Basée sur : PADBDDA

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de L'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. avoir eu au moins 4 attaques récurrentes et inattendues de panique,
2. qu'au moins une des attaques s'est accompagnée pendant un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques, de préoccupations à cause des conséquences des attaques ou de changement de comportement en relation aux attaques.

Valeur de PADBDPDS	Condition(s)	Explication
1	PADBDDA = 1	<p>Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie.</p> <p>Le répondant a déclaré (1) avoir eu au moins 4 attaques de panique récurrentes et inattendues; (2) qu'au moins une des attaques s'est accompagnée d'un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou d'un changement de comportement important en relation aux attaques.</p>
2	PADBDDA = 2	<p>Le répondant ne remplit pas tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie.</p> <p>Le répondant n'a pas déclaré (1) avoir eu 4 attaques de panique récurrentes et inattendues ou plus, (2) au moins un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou de changement de comportement en relation aux attaques.</p>
ND	PADBDDA = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

9) Attaque de panique – âge au moment de l'apparition

Nom de la variable : PADBDONA

Basée sur : PADB_04, PADB_06, PADB_07, PADB_07A, PADB_07B, PADB_09A, PADB_09B, PADB_21, PADB_37A, DHHB_AGE

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant au moment de la première attaque de panique. Cette variable est calculée pour tous les répondants qui ont répondu aux questions requises pour le calcul, peu importe si les critères de L'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble de panique sont remplis.

Valeur de PADBDONA	Condition(s)	Explication
SO	PADB_04 = SO	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant.
Valeur à DHHB_AGE	PADB_04 = 1 et (PADB_06 = 1, 2, 3)	L'âge au moment de l'apparition est l'âge courant. Le répondant a déclaré une seule attaque de panique au cours de la vie.
Valeur à PADB_07A	PADB_04 = 1 et (PADB_06 = 4, NSP, R) et PADB_07 = 1 et PADB_07A < SO	L'âge de l'apparition est l'âge qu'avait le répondant au moment de l'unique attaque de panique. Le répondant a déclaré une seule attaque de panique au cours de la vie.
Valeur à PADB_07B	PADB_04 = 1 et (PADB_06 = 4, NSP, R) et (PADB_07 = 2, NSP) et PADB_07B < SO	L'âge au moment de l'apparition est l'âge qu'avait le répondant au moment de l'unique attaque de panique. Le répondant a déclaré une attaque de panique au cours de la vie.
Valeur minimale à (PADB_09A, PADB_09B, PADB_21, PADB_37A)	2 <= PADB_04 < SO et (PADB_09A < SO ou PADB_09B < SO ou PADB_21 < SO ou PADB_37A < SO)	L'âge au moment de l'apparition est l'âge qu'avait le répondant au moment de la première attaque de panique. Le répondant a rapporté au moins deux attaques de panique au cours de sa vie.
ND	(PADB_04 = NSP, R, ND) ou PADB_06 = ND ou (PADB_07 = R, ND) ou (PADB_07A = NSP, R, ND) ou (PADB_07B = NSP, R, ND) ou (PADB_09B = NSP, R, ND) ou (PADB_21 = NSP, R, ND) ou (PADB_37A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

10) Trouble panique – âge au moment de l'apparition

Nom de la variable : PADBDON

Basée sur : PADBDONA, PADBDPDS

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant au début du premier épisode de trouble panique. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de L'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble de panique au cours de la vie.

Valeur de PADBDON	Condition(s)	Explication
Valeur à PADBDONA	PADBDPDS = 1 et PADBDONA < ND	L'âge au moment de l'apparition est l'âge du répondant au moment de sa première attaque de panique rapportée.
SO	(PADBDPDS = 2, SO)	Le répondant ne remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble de panique au cours de la vie.
ND	PADBDPDS = ND ou PADBDONA = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Reformatages Temporaires

Reformatage	Explication
Si (PADB_10D = NSP, R, ND) alors PADRQ10D = manquant Si (PADB_37A = NSP, R, ND) alors PADRQ37A = manquant	Recodé non-réponse à manquant.

11) Trouble panique– âge lors de la plus récente attaque

Nom de la variable : PADBDREC

Basée sur : PADBDPDS, PADB_10, PADB_10D, PADB_37A, DHHB_AGE

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique l'âge du répondant lors de la dernière attaque de panique. La valeur de cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie.

Valeur de PADBDREC	Condition(s)	Explication
SO	PADBDPDS = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie.
DHHB_AGE	PADBDPDS = 1 et PADB_10 = 1	L'âge au moment de la plus récente attaque est l'âge courant si le répondant a déclaré une attaque au cours des 12 derniers mois.
Valeur maximale de (PADRQ10D, PADRQ37A)	PADBDPDS = 1 et (PADB_10D < SO ou PADB_37A < SO)	L'âge au moment de la plus récente attaque est l'âge le plus avancé pour l'ensemble des attaques de panique déclarées.
ND	PADBDPDS = ND ou	Le répondant a une valeur de non-

	PADB_10D = NSP, R, ND ou PADB_37A = NSP, R, ND	réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
--	---	--

12) Trouble panique – persistance du trouble panique

Nom de la variable : PADBDPER

Basée sur : PADBDPDS, PADBDON, PADBDREC

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique la plus longue période pendant laquelle le répondant a éprouvé des symptômes accompagnant une attaque de panique. La valeur de cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble de panique. Elle correspond à la différence, en années, entre l'âge au moment de la première attaque de panique et celui au moment de la plus récente attaque de panique.

Valeur de PADBDPER	Condition(s)	Explication
SO	PADBDPDS = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique.
PADBDREC - PADBDON	PADBDPDS = 1 et PADBDREC < SO et PADBDON < SO	La persistance est le nombre d'années écoulées entre la première attaque de panique et la plus récente attaque de panique.
ND	PADBDPDS = ND ou PADBDREC = ND ou PADBDON = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Attaque de panique – Au cours des 12 derniers mois

13) Attaque de panique au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : PADBDATY

Basée sur : PADB_06, PADB_07A, PADB_07B, PADB_09A, PADB_09B, PADB_10, PADB_10D, PADB_21, DHHB_AGE

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois précédant l'interview.

Valeur de PADBDATY	Condition(s)	Explication
1	PADBDATT = 1 et [(PADB_06 = 1, 2, 3) ou PADB_10 = 1 ou PADB_07A = DHHB_AGE ou PADB_07B = DHHB_AGE ou PADB_09A = DHHB_AGE ou PADB_09B = DHHB_AGE ou PADB_10D = DHHB_AGE ou PADB_21 = DHHB_AGE]	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours des 12 derniers mois sont remplis. Le répondant a déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	PADBDATT = 2 ou [PADB_06 = 4 et (PADB_07A < DHHB_AGE ou	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour une attaque de panique au cours des 12 derniers

	PADB_07B < DHHB_AGE)] ou [PADB_10 = 2 et (PADB_09A < DHHB_AGE ou PADB_09B < DHHB_AGE)] ou (PADB_10D < DHHB_AGE et PADB_21 < DHHB_AGE) ou (PADB_06 = SO et PADB_10 = SO) et (PADB_10D = SO et PADB_21 = SO)	mois ne sont pas remplis. Le répondant n'a pas déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Nota : PADB_06, PADB_07A, PADB_07B ont été posées uniquement si une seule attaque a été déclarée et les autres questions ont été posées uniquement si plus d'une attaque a été déclarée.
ND	PADBDATT= ND ou (PADB_06 = NSP, R, ND) ou (PADB_07A = NSP, R, ND) ou (PADB_07B = NSP, R, ND) ou (PADB_10 = NSP, R, ND) ou (PADB_09A = NSP, R, ND) ou (PADB_09B = NSP, R, ND) ou (PADB_10D = NSP, R, ND) ou (PADB_21 = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

14) Trouble panique au cours des 12 derniers mois - critère A

Nom de la variable : PADBDYA

Basée sur : PADBDPDS

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie.

Valeur de PADBDYA	Condition(s)	Explication
1	PADBDPDS = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant remplit les critères de diagnostic de trouble panique au cours de la vie.
2	PADBDPDS = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant ne remplit pas les critères de diagnostic de trouble panique au cours de la vie.
ND	(PADBDPDS = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

15) Trouble panique au cours des 12 derniers mois - critère B**Nom de la variable :** PADBDYB**Basée sur :** PADB_09A, PADB_09B, PADB_10, PADB_10D, PADB_21, DHHB_AGE**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de PADBDYB	Condition(s)	Explication
1	PADB_10 = 1 ou PADB_09A = DHHB_AGE ou PADB_09B = DHHB_AGE ou PADB_10D = DHHB_AGE ou PADB_21 = DHHB_AGE	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	PADB_10 = 2 et (PADB_09A < DHHB_AGE ou PADB_09B < DHHB_AGE) et PADB_10D < DHHB_AGE et (PADB_21 < DHHB_AGE ou PADB_21 = SO) ou PADB_10 = SO et PADB_09A = SO et PADB_09B = SO et PADB_10D = SO et PADB_21 = SO	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(PADB_10 = NSP, R, ND) ou (PADB_09A = NSP, R, ND) ou (PADB_09B = NSP, R, ND) ou (PADB_10D = NSP, R, ND) ou (PADB_21 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaire au calcul.

16) Trouble panique au cours des 12 derniers mois - critère C**Nom de la variable :** PADBDYC**Basée sur :** PADB_40**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé une détresse émotionnelle importante durant une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de PADBDYC	Condition(s)	Explication
1	(PADB_40 = 3, 4, 5)	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré avoir éprouvé une détresse émotionnelle significative lors d'une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(PADB_40 = 1, 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois.

		Le répondant n'a pas déclaré avoir éprouvé une détresse émotionnelle significative lors d'une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(PADB_40 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

17) Algorithme pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : PADBDDY

Basée sur : PADBDYA, PADBDYB, PADBDYC

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères ont déclaré :

1. remplir les critères de trouble panique au cours de la vie,
2. avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, et
3. avoir éprouvé une détresse émotionnelle importante durant une attaque de panique survenue au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de PADBDDY	Condition(s)	Explication
1	PADBDYA = 1 et PADBDYB = 1 et PADBDYC = 1	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI sont remplis pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré (1) remplir les critères de trouble panique au cours de la vie, (2) avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, et (3) avoir éprouvé une détresse émotionnelle importante durant une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	PADBDYA = 2 ou PADBDYB = 2 ou PADBDYC = 2	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI ne sont pas remplis pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré (1) remplir les critères de trouble panique au cours de la vie, (2) avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview ou (3) avoir éprouvé une détresse émotionnelle importante durant une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	PADBDYA = ND ou	Le répondant a une valeur de non-

	PADBDDYB = ND ou PADBDYC = ND	réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.
--	----------------------------------	--

18) Trouble attribuable au trouble panique – moyenne

Nom de la variable : PADBDINT

Basée sur : PADB_44A, PADB_441, PADB_442, PADB_44C, PADB_44D, PADBDYD

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit la perturbation que le trouble panique a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois.

Valeur de PADBDINT	Condition(s)	Explication
SO	PADBDYD = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois.
ND	PADBDYD = ND ou (PADB_44A = NSP, R, ou ND) ou (PADB_441 = NSP, R, ou ND) ou (PADB_442 = NSP, R, ou ND) ou (PADB_44C = NSP, R, ou ND) ou (PADB_44D = NSP, R, ou ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$(PADB_{44A} + PADB_{441} + PADB_{442} + PADB_{44C} + PADB_{44D}) / 5$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PADBDYD = 1 et 0 <= PADB_441 <= 10 et 0 <= PADB_442 <= 10 et 0 <= PADB_44A <= 10 et 0 <= PADB_44C <= 10 et 0 <= PADB_44D <= 10	Trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
$(PADB_{44A} + PADB_{442} + PADB_{44C} + PADB_{44D}) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PADBDYD = 1 et PADB_441 = 11 et 0 <= PADB_442 <= 10 et 0 <= PADB_44A <= 10 et 0 <= PADB_44C <= 10 et 0 <= PADB_44D <= 10	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. PADB_441 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
$(PADB_{44A} + PADB_{441} + PADB_{44C} + PADB_{44D}) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PADBDYD = 1 et 0 <= PADB_441 <= 10 et PADB_442 = 11 et 0 <= PADB_44A <= 10 et 0 <= PADB_44C <= 10 et 0 <= PADB_44D <= 10	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. PADB_442 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
$(PADB_{44A} + PADB_{44C} + PADB_{44D}) / 3$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PADBDYD = 1 et PADB_441 = 11 et PADB_442 = 11 et 0 <= PADB_44A <= 10 et 0 <= PADB_44C <= 10 et 0 <= PADB_44D <= 10	Trouble = moyenne de trois items qui s'appliquaient au répondant. PADB_441 et PADB_442 ne s'appliquaient pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

19) Indicateur du trouble attribuable au trouble panique

Nom de la variable : PADBFINT

Basée sur : PADB_44A, PADB_441, PADB_442, PADB_44C, PADB_44D, PADBDDY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit la perturbation que le trouble panique a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si le trouble panique trouble de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois.

Valeur de PADBFINT	Condition(s)	Explication
SO	PADBDDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois.
1	PADBDDY = 1 et (4 <= PADB_44A <= 10 ou 4 <= PADB_441 <= 10 ou 4 <= PADB_442 <= 10 ou 4 <= PADB_44C <= 10 ou 4 <= PADB_44D <= 10)	Le trouble panique a troublé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
2	PADBDDY = 1 et [0 <= PADB_44A <= 3 et (0 <= PADB_441 <= 3 ou PADB_441 = 11) et (0 <= PADB_442 <= 3 ou PADB_442 = 11) et 0 <= PADB_44C <= 3 et 0 <= PADB_44D <= 3]	Le trouble panique n'a pas perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne au cours des 12 derniers mois.
ND	PADBDDY = ND ou (PADB_44A = NSP, R, ou ND) ou (PADB_441 = NSP, R, ou ND) ou (PADB_442 = NSP, R, ou ND) ou (PADB_44C = NSP, R, ou ND) ou (PADB_44D = NSP, R, ou ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Phobie sociale (22 VD)

Pour les besoins de l'ESCC 1.2, la phobie sociale est caractérisée par une peur persistante, irrationnelle, de situations durant lesquelles la personne pourrait être observée attentivement et jugée par autrui, comme prendre la parole en public, manger ou utiliser des installations publiques. Les symptômes incluent l'évitement ou l'anticipation anxieuse des situations redoutées et des symptômes physiques tels que l'augmentation du rythme cardiaque, des nausées, la bouche sèche, des sueurs, des douleurs à la poitrine, des vertiges, des étourdissements et des attaques de panique.

Les questions sur la phobie sociale sont fondées sur une version reconnue du World Mental Health du Composite International Diagnostic Interview (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l'ESCC. L'instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le monde.

Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l'évaluation des troubles mentaux conformément à l'opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L'abréviation DSM désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l'ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV ou le DSM-III-R. L'ESCC 1.2 n'offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10.

Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC (interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de travail qui examinera les différences méthodologiques pour s'assurer que les comparaisons entre pays soient faites de façon appropriée.

La phobie sociale est l'un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic de la phobie sociale au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s'entend des 12 mois qui ont précédé l'interview.

La documentation qui accompagne les données de l'ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récurrence, à la durée, à l'âge au moment de l'apparition et à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses.

En ce qui concerne la phobie sociale, les variables d'intérêt sont :

Variable	Concept	Numéro d la variable
SOPBDSP	Algorithme – vie	13
SOPBDPY	Algorithme - 12 mois	19
SOPBDON	Apparition	15
SOPBDREC	Récurrence	14
SOPBDINT	Perturbation / Trouble – 12 mois	20

Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées à une phobie sociale, ainsi que leurs variables temporaires respectives sont opérationnalisés de façon à satisfaire partiellement aux

définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire.

L'instrument de l'ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d'informations sur le nombre de symptômes, la gravité, la durée et l'intensité globale du trouble. Toutefois, l'approche structurée utilisée pour l'instrument informatisé n'est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n'existe aucun algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du trouble. En outre, bien que l'instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour l'opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe.

En plus de l'information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l'utilisation des services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l'ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé que les données de l'ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l'information canadienne déjà recueillie dans le cadre de l'ESCC 1.1 et des cycles de l'ENSP réalisés antérieurement.

Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. Cette correspondance vise uniquement à faciliter l'interprétation des résultats en permettant un langage commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l'existence d'une correspondance directe entre nos critères et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au questionnaire et aux algorithmes.

Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. qu'ils éprouvent une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui, et craignent d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante,
2. que l'exposition à la situation sociale redoutée provoque de façon quasi-systématique une anxiété qui peut prendre la forme d'une attaque de panique,
3. qu'ils reconnaissent le caractère excessif ou irraisonné de la peur,
4. qu'ils évitent les situations sociales ou de performance redoutées ou les vivent avec une anxiété et une détresse intenses,
5. que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations sociales ou de performance redoutées perturbe, de façon importante, leurs habitudes, leurs activités professionnelles (scolaires) ou leurs activités sociales ou leurs relations avec autrui et
6. chez les individus de moins de 18 ans, que la durée est d'au moins six mois.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois :

1. remplissent les critères de diagnostic de la phobie sociale au cours de la vie,
2. déclarent avoir vécu un épisode au cours des 12 derniers mois et
3. déclarent une altération marquée de leur fonctionnement professionnel ou social.

Phobie sociale au cours de la vie

1) Phobie sociale au cours de la vie - critère A, partie 1

Nom de la variable : SOPBDA1

Basée sur : SOPB_01A, SOPB_01B, SOPB_01C, SOPB_01D, SOPB_01E, SOPB_01F, SOPB_01G, SOPB_01H, SOPB_01I, SOPB_01J, SOPB_01K, SOPB_01L, SOPB_01M, SOPB_01N

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent une peur intense et persistante d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui.

Valeur de SOPBDA1	Condition(s)	Explication
1	SOPB_01A = 1 ou SOPB_01B = 1 ou SOPB_01C = 1 ou SOPB_01D = 1 ou SOPB_01E = 1 ou SOPB_01F = 1 ou SOPB_01G = 1 ou SOPB_01H = 1 ou SOPB_01I = 1 ou SOPB_01J = 1 ou SOPB_01K = 1 ou SOPB_01L = 1 ou SOPB_01M = 1 ou SOPB_01N = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles il est en contact avec des gens non familiers ou bien peut être exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui.
2	(SOPB_01A = 2, 3, SO) et (SOPB_01B = 2, 3, SO) et (SOPB_01C = 2, 3, SO) et (SOPB_01D = 2, 3, SO) et (SOPB_01E = 2, 3, SO) et (SOPB_01F = 2, 3, SO) et (SOPB_01G = 2, 3, SO) et (SOPB_01H = 2, 3, SO) et (SOPB_01I = 2, 3, SO) et (SOPB_01J = 2, 3, SO) et (SOPB_01K = 2, 3, SO) et (SOPB_01L = 2, 3, SO) et (SOPB_01M = 2, 3, SO) et (SOPB_01N = 2, 3, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré éprouver une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles il est en contact avec des gens non familiers ou peut être exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui.
ND	(SOPB_01A = NSP, R, ND) ou (SOPB_01B = NSP, R, ND) ou (SOPB_01C = NSP, R, ND) ou (SOPB_01D = NSP, R, ND) ou (SOPB_01E = NSP, R, ND) ou (SOPB_01F = NSP, R, ND) ou (SOPB_01G = NSP, R, ND) ou (SOPB_01H = NSP, R, ND) ou (SOPB_01I = NSP, R, ND) ou (SOPB_01J = NSP, R, ND) ou (SOPB_01K = NSP, R, ND) ou (SOPB_01L = NSP, R, ND) ou (SOPB_01M = NSP, R, ND) ou (SOPB_01N = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Phobie sociale au cours de la vie - critère A, partie 2

Nom de la variable : SOPBDA2

Basée sur : SOPB_12, SOPB_12A, SOPB_13, SOPB_14

Usage Antérieur : Aucun

Description : La variable identifie les répondants qui déclarent craindre d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante.

Valeur de SOPBDA2	Condition(s)	Explication
1	SOPB_12 = 1 ou SOPB_12A = 1 ou SOPB_13 = 1 ou SOPB_14 = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré craindre d'agir de façon embarrassante ou humiliante.
2	(SOPB_12 = 2, SO) et (SOPB_12A = 2, SO) et (SOPB_13 = 2, SO) et (SOPB_14 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré craindre d'agir de façon embarrassante ou humiliante.
ND	(SOPB_12 = NSP, R, ND) ou (SOPB_12A = NSP, R, ND) ou (SOPB_13 = NSP, R, ND) ou (SOPB_14 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

3) Phobie sociale au cours de la vie - critère A (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : SOPBDA

Basée sur : SOPBDA1, SOPBDA2

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère déclarent :

1. éprouver une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui, et
2. craindre d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante.

Valeur de SOPBDA	Condition(s)	Explication
1	SOPBDA1 = 1 et SOPBDA2 = 1	Le répondant remplit le critère A de phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) éprouver une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles il est en contact avec des gens non familiers ou bien peut être exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui, et (2) craindre d'agir (ou

		de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante.
2	SOPBDA1 = 2 ou SOPBDA2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré (1) éprouver une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles il est en contact avec des gens non familiers ou bien peut être exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui, ou (2) craindre d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante.
ND	(SOPBDA1 = ND) ou (SOPBDA2 = ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

4) Phobie sociale au cours de la vie - critère B

Nom de la variable : SOPBDB

Basée sur : SCRB_291

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère déclarent que l'exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété qui peut prendre la forme d'une attaque de panique liée à la situation ou bien facilitée par la situation.

Valeur de SOPBDB	Condition(s)	Explication
1	SCRB_291 = 1	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré que l'exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété.
2	(SCRB_291 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que l'exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété.

ND	(SCRB_291 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
----	-------------------------	--

5) Phobie sociale au cours de la vie - critère C

Nom de la variable : SOPBDC

Basée sur : SCR_B_293

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère reconnaissent que leur peur est excessive ou irraisonnée.

Valeur de SOPBDC	Condition(s)	Explication
1	SCR_B_293 = 1	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant reconnaît que sa peur est excessive ou irraisonnée.
2	(SCR_B_293 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant ne reconnaît pas que sa peur est excessive ou irraisonnée.
ND	(SCR_B_293 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

6) Phobie sociale au cours de la vie - critère D, partie 1

Nom de la variable : SOPBDD1

Basée sur : SCR_B_292, SOPB_20

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent éviter la ou les situations sociales ou de performance redoutées.

Valeur de SOPBDD1	Condition(s)	Explication
1	SCR_B_292 = 1 ou (SOPB_20 = 1, 2, 3)	Le répondant remplit le critère D, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré éviter la ou les situations sociales ou de performance redoutées.
2	(SCR_B_292 = 2, SO) et (SOPB_20 = 4, 5, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère D, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré éviter

		la ou les situations sociales ou de performance redoutées.
ND	(SCRB_292 = NSP, R, ND) ou (SOPB_20 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

7) Phobie sociale au cours de la vie - critère D, partie 2

Nom de la variable : SOPBDD2

Basée sur : SCRIB_291, SOPBD09, SOPB_10, SOPB_19

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré vivre la ou les situations sociales ou de performance redoutées avec une anxiété et une détresse intenses. On crée d'abord les deux variables, puis on les utilise pour évaluer le critère D, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI.

7a) Variable temporaire

Nom de la variable : SOPBT9NO

Basée sur : SOPB_09N, SOPB_09O

Description : Cette variable est utilisée pour le calcul de SOPBD09 et créée ici parce que la question SOPB_09O n'est pas posée si la réponse à SOPB_09N est « oui ». Elle identifie les répondants qui déclarent avoir eu, lorsqu'ils se trouvaient dans une situation sociale ou de performance redoutée :

1. l'impression ne pas « vraiment être là », comme s'ils étaient en train de se regarder dans un film (dépersonnalisation) ou
2. l'impression que les choses autour d'eux n'étaient pas réelles ou qu'ils étaient comme dans un rêve (déréalisation).

Valeur de SOPBT9NO	Condition(s)	Explication
1	SOPB_09N = 1 ou SOPB_09O = 1	Le répondant a déclaré des sentiments de dépersonnalisation ou de déréalisation lorsqu'il était dans une situation redoutée.
2	(SOPB_09N = 2, SO) et (SOPB_09O = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de sentiments de dépersonnalisation ni de déréalisation lorsqu'il était dans une situation redoutée.
ND	(SOPB_09N = NSP, R, ND) ou (SOPB_09O = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Valeur de SOPBD09	Condition(s)	Explication
1	Au moins 2 de (SOPB_09A, SOPB_09B, SOPB_09C, SOPB_09D, SOPB_09E, SOPB_09F, SOPB_09G, SOPB_09H, SOPB_09I, SOPB_09J, SOPB_09K, SOPB_09L, SOPB_09M, SOPBT9NO) = 1	Le répondant a déclaré au moins deux réactions de type panique lors de l'exposition à une situation sociale ou de performance redoutée.
2	Au moins 13 de (SOPB_09A, SOPB_09B, SOPB_09C, SOPB_09D, SOPB_09E, SOPB_09F, SOPB_09G, SOPB_09H, SOPB_09I, SOPB_09J, SOPB_09K, SOPB_09L, SOPB_09M, SOPBT9NO) = 2, SO	Le répondant n'a pas déclaré deux réactions de type panique lors de l'exposition à une situation sociale ou de performance redoutée.
ND	(SOPB_09A = NSP, R, ND) ou (SOPB_09B = NSP, R, ND) ou (SOPB_09C = NSP, R, ND) ou (SOPB_09D = NSP, R, ND) ou (SOPB_09E = NSP, R, ND) ou (SOPB_09F = NSP, R, ND) ou (SOPB_09G = NSP, R, ND) ou (SOPB_09H = NSP, R, ND) ou (SOPB_09I = NSP, R, ND) ou (SOPB_09J = NSP, R, ND) ou (SOPB_09K = NSP, R, ND) ou (SOPB_09L = NSP, R, ND) ou (SOPB_09M = NSP, R, ND) ou (SOPBT9NO = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

7b) Symptômes d'anxiété ou de panique

Nom de la variable : SOPBD09

Basée sur : SOPB_09A, SOPB_09B, SOPB_09C, SOPB_09D, SOPB_09E, SOPB_09F, SOPB_09G, SOPB_09H, SOPB_09I, SOPB_09J, SOPB_09K, SOPB_09L, SOPB_09M, SOPBT9NO

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé au moins deux réactions physiologiques ou de type panique lors de l'exposition à une situation sociale ou de performance redoutée.

Évaluation du critère D, partie 2 de la phobie sociale au cours de la vie :

Valeur de SOPBDD2	Condition(s)	Explication
1	SCRB_291 = 1 et [SOPBD09 = 1 ou (SOPB_19 = 4, 5) ou SOPB_10 = 1]	Le répondant remplit le critère D, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les situations sociales ou de performances redoutées sont vécues avec une anxiété ou une détresse intense.
2	[(SCRB_291 = 2, SO) ou SOPBD09 = 2] et (SOPB_19 = 1, 2, 3, SO) et (SOPB_10 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère D, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que les situations sociales ou de performance redoutée sont vécues

		avec une anxiété ou une détresse intense.
ND	(SCRB_291 = NSP, R, ND) ou SOPBD09 = ND ou (SOPB_19 = NSP, R, ND) ou (SOPB_10 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

8) Phobie sociale au cours de la vie - critère D (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : SOPBDD

Basée sur : SOPBDD1, SOPBDD2

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère déclarent :

1. que les situations sociales ou de performance redoutées sont évitées ou
2. que les situations sociales ou de performance redoutées sont vécues avec une anxiété ou une détresse intense.

Valeur de SOPBDD	Condition(s)	Explication
1	SOPBDD1 = 1 ou SOPBDD2 = 1	Le répondant remplit le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) éviter les situations redoutées ou (2) éprouver une anxiété ou une détresse intense dans les situations redoutées.
2	SOPBDD1 = 2 et SOPBDD2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré éviter les situations redoutées ni éprouver une anxiété intense quand il se trouve dans les situations redoutées.
ND	SOPBDD1 = ND ou SOPBDD2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

9) Phobie sociale au cours de la vie - critère E

Nom de la variable : SOPBDE

Basée sur : SOPB_16, SOPBD215, SOPB_23, SOPB_25

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations sociales ou de performances redoutées perturbe de façon importante leurs activités routinières, leur fonctionnement professionnel ou scolaire, ou bien leurs activités sociales ou leurs relations avec autrui. On calcule d'abord une variable pour la perturbation du fonctionnement social ou professionnel au cours des 12 derniers mois, puis on l'utilise pour calculer la valeur pour le critère E.

9a) Perturbation sociale et professionnelle

Nom de la variable : SOPBD215

Basée sur : SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si, durant la période d'un mois ou plus au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview durant laquelle les symptômes étaient les plus sévères, les sentiments de peur du répondant concernant les situations sociales ou de performance ont perturbé significativement ses activités à la maison, à l'école ou au travail ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.

Valeur de SOPBD215	Condition(s)	Explication
1	5 <= SOPB_21A <= 10 ou 5 <= SOPB_211 <= 10 ou 5 <= SOPB_212 <= 10 ou 5 <= SOPB_21C <= 10 ou 5 <= SOPB_21D <= 10	Le répondant a déclaré une perturbation significative de ses activités à la maison, au travail ou à l'école, ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale .
2	(0 <= SOPB_21A <= 4 ou SOPB_21A = SO) et [0 <= SOPB_211 <= 4 ou (SOPB_211 = 11, SO)] et [0 <= SOPB_212 <= 4 ou (SOPB_212 = 11, SO)] et (0 <= SOPB_21C <= 4 ou SOPB_21C = SO) et (0 <= SOPB_21D <= 4 ou SOPB_21D = SO)	Le répondant n'a pas déclaré de perturbation significative de ses activités à la maison, au travail ou à l'école, ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.
ND	(SOPB_21A = NSP, R, ND) ou (SOPB_211 = NSP, R, ND) ou (SOPB_212 = NSP, R, ND) ou (SOPB_21C = NSP, R, ND) ou (SOPB_21D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère E de la phobie sociale au cours de la vie :

Valeur de SOPBDE	Condition(s)	Explication
1	(SOPB_16 = 3, 4, 5) ou SOPBD215 = 1 ou 5 <= SOPB_23 <= 365 ou SOPB_25 = 1	Le répondant remplit le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse entraînait une perturbation significative de son

		fonctionnement social ou professionnel, ou dans d'autres domaines importants.
2	(SOPB_16 = 1, 2, SO) et SOPBD215 = 2 et (0 <= SOPB_23 <= 4 ou SOPB_23 = SO) et (SOPB_25 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse entraînait une perturbation significative de son fonctionnement social ou professionnel, ou dans d'autres domaines importants.
ND	(SOPB_16 = NSP, R, ND) ou SOPBD215 = ND ou (SOPB_23 = NSP, R, ND) ou (SOPB_25 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

10) Phobie sociale au cours de la vie - critère F, partie 1

Nom de la variable : SOPBDF1

Basée sur : SOPB_18, SOPB_18A, DHHB_AGE

Usage Antérieur : Aucun

Description : Le critère F indique que, chez les individus de moins de 18 ans ou chez ceux dont tous les symptômes se sont manifestés avant l'âge de 18 ans, les symptômes doivent avoir persisté au moins six mois. Aucune durée minimale n'est établie pour les répondants qui ont vécu un épisode après l'âge de 18 ans. Le critère F, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI identifie les répondants qui ont déclaré qu'ils avaient 18 ans ou plus la dernière fois qu'ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance.

Valeur de SOPBDF1	Condition(s)	Explication
1	18 <= SOPB_18A < SO ou [SOPB_18 = 1, 2, 3) et DHHB_AGE >= 18] ou (SOPB_18A = NSP et DHHB_AGE >= 18)	Le répondant remplit le critère F, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré qu'il avait 18 ans ou plus la dernière fois qu'il a craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance ou le répondant, lorsque âgé de 18 ans et plus, ne se rappelait pas de son âge la dernière fois où il a craint ces situations.
2	DHHB_AGE < 18 ou SOPB_18A < 18 ou (SOPB_18 = SO et SOPB_18A = SO)	Le répondant ne remplit pas le critère F, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a moins de 18 ans ou a déclaré qu'il avait moins de 18 ans la dernière fois qu'il a craint

		fortement ou évité une situation sociale ou de performance.
ND	(SOPB_18 = NSP, R, ND) ou (SOPB_18A = R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si (SOPB_03A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ3A = manquant	Fixer les non-réponses à données manquantes pour les calculs.
Si (SOPB_03B = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ3B = manquant	
Si (SOPB_06A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ6A = manquant	Fixer l'âge au moment du dernier épisode à l'âge courant si le répondant a déclaré avoir vécu un épisode au cours des 12 derniers mois.
Si (SOPB_18A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ18A = manquant	
Si (SOPB_25A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ25A = manquant	
Si (SOPB_36A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ36A = manquant	
Si (SOPB_39A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ39A = manquant	
Si (SOPB_18 = 1, 2, 3) alors SOPRQ18A = DHHB_AGE	

11) Phobie sociale au cours de la vie - critère F, partie 2

Nom de la variable : SOPBDF2

Basée sur : SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A, SOPB_18A, SOPB_25A, SOPB_36A, SOPB_39A

Usage Antérieur : Aucun

Description : Le critère F indique que, chez les individus de moins de 18 ans ou chez ceux dont tous les symptômes se sont manifestés avant l'âge de 18 ans, les symptômes doivent avoir persisté au moins six mois. Aucune durée minimale n'est établie pour les répondants qui ont vécu un épisode après l'âge de 18 ans. Le critère F, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI indique si les symptômes ont persisté au moins six mois. On l'établit en déterminant si la différence entre deux des dates déclarées est supérieure à une année.

Nota : Comme les dates disponibles sont les âges exprimés en années, toute différence supérieure à une année est considérée comme la preuve que la durée de l'épisode était supérieure à six mois.

Valeur de SOPBDF2	Condition(s)	Explication
1	Maximale de (SOPRQ03A, SOPRQ03B, SOPRQ06A, SOPRQ18A, SOPRQ25A, SOPRQ36A, SOPRQ39A) - {moins} Minimale de (SOPRQ03A, SOPRQ03B, SOPRQ06A, SOPRQ18A, SOPRQ25A, SOPRQ36A, SOPRQ39A) >= 1	Le répondant remplit le critère F, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré que la durée était supérieure à six mois.
ND	[(SOPB_03B = NSP, R, ND) et (SOPB_06A = SO, NSP, R, ND)] ou (SOPB_18A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré, sans objet) à au moins une question nécessaire au calcul. Nota : Puisque la différence entre l'âge au moment de l'apparition et l'âge au moment de l'épisode le plus récent donne la durée la plus longue, on fixe la valeur à Non déclaré si le répondant ne remplit pas le critère et qu'il n'a pas donné de réponse pour l'âge au moment de l'apparition ou pour l'âge au

		moment de l'épisode le plus récent.
2	<p>Maximale de (SOPRQ03A, SOPRQ03B, SOPRQ06A, SOPRQ18A, SOPRQ25A, SOPRQ36A, SOPRQ39A) - {moins}</p> <p>Minimale de (SOPRQ03A, SOPRQ03B, SOPRQ06A, SOPRQ18A, SOPRQ25A, SOPRQ36A, SOPRQ39A) = 0</p> <p>ou</p> <p>(SOPRQ03A = SO et SOPRQ03B = SO et SOPRQ06A = SO et SOPRQ18A = SO)</p>	<p>Le répondant ne remplit pas le critère F, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie.</p> <p>Le répondant n'a pas déclaré que la durée était supérieure à six mois.</p>

12) Phobie sociale au cours de la vie - critère F (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : SOPBDF

Basée sur : SOPBDF1, SOPBDF2

Usage Antérieur : Aucun

Description : Le critère F indique que, chez les individus de moins de 18 ans ou chez ceux dont tous les symptômes se sont manifestés avant l'âge de 18 ans, les symptômes doivent avoir persisté au moins six mois. Aucune durée minimale n'est établie pour les répondants qui ont vécu un épisode après l'âge de 18 ans. Cette variable indique si le répondant remplit le critère F de la phobie sociale au cours de la vie selon l'ESCC 1.2/WMH-CIDI. Les répondants qui remplissent le critère déclarent :

- qu'ils avaient 18 ans ou plus la dernière fois qu'ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance ou le répondant, lorsque âgé de 18 ans et plus, ne se rappelait pas de son âge la dernière fois où il a craint ces situations. ou
- qu'ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance pendant plus de six mois (opérationnalisé comme étant pendant plus d'une année).

Valeur de SOPBDF	Condition(s)	Explication
1	SOPBDF1 = 1 ou SOPBDF2 = 1	<p>Le répondant remplit le critère F de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie.</p> <p>Le répondant (1) avait 18 ans ou plus la dernière fois qu'il a craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance ou le répondant, lorsque âgé de 18 ans et plus, ne se rappelait pas de son âge la dernière fois où il a craint ces situations, ou (2) a déclaré que la crainte ou l'évitement a duré plus de six mois.</p>
2	SOPBDF1 = 2 et SOPBDF2 = 2	<p>Le répondant ne remplit pas le critère F de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie.</p> <p>Le répondant (1) avait moins de 18 ans la dernière fois qu'il a craint fortement ou évité une situation</p>

		sociale ou de performance et (2) la période de crainte ou d'évitement n'a pas duré plus de six mois.
ND	SOPBDF1 = ND ou SOPBDF2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

13) Algorithme pour la phobie sociale au cours de la vie

Nom de la variable : SOPBDSP

Basée sur : SOPBDA, SOPBDB, SOPBDC, SOPBDD, SOPBDE, SOPBDF

Usage Antérieur : Aucun

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui, et craignent d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante,
2. que l'exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété,
3. qu'ils reconnaissent le caractère excessif ou irraisonné de la peur,
4. qu'ils évitent ou vivent avec une anxiété et une détresse intenses les situations sociales ou de performance redoutées,
5. que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations sociales ou de performance redoutées perturbe, de façon importante, leurs habitudes, leurs activités professionnelles ou scolaires, ou bien leurs activités sociales ou leurs relations avec autrui, et
6. qu'ils avaient 18 ans ou plus la dernière fois qu'ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance, ou lorsque âgés de 18 ans et plus, ne se rappelaient pas de leur âge la dernière fois où ils ont craint ces situations, ou qu'ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance pendant plus de six mois.

Valeur de SOPBDSP	Condition(s)	Explication
1	SOPBDA = 1 et SOPBDB = 1 et SOPBDC = 1 et SOPBDD = 1 et SOPBDE = 1 et SOPBDF = 1	Le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré craindre une ou plusieurs situations sociales ou de performance, éprouver une anxiété lorsqu'il est exposé à la situation redoutée, reconnaître que la peur est excessive, éviter les situations redoutées ou les endurer avec une détresse intense, que l'évitement, la détresse ou l'anxiété perturbe ses habitudes ou son fonctionnement social ou professionnel, et qu'il avait plus de 18 ans au moment de l'épisode le plus récent ou que l'épisode a duré plus de six mois.
2	SOPBDA = 2 ou SOPBDB = 2 ou SOPBDC = 2 ou SOPBDD = 2 ou	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie.

	SOPBDE = 2 ou SOPBDF = 2	Le répondant n'a pas déclaré craindre une ou plusieurs situations sociales ou de performance, ou éprouver une anxiété quand il est exposé à la situation redoutée, ou penser que la peur est excessive, ou éviter les situations redoutées ou les endurer avec une détresse intense, ou que l'évitement, la crainte ou la détresse perturbe ses habitudes ou son fonctionnement social ou professionnel, ou a déclaré qu'il avait moins de 18 ans au moment de l'épisode le plus récent et que l'épisode avait duré moins de six mois.
ND	SOPBDA = ND ou SOPBDB = ND ou SOPBDC = ND ou SOPBDD = ND ou SOPBDE = ND ou SOPBDF = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

14) Phobie sociale – âge au moment de l'épisode le plus récent

Nom de la variable : SOPBDREC

Basée sur : SOPB_18, SOPB_18A, DHHB_AGE

Usage Antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant la dernière fois qu'il ou elle a craint fortement ou évité des situations sociales ou de performance. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de phobie sociale au cours de la vie.

Valeur de SOPBDREC	Condition(s)	Explication
SO	SOPBDSP = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie.
DHHB_AGE	SOPBDSP = 1 et (SOPB_18 = 1, 2, 3)	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge courant.
Valeur à SOPB_18A	SOPBDSP = 1 et (SOPB_18 = 4, NSP) et SOPB_18A < SO	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge qu'avait le répondant lors du dernier épisode où il a craint ou évité des situations sociales ou de performance.
ND	SOPBDSP = ND ou (SOPB_18 = R, ND) ou (SOPB_18A = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

15) Phobie sociale– âge au moment de l'apparition**Nom de la variable :** SOPBDON**Basée sur :** SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A, DHHB_AGE**Usage Antérieur :** Aucun**Description :** L'âge au moment de l'apparition de la phobie sociale est l'âge qu'avait le répondant lorsqu'il a éprouvé pour la première fois une peur de situations sociales ou de performance. La valeur de cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de phobie sociale.

Valeur de SOPBDON	Condition(s)	Explication
SO	SOPBDSP = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie.
Valeur minimale à (SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A)	SOPBDSP = 1 et (SOPB_03A <= DHHB_AGE ou SOPB_03B <= DHHB_AGE ou SOPB_06A <= DHHB_AGE)	L'âge au moment de l'apparition est l'âge qu'avait le répondant lorsqu'il a craint pour la première fois des situations sociales ou de performance.
ND	SOPBDSP = ND ou (SOPB_03A = NSP, R, ND) ou (SOPB_03B = NSP, R, ND) ou (SOPB_06A = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Phobie sociale – Au cours des 12 derniers mois**16) Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère A****Nom de la variable :** SOPBDYA**Basée sur :** SOPBDSP**Usage Antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie.

Valeur de SOPBDYA	Condition(s)	Explication
1	SOPBDSP = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant remplit les critères de phobie sociale au cours de la vie.
2	SOPBDSP = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant ne remplit pas les critères de phobie sociale au cours de la vie.
ND	(SOPBDSP = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

17) Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère B**Nom de la variable :** SOPBDYB**Basée sur :** SOPB_18, SOPB_18A, SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A, DHHB_AGE**Usage Antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui déclarent avoir craint intensément ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de SOPBDYB	Condition(s)	Explication
1	(SOPB_18 = 1, 2, 3) ou SOPB_03A = DHHB_AGE ou SOPB_03B = DHHB_AGE ou SOPB_06A = DHHB_AGE ou SOPB_18A = DHHB_AGE	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré qu'il avait craint ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(SOPB_18 = 4, SO) et (SOPB_18A < DHHB_AGE ou SOPB_18A = SO) et (SOPB_03A < DHHB_AGE ou SOPB_03B < DHHB_AGE ou [SOPB_03A = SO et SOPB_03B = SO]) et (SOPB_06A < DHHB_AGE ou SOPB_06A = SO)	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré qu'il avait craint ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(SOPB_18 = NSP, R, ND) ou (SOPB_18A = NSP, R, ND) ou (SOPB_03A = NSP, R, ND) ou (SOPB_03B = NSP, R, ND) ou (SOPB_06A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

18) Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère C**Nom de la variable :** SOPBDYC**Basée sur :** SOPB_20, SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D, SOPB_23, SOPB_38**Usage Antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable identifie les répondants qui déclarent que leur peur ou leur comportement d'évitement a causé une détresse clinique significative ou une altération de leur fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de SOPBDYC	Condition(s)	Explication
1	(SOPB_20 = 1, 2, 3) ou 5 <= SOPB_21A <= 10 ou 5 <= SOPB_211 <= 10 ou 5 <= SOPB_212 <= 10 ou 5 <= SOPB_21C <= 10 ou 5 <= SOPB_21D <= 10 ou 5 <= SOPB_23 <= 365 ou SOPB_38 = 1	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres

		domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(SOPB_20 = 4, 5, SO) et (0 <= SOPB_21A <= 4 ou SOPB_21A = SO) et [0 <= SOPB_211 <= 4 ou (SOPB_211 = 11, SO)] et [0 <= SOPB_212 <= 4 ou (SOPB_212 = 11, SO)] et (0 <= SOPB_21C <= 4 ou SOPB_21C = SO) et (0 <= SOPB_21D <= 4 ou SOPB_21D = SO) et (0 <= SOPB_23 <= 4 ou SOPB_23 = SO) et (SOPB_38 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré de détresse cliniquement significative ni d'altération de son fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(SOPB_20 = NSP, R, ND) ou (SOPB_21A = NSP, R, ND) ou (SOPB_211 = NSP, R, ND) ou (SOPB_212 = NSP, R, ND) ou (SOPB_21C = NSP, R, ND) ou (SOPB_21D = NSP, R, ND) ou (SOPB_23 = NSP, R, ND) ou (SOPB_38 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

19) Algorithme pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : SOPBDPY

Basée sur : SOPBDYA, SOPBDYB, SOPBDYC

Usage Antérieur : Aucun

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. remplir les critères de phobie sociale au cours de la vie,
2. avoir craint ou évité une ou plusieurs situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et
3. avoir éprouvé une détresse cliniquement significative ou une altération de leur fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Valeur de SOPBDPY	Condition(s)	Explication
1	SOPBDYA = 1 et SOPBDYB = 1 et SOPBDYC = 1	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré (1) remplir les critères de phobie sociale au cours de la vie, (2) avoir craint ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et (3) avoir éprouvé une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social ou professionnel ou dans

		d'autres domaines importants.
2	SOPBDYA = 2 ou SOPBDYB = 2 ou SOPBDYC = 2	Le répondant ne remplit pas tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré (1) remplir les critères de phobie sociale au cours de la vie, ou (2) avoir craint ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, ou (3) avoir éprouvé une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	SOPBDYA = ND ou SOPBDYB = ND ou SOPBDYC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

20) Trouble attribuable à la phobie sociale – moyenne

Nom de la variable : SOPBDINT

Basée sur : SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D, SOPBDPY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit la perturbation que la phobie sociale a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois.

Nota : Les répondants qui ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur. Ces derniers n'ont pas eu à répondre les questions sur la perturbation/le trouble.

Valeur de SOPBDINT	Condition(s)	Explication
SO	SOPBDPY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour phobie sociale au cours des 12 derniers mois.
ND	SOPB_21A = SO et SOPB_211 = SO et SOPB_212 = SO et SOPB_21C = SO et SOPB_21D = SO	Les questions concernant la perturbation n'ont pas été posées aux répondants parce qu'ils ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur.
ND	SOPBDPY = ND ou (SOPB_21A = NSP, R, ND) ou (SOPB_211 = NSP, R, ND) ou (SOPB_212 = NSP, R, ND) ou (SOPB_21C = NSP, R, ND) ou (SOPB_21D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

(SOPB_21A + SOPB_211 + SOPB_212 + SOPB_21C + SOPB_21D) / 5 (min : 0; max : 10.0) (arrondir à .1)	SOPBDPY = 1 et 0 <= SOPB_211 <= 10 et 0 <= SOPB_212 <= 10 et 0 <= SOPB_21A <= 10 et 0 <= SOPB_21C <= 10 et 0 <= SOPB_21D <= 10	Trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
(SOPB_21A + SOPB_212 + SOPB_21C + SOPB_21D) / 4 (min : 0; max : 10.0) (arrondir à .1)	SOPBDPY = 1 et SOPB_211 = 11 et 0 <= SOPB_212 <= 10 et 0 <= SOPB_21A <= 10 et 0 <= SOPB_21C <= 10 et 0 <= SOPB_21D <= 10	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. SOPB_211 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
(SOPB_21A + SOPB_211 + SOPB_21C + SOPB_21D) / 4 (min : 0; max : 10.0) (arrondir à .1)	SOPBDPY = 1 et 0 <= SOPB_211 <= 10 et SOPB_212 = 11 et 0 <= SOPB_21A <= 10 et 0 <= SOPB_21C <= 10 et 0 <= SOPB_21D <= 10	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. SOPB_212 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
(SOPB_21A + SOPB_21C + SOPB_21D) / 3 (min : 0; max : 10.0) (arrondir à .1)	SOPBDPY = 1 et SOPB_211 = 11 et SOPB_212 = 11 et 0 <= SOPB_21A <= 10 et 0 <= SOPB_21C <= 10 et 0 <= SOPB_21D <= 10	Trouble = moyenne de trois items qui s'appliquaient au répondant. SOPB_211 et SOPB_212 ne s'appliquaient pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

21) Indicateur de la perturbation attribuable à la phobie sociale

Nom de la variable : SOPBFINT

Basée sur : SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D, SOPBDPY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit la perturbation que la phobie sociale a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si la phobie sociale perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois.

Nota : Les répondants qui ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur, n'ont pas eu à répondre aux questions sur la perturbation/le trouble.

Valeur de SOPBFINT	Condition(s)	Explication
SO	SOPBDPY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de phobie sociale au cours des 12 derniers mois.
ND	SOPB_21A = SO et SOPB_211 = SO et SOPB_212 = SO et SOPB_21C = SO et SOPB_21D = SO	Les questions concernant la perturbation n'ont pas été posées aux répondants parce qu'ils ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou

		aucune peur.
1	SOPBDPY = 1 et (5 <= SOPB_21A <= 10 ou 5 <= SOPB_211 <= 10 ou 5 <= SOPB_212 <= 10 ou 5 <= SOPB_21C <= 10 ou 5 <= SOPB_21D <= 10)	La phobie sociale a perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
2	SOPBDPY = 1 et 0 <= SOPB_21A <= 4 et (0 <= SOPB_211 <= 4 ou SOPB_211 = 11) et (0 <= SOPB_212 <= 4 ou SOPB_212 = 11) et 0 <= SOPB_21C <= 4 et 0 <= SOPB_21D <= 4	La phobie sociale n'a pas perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
ND	SOPBDPY = ND ou (SOPB_21A = NSP, R, ND) ou (SOPB_211 = NSP, R, ND) ou (SOPB_212 = NSP, R, ND) ou (SOPB_21C = NSP, R, ND) ou (SOPB_21D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Trouble d'anxiété généralisée (29 VD)

Pour les besoins de l'ESCC 1.2, le trouble d'anxiété généralisée est caractérisé par une anxiété et des soucis fréquents et persistants durant au moins six mois et concernant plusieurs événements ou activités. Les symptômes du trouble d'anxiété généralisée incluent l'agitation ou la sensation d'être survolté ou à bout, la fatigabilité, les difficultés de concentration, l'irritabilité, la tension musculaire, les sensations de tremblement, les maux de tête, la perturbation du sommeil (difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu ou sommeil agité et non satisfaisant), la transpiration excessive, les palpitations, l'essoufflement et divers symptômes gastro-intestinaux.

Les questions sur le trouble d'anxiété généralisée sont fondées sur une version reconnue du 'World Mental Health du Composite International Diagnostic Interview' (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l'ESCC. L'instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le monde.

Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l'évaluation des troubles mentaux conformément à l'opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L'abréviation DSM désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l'ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV ou le DSM-III-R. L'ESCC 1.2 n'offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10.

Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC (interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de travail qui examinera les différences méthodologiques pour s'assurer que les comparaisons entre pays soient faites de façon appropriée.

Le trouble d'anxiété généralisée est l'un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic du trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s'entend des 12 mois qui ont précédé l'interview.

La documentation qui accompagne les données de l'ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récurrence, à la durée, à l'âge au moment de l'apparition et à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses.

En ce qui concerne le trouble d'anxiété généralisée, les variables d'intérêt sont :

Variable	Concept	Numéro d la variable
GADBDGDS	Algorithme – vie	10
GADBDDY	Algorithme - 12 mois	23
GADBDON	Apparition	17
GADBREC	Récurrence	18

GABD05Y	Durée	11
GABD7BY		12
GABD74Y		13
GABD77Y		14
GABD30Y		15
GABD31Y		16
GABDINT	Perturbation – 12 mois	24

Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées au trouble d'anxiété généralisée, ainsi que leur variables temporaires respectives sont opérationnalisées de façon à satisfaire partiellement aux définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire.

L'instrument de l'ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d'informations sur le nombre de symptômes, la gravité, la durée et l'intensité globale du trouble. Toutefois, l'approche structurée utilisée pour l'instrument informatisé n'est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n'existe aucun algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du trouble. En outre, bien que l'instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour l'opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe.

En plus de l'information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l'utilisation des services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l'ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé que les données de l'ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l'information canadienne déjà recueillie dans le cadre de l'ESCC 1.1 et des cycles de l'ENSP réalisés antérieurement.

Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. Cette correspondance vise uniquement à faciliter l'interprétation des résultats en permettant un langage commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l'existence d'une correspondance directe entre nos critères et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au questionnaire et aux algorithmes.

Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. de l'anxiété et des soucis excessifs durant au moins six mois et concernant un certain nombre d'événements ou d'activités (tel le travail);
2. éprouver de la difficulté à contrôler cette préoccupation;
3. que l'anxiété et les soucis sont associés à trois ou plus des symptômes associés à l'anxiété;
4. que l'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une souffrance cliniquement significative ou une altération significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants;

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois :

1. remplir les critères de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie,
2. avoir vécu un épisode d'anxiété généralisée durant au moins six mois au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et
3. une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Trouble d'anxiété généralisée - Au cours de la vie

1) Trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie - critère A, partie 1

Nom de la variable : GADBDA1

Basée sur : SCRB_26, SCRB_26A, SCRB_26B, GADB_03

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé de l'anxiété et des soucis excessifs à un moment donné de leur vie. Les répondants qui remplissent le critère de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI sont ceux qui ont déclaré avoir eu une période où ils étaient « anxieux », beaucoup plus nerveux ou anxieux que la plupart des autres personnes ou anxieux ou inquiets la plupart des jours. En outre, ils trouvaient que leurs sentiments étaient excessifs ou irraisonnés.

Valeur de GADBDA1	Condition(s)	Explication
1	(SCRB_26 = 1 ou SCRB_26A = 1 ou SCRB_26B = 1) et GADB_03 = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 1, de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant a déclaré avoir éprouvé de l'anxiété ou des soucis excessifs.
2	(SCRB_26 = 2, SO) et (SCRB_26A = 2, SO) et (SCRB_26B = 2, SO) ou (GADB_03 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 1, de trouble d'anxiété généralisée. Le répondant n'a pas déclaré avoir éprouvé de l'anxiété et des soucis excessifs.
ND	(SCRB_26 = NSP, R, ND) ou (SCRB_26A = NSP, R, ND) ou (SCRB_26B = NSP, R, ND) ou (GADB_03 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie - critère A, partie 2

Nom de la variable : GADBDA2

Basée sur : GADB_05, GADB_05A, GADB_05B, GADB_05C

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé de l'anxiété ou des soucis excessifs durant au moins six mois.

Valeur de GADBDA2	Condition(s)	Explication
1	(6 <= GADB_05A < NA) ou (1 <= GADB_05B < NA) ou (GADB_05C = 1)	Le répondant remplit le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI. Le répondant a déclaré avoir éprouvé de l'anxiété ou des soucis excessifs durant au moins six mois.
2	(GADB_05 = NA et GADB_05C = NA) ou (0 <= GADB_05A < 6) ou (GADB_05C = 2)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI. Le répondant a déclaré avoir éprouvé de l'anxiété et des soucis excessifs durant moins de six mois. Nota : GADB_05B n'est pas incluse puisque la durée minimale est d'un an.
ND	(GADB_05 = R, ND) ou (GADB_05A = R, ND) ou (GADB_05B = R, ND) ou (GADB_05C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul. Nota : NSP est exclue de GADB_05, GADB_05A et GADB_05B parce que si la réponse est NSP, on passe à GADB_05C pour ces variables.

3) Trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie - critère A, partie 3

Nom de la variable : GADBDA3

Basée sur : GADB_01A, GADB_01B, GADB_01C, GADB_01D, GADB_01E, GADB_01F, GADB_01G, GADB_01H, GADB_01I, GADB_01J, GADB_01K, GADB_01L, GADB_01M, GADB_01N, GADB_01O, GADB_01P, GADB_01Q, GADB_01R, GADB_01S, GADB_01T, GADB_01U, GADB_01V, GADB_01W, GADB_01X, GADB_01Y, GADB_02A, GADB_02B

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré éprouver de l'anxiété concernant un certain nombre d'événements ou d'activités (tel le travail). Les répondants qui répondent au critère A, partie 3 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI du trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie ont déclaré éprouver des soucis concernant au moins deux activités ou événements différents.

Valeur de GADBDA3	Condition(s)	Explication
1	Au moins deux de: (GADB_01A à GADB_01Y = 1) ou GADB_02A = 1 ou GADB_02B = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 3. Le répondant a déclaré éprouver de l'anxiété ou des soucis concernant au moins deux activités ou événements différents.
2	Au moins 26 de: (GADB_01A à GADB_01Y = 2) ou GADB_02A = 2 ou (GADB_02B = 2, SO) ou GADB_01A = SO	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 3. Le répondant n'a pas déclaré éprouver de l'anxiété concernant au moins deux activités ou événements différents. Nota : Comme GADB_02B est sautée si la réponse à GADB_02A est Non, SO est ajouté au code « Non » pour GADB_02B.
ND	(GADB_01A = NSP, R, ND) ou (GADB_02A = NSP, R, ND) ou (GADB_02B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul. Nota : Comme GADB_01 est une question « Cochez toutes les réponses applicables », si la réponse à GADB_01A est NSP ou R, la réponse à GADB_01B à GADB_01Y sera NSP ou R.

4) Trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie - critère A (parties 1, 2 et 3 combinées)

Nom de la variable : GADBDA

Basée sur : GADBDA1, GADBDA2, GADBDA3

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable permet d'évaluer le critère A de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie selon l'ESCC 1.2/WMH-CIDI et identifie les répondants qui ont déclaré :

- 1) qu'ils éprouvent de l'anxiété ou des soucis excessifs;
- 2) que l'anxiété ou les soucis durent au moins six mois;
- 3) qu'ils éprouvent de l'anxiété ou des soucis concernant au moins deux activités ou événements différents.

Valeur de GADBDA	Condition(s)	Explication
1	GADBDA1 = 1 et GADBDA2 = 1 et GADBDA3 = 1	Le répondant remplit le critère A de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.
2	GADBDA1 = 2 ou GADBDA2 = 2 ou GADBDA3 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.
ND	GADBDA1 = ND ou GADBDA2 = ND ou GADBDA3 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

5) Trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie - critère B

Nom de la variable : GADBDB

Basée sur : GADB_04

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré éprouver de la difficulté à contrôler cette préoccupation.

Valeur de GADBDB	Condition(s)	Explication
1	(GADB_04 = 1, 2)	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant a déclaré éprouver de la difficulté à contrôler cette préoccupation.
2	(GADB_04 = 3, 4, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré éprouver de la difficulté à contrôler cette préoccupation.
ND	(GADB_04 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

6) Trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie - critère C

Nom de la variable : GADBDC

Basée sur : GADB_09A, GADB_09B, GADB_09C, GADB_09D, GADB_09E, GADB_09F

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré éprouver trois ou plus des six symptômes associés à l'anxiété. Ces symptômes sont :

- 1) l'agitation ou la sensation d'être survolté ou à bout;
- 2) la fatigabilité;
- 3) les difficultés de concentration ou trous de mémoire;
- 4) l'irritabilité;
- 5) la tension musculaire;
- 6) la perturbation du sommeil.

Valeur de GADBDC	Condition(s)	Explication
1	Au moins trois de: (GADB_09A, GADB_09B, GADB_09C, GADB_09D, GADB_09E, GADB_09F = 1)	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant a déclaré éprouver au moins trois des six symptômes associés à l'anxiété.
2	Au moins quatre de: (GADB_09A = 2, SO) ou (GADB_09B = 2, SO) ou (GADB_09C = 2, SO) ou (GADB_09D = 2, SO) ou (GADB_09E = 2, SO) ou (GADB_09F = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré éprouver au moins trois des symptômes associés à l'anxiété.
ND	(GADB_09A = NSP, R, ND) ou (GADB_09B = NSP, R, ND) ou (GADB_09C = NSP, R, ND) ou (GADB_09D = NSP, R, ND) ou (GADB_09E = NSP, R, ND) ou (GADB_09F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

7) Trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie - critère D du DSM-IV

Nom de la variable : GADBDD

Basée sur : GADB_01A, GADB_01B, GADB_01C, GADB_01D, GADB_01E, GADB_01F, GADB_01G, GADB_01H, GADB_01I, GADB_01J, GADB_01N, GADB_01T, GADB_01U, GADB_01V, GADB_01W, GADB_01X, GADB_01Y, GADB_02A, GADB_02B

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que l'objet de l'anxiété et des soucis n'est pas limité aux manifestations d'un trouble de l'axe 1. Par exemple, la préoccupation n'est pas seulement celle d'avoir une attaque de panique, d'être gêné en public (comme dans la phobie sociale), d'être loin de son domicile ou de ses proches (comme dans le trouble d'anxiété de séparation), d'être contaminé (comme dans le trouble obsessionnel compulsif), de prendre du poids (comme dans l'anorexie mentale), d'avoir de multiples plaintes somatiques (comme dans le trouble de somatisation) ou d'avoir une maladie grave (comme dans l'hypochondrie). Les répondants qui ont déclaré comme seule source d'inquiétude leur propre santé mentale, leur consommation d'alcool ou de drogue, le fait d'être loin de chez soi ou séparé des êtres chers, des phobies sociales, l'agoraphobie, des phobies spécifiques, des obsessions ou des compulsions ne remplissent pas le critère D de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.

Nota : Les réponses aux questions GADB_01Y, GADB_02A et GADB_02B ont été vérifiées en premier pour exclure toute inquiétude liée aux problèmes de santé mentale de l'axe 1.

Valeur de GADBDD	Condition(s)	Explication
1	GADB_01A = 1 ou GADB_01B = 1 ou GADB_01C = 1 ou GADB_01D = 1 ou GADB_01E = 1 ou GADB_01F = 1 ou GADB_01G = 1 ou GADB_01H = 1 ou GADB_01I = 1 ou GADB_01J = 1 ou GADB_01N = 1 ou GADB_01T = 1 ou GADB_01U = 1 ou GADB_01V = 1 ou GADB_01W = 1 ou GADB_01X = 1 ou GADB_01Y = 1 ou GADB_02A = 1 ou GADB_02B = 1	Le répondant remplit le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant a déclaré au moins une inquiétude non liée à un trouble de l'axe 1.
2	GADB_01A = 2 et GADB_01B = 2 et GADB_01C = 2 et GADB_01D = 2 et GADB_01E = 2 et GADB_01F = 2 et GADB_01G = 2 et GADB_01H = 2 et GADB_01I = 2 et GADB_01J = 2 et GADB_01N = 2 et GADB_01T = 2 et GADB_01U = 2 et GADB_01V = 2 et GADB_01W = 2 et GADB_01X = 2 et GADB_01Y = 2 et GADB_02A = 2 ou GADB_01A = SO	Le répondant ne remplit pas le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré au moins une inquiétude non liée à un trouble de l'axe 1. Nota : GADB_92B est sautée si GADB_02A = 2.
ND	(GADB_01A = NSP, R, ND) ou (GADB_02A = NSP, R, ND) ou (GADB_02B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8) Trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie - critère E, partie 1

Nom de la variable : GADBDE1

Basée sur : GADB_15, GADB_16

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé de l'anxiété, des soucis ou des symptômes physiques entraînant une souffrance cliniquement significative.

Valeur de GADBDE1	Condition(s)	Explication
1	(GADB_15 = 3, 4, 5) ou (GADB_16 = 1, 2)	Le répondant remplit le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant a déclaré une souffrance cliniquement significative.
2	(GADB_15 = 1, 2, SO) et (GADB_16 = 3, 4, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré de souffrance cliniquement significative.
ND	(GADB_15 = NSP, R, ND) ou (GADB_16 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

9) Trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie - critère E, partie 2

Nom de la variable : GADBDE2

Basée sur : GADB_17, GADB_17A, GADBD384, GADB_40, GADB_59

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé de l'anxiété, des soucis ou des symptômes physiques entraînant une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

9a) Perturbation sociale et professionnelle

Nom de la variable : GADBD384

Basée sur : GADB_38A, GADB_381, GADB_382, GADB_38C, GADB_38D

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable indique si, durant la période d'un mois ou plus au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview durant laquelle les symptômes étaient les plus sévères, les sentiments d'anxiété du répondant ont perturbé significativement ses activités à la maison, à l'école ou au travail ou ses activités sociales.

Valeur de GADBD384	Condition(s)	Explication
1	4 <= GADB_38A <= 10 ou 4 <= GADB_381 <= 10 ou 4 <= GADB_382 <= 10 ou 4 <= GADB_38C <= 10 ou 4 <= GADB_38D <= 10	Le répondant a déclaré une perturbation significative de ses activités à la maison, au travail ou à l'école ou de ses relations sociales.

2	(0 <= GADB_38A <= 3 ou GADB_38A = SO) et (0 <= GADB_381 <= 3 ou (GADB_381 = 11, SO)) et (0 <= GADB_382 <= 3 ou (GADB_382 = 11, SO)) et (0 <= GADB_38C <= 3 ou GADB_38C = SO) et (0 <= GADB_38D <= 3 ou GADB_38D = SO)	Le répondant n'a pas déclaré une perturbation significative de ses activités à la maison, au travail ou à l'école ou de ses relations sociales.
ND	(GADB_38A = NSP, R, ND) ou (GADB_381 = NSP, R, ND) ou (GADB_382 = NSP, R, ND) ou (GADB_38C = NSP, R, ND) ou (GADB_38D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère E, partie 2:

Valeur de GADBDE2	Condition(s)	Explication
1	(GADB_17 = 3, 4, 5) ou (GADB_17A = 1, 2, 3) ou GABBD384 = 1 ou 5 <= GADB_40 <= 365 ou GADB_59 = 1	Le répondant remplit le critère E, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant a déclaré que ses symptômes ont entraîné une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
2	(GADB_17 = 1, 2, SO) et (GADB_17A = 4, SO) et GABBD384 = 2 et (0 <= GADB_40 < 5 ou GADB_40 = SO) et (GADB_59 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère E, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	(GADB_17 = NSP, R, ND) ou (GADB_17A = NSP, R, ND) ou GABBD384 = ND ou (GADB_40 = NSP, R, ND) ou (GADB_59 = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

10) Trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie - critère E (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : GADBDE

Basée sur : GADBDE1, GADBDE2

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé de l'anxiété, des soucis ou des symptômes physiques qui ont entraîné :

- 1) une souffrance cliniquement significative ou
- 2) une altération significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Valeur de GADBDE	Condition(s)	Explication
1	GADBDE1 = 1 ou GADBDE2 = 1	Le répondant remplit le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant a déclaré que son anxiété a entraîné une souffrance cliniquement significative ou une altération significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
2	(GADBDE1 = 2, SO) et (GADBDE2 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que son anxiété a entraîné une souffrance cliniquement significative ou une altération significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	GADBDE1 = ND ou GADBDE2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

11) Algorithme pour le trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie

Nom de la variable : GADB DGDS

Basée sur : GADBDA, GADBDB, GADBDC, GADBDD, GADBDE

Usage antérieur : aucun

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie. Les répondants qui remplissent ces critères ont déclaré :

- 1) l'anxiété et des soucis excessifs ainsi que de l'anxiété concernant au moins deux activités ou événements différents et durant au moins six mois;
- 2) éprouver de la difficulté à contrôler cette préoccupation;
- 3) que l'anxiété et les soucis sont associés à trois ou plus des symptômes associés à l'anxiété;
- 4) que l'objet de l'anxiété et des soucis n'est pas limité aux manifestations d'un trouble de l'axe 1;

- 5) que l'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une souffrance cliniquement significative ou une altération significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants;

Valeur de GADBDGDS	Condition(s)	Explication
1	GADBDA = 1 et GADBDB = 1 et GADBDC = 1 et GADBDD = 1 et GADBDE = 1	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.
2	GADBDA = 2 ou GADBDB = 2 ou GADBDC = 2 ou GADBDD = 2 ou GADBDE = 2	Le répondant ne remplit pas tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.
ND	GADBDA = ND ou GADBDB = ND ou GADBDC = ND ou GADBDD = ND ou GADBDE = ND	Le répondant n'a pas répondu (non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

12) Durée du plus long épisode d'anxiété généralisée (en années)

Nom de la variable : GABD05Y

Basée sur : GADB_05, GADB_05A, GADB_05B

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable indique la durée du plus long épisode d'anxiété généralisée du répondant (en années).

Valeur de GABD05Y	Condition(s)	Explication
SO	GADB_05 = SO	On n'a pas posé au répondant les questions nécessaires au calcul.
ND	(GADB_05 = NSP, R, ND) ou (GADB_05A = NSP, R, ND) ou (GADB_05B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur de GADB_05A / 12 (arrondir à .01)	GADB_05 = 1	Durée de l'épisode d'anxiété généralisée le plus long vécu par le répondant (en années).
Valeur de GADB_05B	GADB_05 = 2	Durée de l'épisode d'anxiété généralisée le plus long vécu par le répondant (en années).

13) Nombre de mois avec un épisode d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois (en années)

Nom de la variable : GADBD7BY

Basée sur : GADB_27B

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable indique le nombre de mois au cours des 12 derniers mois où le répondant a vécu un épisode d'anxiété généralisée (en années).

Valeur de GADBD7BY	Condition(s)	Explication
SO	GADB_27B = SO	On n'a pas posé au répondant les questions nécessaires au calcul.
ND	(GADB_27B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
Valeur de GADB_27B / 12 (arrondir à .01)	$1 \leq \text{GADB_27B} \leq 12$	Nombre de mois au cours des 12 derniers mois où le répondant a vécu un épisode d'anxiété généralisée (en années).

14) Durée d'un épisode unique d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois (en années)

Nom de la variable : GADBD74Y

Basée sur : GADB_274, GADB_74A, GADB_74B, GADB_74C, GADB_74D

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable indique la durée de l'épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview lorsqu'un épisode unique a été déclaré pour l'année précédente.

Valeur de GADBD74Y	Condition(s)	Explication
SO	GADB_274 = SO	On n'a pas posé au répondant les questions nécessaires au calcul.
ND	(GADB_274 = NSP, R, ND) ou (GADB_74A = NSP, R, ND) ou (GADB_74B = NSP, R, ND) ou (GADB_74C = NSP, R, ND) ou (GADB_74D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur de GADB_274A/ 365 (arrondir à .01)	GADB_274 = 1	Durée de l'épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant au cours des 12 mois (en années).
Valeur de GADB_274B/ 52 (arrondir à .01)	GADB_274 = 2	Durée de l'épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant au cours des 12 mois (en années).
Valeur de GADB_274C/ 12 (arrondir à .01)	GADB_274 = 3	Durée de l'épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant au cours des 12 mois (en années).
Valeur de GADB_274D	GADB_274 = 4	Durée de l'épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant au cours des 12 mois (en années).

15) Durée du premier des épisodes d'anxiété généralisée survenu au cours des 12 derniers mois (en années)

Nom de la variable : GABBD77Y

Basée sur : GADB_277, GADB_77A, GADB_77B, GADB_77C, GADB_77D

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable indique la durée du premier épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview lorsque deux épisodes ont été déclarés pour l'année précédente.

Valeur de GABBD77Y	Condition(s)	Explication
SO	GADB_277 = SO	On n'a pas posé au répondant les questions nécessaires au calcul.
ND	(GADB_277 = NSP, R, ND) ou (GADB_77A = NSP, R, ND) ou (GADB_77B = NSP, R, ND) ou (GADB_77C = NSP, R, ND) ou (GADB_77D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur de GADB_277A / 365 (arrondir à .01)	GADB_277 = 1	Durée du premier épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant au cours des 12 mois (en années).
Valeur de GADB_277B / 52 (arrondir à .01)	GADB_277 = 2	Durée du premier épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant au cours des 12 mois (en années).
Valeur de GADB_277C / 12 (arrondir à .01)	GADB_277 = 3	Durée du premier épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant au cours des 12 mois (en années).
Valeur de GADB_277D	GADB_277 = 4	Durée du premier épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant au cours des 12 mois (en années).

16) Durée d'un épisode unique d'anxiété généralisée (en années)

Nom de la variable : GABBD30Y

Basée sur : GADB_30, GADB_30A, GADB_30B, GADB_30C, GADB_30D

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable indique la durée du seul épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant.

Valeur de GABBD30Y	Condition(s)	Explication
SO	GADB_30 = SO	On n'a pas posé au répondant les questions nécessaires au calcul.
ND	(GADB_30 = NSP, R, ND) ou (GADB_30A = NSP, R, ND) ou (GADB_30B = NSP, R, ND) ou (GADB_30C = NSP, R, ND) ou (GADB_30D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur de GADB_30A / 365 (arrondir à .01)	GADB_30 = 1	Durée du seul épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant (en années).
Valeur de GADB_30B / 52 (arrondir à .01)	GADB_30 = 2	Durée du seul épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant (en années).
Valeur de GADB_30C / 12 (arrondir à .01)	GADB_30 = 3	Durée du seul épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant (en années).

Valeur de GADB_30D	GADB_30 = 4	Durée du seul épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant (en années).
--------------------	-------------	--

17) Durée de l'épisode d'anxiété généralisée le plus long (en années)

Nom de la variable : GADBD31Y

Basée sur : GADB_31, GADB_31A, GADB_31B, GADB_31C, GADB_31D

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable indique la durée de l'épisode d'anxiété généralisée le plus long vécu par le répondant.

Nota : On calcule cette variable seulement pour les répondants qui ont déclaré plus d'un épisode d'anxiété généralisée au cours de la vie.

Valeur de GADBD31Y	Condition(s)	Explication
SO	GADB_31 = SO	On n'a pas posé au répondant les questions nécessaires au calcul.
ND	(GADB_31 = NSP, R, ND) ou (GADB_31A = NSP, R, ND) ou (GADB_31B = NSP, R, ND) ou (GADB_31C = NSP, R, ND) ou (GADB_31D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur de GADB_31A / 365 (arrondir à .01)	GADB_31 = 1	Durée de l'épisode d'anxiété généralisée le plus long vécu par le répondant (en années).
Valeur de GADB_31B / 52 (arrondir à .01)	GADB_31 = 2	Durée du seul épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant (en années).
Valeur de GADB_31C / 12 (arrondir à .01)	GADB_31 = 3	Durée du seul épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant (en années).
Valeur de GADB_31D	GADB_31 = 4	Durée du seul épisode d'anxiété généralisée vécu par le répondant (en années).

18) Trouble d'anxiété généralisée – âge au moment de l'apparition

Nom de la variable : GADBDON

Basée sur : GADBDGDS, GADB_26, GADB_26A, GADB_26B

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable indique l'âge du répondant au moment où le répondant a vécu pour la première fois un épisode associé au trouble d'anxiété généralisée. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée.

Valeur de GADBDON	Condition(s)	Explication
Valeur de GADB_26A	GADBDGDS = 1 et GADB_26 = 1 et GADB_26A < SO	Âge du répondant au moment du premier épisode d'anxiété généralisée.
Valeur de GADB_26B	GADBDGDS = 1 et (GADB_26 = 2, NSP, R, ND) et GADB_26B < SO	Âge du répondant au moment du premier épisode d'anxiété généralisée.

SO	GABDGDGS = 2 ou GADB_26 = SO	Le répondant ne remplit pas les critères de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie ou on ne lui a pas posé les questions nécessaires au calcul.
ND	GABDGDGS = ND ou (GADB_26A = NSP, R, ND) ou (GADB_26B = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si (GADB_26A = SO, NSP, R, ND) alors GAD_26AT = manquant Si (GADB_26B = SO, NSP, R, ND) alors GAD_26BT = manquant Si (GADB_27C = SO, NSP, R, ND) alors GAD_27CT = manquant	Recoder toutes les non-réponses à données manquantes

19) Trouble d'anxiété généralisée - âge au moment de l'épisode le plus récent**Nom de la variable :** GABDREC**Basée sur :** GABDGDGS, GADB_26A, GADB_26B, GADB_27, GAD_27C, DHHB_AGE, GAD_RECT**Usage antérieur :** aucun**Description :** Cette variable indique l'âge du répondant au moment de l'épisode de trouble d'anxiété généralisée le plus récent. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI du trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.

Valeur de GABDREC	Condition(s)	Explication
Valeur de DHHB_AGE	GABDGDGS = 1 et GADB_27 = 1	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge courant.
SO	GABDGDGS = 2	Le répondant n'a pas rempli les critères de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.
ND	(GADB_27C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions prévues indicatrices du « dernier épisode ».
Valeur maximale de (GAD_26AT, GAD_26BT, GAD_27CT)	GABDGDGS = 1 et (GADB_26A < SO ou GADB_26B < SO ou GADB_27C < SO)	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge le plus récent déclaré pour tous les épisodes d'anxiété généralisée déclarés.
ND	GABDGDGS = ND ou (GADB_26A = NSP, R, ND) ou (GADB_26B = NSP, R, ND) ou (GADB_27C = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SO	GADB_26A = SO et GADB_26B = SO et GADB_27C = SO	On n'a pas posé au répondant les questions nécessaires au calcul.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si (GABBD05Y = SO, NSP, R, ND) alors GABBD05YT = manquant Si (GABBD74Y = SO, NSP, R, ND) alors GABBD74YT = manquant Si (GABBD77Y = SO, NSP, R, ND) alors GABBD77YT = manquant Si (GABBD7BY = SO, NSP, R, ND) alors GABBD7BYT = manquant Si (GABBD30Y = SO, NSP, R, ND) alors GABBD30YT = manquant Si (GABBD31Y = SO, NSP, R, ND) alors GABBD31YT = manquant	Recoder toutes les non-réponses à données manquantes

20) Trouble d'anxiété généralisée - persistance de l'anxiété généralisée (en années)**Nom de la variable :** GABBDPER**Basée sur :** GABBDGDS, GAD_PERT, GABBD05Y, GABBD74Y, GABBD77Y, GABBD7BY, GABBD30Y, GABBD31Y**Usage antérieur :** aucun**Description :** Cette variable indique l'épisode d'anxiété généralisée le plus long vécu par le répondant. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.

Valeur de GABBDPER	Condition(s)	Explication
SO	GABBDGDS = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie
ND	GABBD05Y = ND et GABBD31Y = ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions prévues indicatrices de l'« épisode le plus long ».
Valeur maximale de (GABBD05YT, GABBD74YT, GABBD77YT, GABBD7BYT, GABBD30YT, GABBD31YT) (arrondir à .01)	GABBDGDS = 1 et Au moins 1 de (GABBD05YT, GABBD74YT, GABBD77YT, GABBD7BYT, GABBD30YT, GABBD31YT) n'est pas manquant	La persistance est la durée du plus long épisode d'anxiété généralisée déclaré.
ND	GABBDGDS = ND ou GABBD05Y = ND ou GABBD74Y = ND ou GABBD77Y = ND ou GABBD7BY = ND ou GABBD30Y = ND ou GABBD31Y = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.
SO	GABBDGDS = 2 ou GABBD05Y = SO ou GABBD74Y = SO ou GABBD77Y = SO ou GABBD7BY = SO ou GABBD30Y = SO ou GABBD31Y = SO	On n'a pas posé au répondant les questions nécessaires au calcul.

Trouble d'anxiété généralisée– 12 mois**21) Trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois - critère A****Nom de la variable :** GABDYA**Basée sur :** GABDGDS**Usage antérieur :** aucun**Description :** Cette variable indique les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.

Valeur de GABDYA	Condition(s)	Explication
1	GABDGDS = 1	Le répondant remplit le critère A de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois. Le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.
2	GABDGDS = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois. Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie.
ND	(GABDGDS = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

22) Trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois - critère B**Nom de la variable :** GABDYB**Basée sur :** GADB_27, GADB_26A, GADB_26B, GADB_27C, DHHB_AGE**Usage antérieur :** aucun**Description :** Cette variable indique les répondants qui ont déclaré avoir vécu un épisode de trouble d'anxiété généralisée durant au moins six des douze mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de GABDYB	Condition(s)	Explication
1	GADB_27 = 1 ou GADB_26A = DHHB_AGE ou GADB_26B = DHHB_AGE ou GADB_27C = DHHB_AGE	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré avoir vécu un épisode d'anxiété généralisée au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

2	(GADB_27 = 2, SO) et (GADB_26A < DHHB_AGE ou GADB_26A = SO) et (GADB_26B < DHHB_AGE ou GADB_26B = SO) et (GADB_27C < DHHB_AGE ou GADB_27C = SO)	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré avoir vécu un épisode d'anxiété généralisée au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(GADB_27 = NSP, R, ND) ou (GADB_26A = NSP, R, ND) ou (GADB_26B = NSP, R, ND) ou (GADB_27C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

23) Trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois - critère C

Nom de la variable : GABBDYC

Basée sur : GADB_38A, GADB_381, GADB_382, GADB_38C, GADB_38D, GADB_40, GADB_58

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable indique les répondants qui ont déclaré la présence de symptômes entraînant une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de GABBDYC	Condition(s)	Explication
1	4 <= GADB_38A <= 10 ou 4 <= GADB_381 <= 10 ou 4 <= GADB_382 <= 10 ou 4 <= GADB_38C <= 10 ou 4 <= GADB_38D <= 10 ou 5 <= GADB_40 <= 365 ou GADB_58 = 1	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(0 <= GADB_38A <= 3 ou GADB_38A = SO) et (0 <= GADB_381 <= 3 ou (GADB_381 = 11, SO)) et (0 <= GADB_382 <= 3 ou (GADB_381 = 11, SO)) et (0 <= GADB_38C <= 3 ou GADB_38C = SO) et (0 <= GADB_38D <= 3 ou GADB_38D = SO) et (0 <= GADB_40 <= 4 ou GADB_40 = SO) et (GADB_58 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

ND	(GADB_38A = NSP, R, ND) ou (GADB_381 = NSP, R, ND) ou (GADB_382 = NSP, R, ND) ou (GADB_38C = NSP, R, ND) ou (GADB_38D = NSP, R, ND) ou (GADB_40 = NSP, R, ND) ou (GADB_58 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

24) Algorithme pour le trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : GADBDDY

Basée sur : GABDDYA, GABDDYB, GABDDYC

Usage antérieur : aucun

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si les répondants remplissent ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

- 1) remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie,
- 2) avoir vécu un épisode d'anxiété généralisée durant au moins six mois au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et
- 3) une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Valeur de GADBDDY	Condition(s)	Explication
1	GABDDYA = 1 et GABDDYB = 1 et GABDDYC = 1	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré (1) remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie, (2) avoir vécu un épisode d'anxiété généralisée durant au moins six mois au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et (3) une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

2	GABBDYA = 2 ou GABBDYB = 2 ou GABBDYC = 2	Le répondant ne remplit pas tous les critères de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré (1) remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours de la vie, (2) avoir vécu un épisode d'anxiété généralisée durant au moins six mois au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview ou (3) une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	GABBDYA = ND ou GABBDYB = ND ou GABBDYC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

25) Perturbation attribuable au trouble d'anxiété généralisée – moyenne

Nom de la variable : GABBDINT

Basée sur : GADB_38A, GADB_381, GADB_382, GADB_38C, GADB_38D, GABDDY

Usage Antérieur : aucun

Description : Cette variable décrit la perturbation que le trouble d'anxiété généralisée a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items.

Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois.

Valeur de GABBDINT	Condition(s)	Explication
SO	GABDDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois.
ND	GADB_38A = SO et GADB_381 = SO et GADB_382 = SO et GADB_38C = SO et GADB_38D = SO	Le répondant a répondu avoir vécu un épisode de trouble d'anxiété généralisé au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, mais les questions concernant la perturbation n'ont pas été posées.
ND	GABDDY = ND ou (GADB_38A = NSP, R, ND) ou (GADB_381 = NSP, R, ND) ou (GADB_382 = NSP, R, ND) ou (GADB_38C = NSP, R, ND) ou (GADB_38D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

(GADB_38A + GADB_381 + GADB_382 + GADB_38C + GADB_38D) / 5 (min. : 0.0; max. : 10.0) (arrondir à .1)	GADBDDY = 1 et 0 <= GADB_381 <= 10 et 0 <= GADB_382 <= 10 et 0 <= GADB_38A <= 10 et 0 <= GADB_38C <= 10 et 0 <= GADB_38D <= 10	Perturbation = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
(GADB_38A + GADB_382 + GADB_38C + GADB_38D) / 4 (min. : 0.0; max. : 10.0) (arrondir à .1)	GADBDDY = 1 et GADB_381 = 11 et 0 <= GADB_382 <= 10 et 0 <= GADB_38A <= 10 et 0 <= GADB_38C <= 10 et 0 <= GADB_38D <= 10	Perturbation = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. GADB_381 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
(GADB_38A + GADB_381 + GADB_38C + GADB_38D) / 4 (min. : 0.0; max. : 10.0) (arrondir à .1)	GADBDDY = 1 et 0 <= GADB_381 <= 10 et GADB_382 = 11 et 0 <= GADB_38A <= 10 et 0 <= GADB_38C <= 10 et 0 <= GADB_38D <= 10	Perturbation = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. GADB_382 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
(GADB_38A + GADB_38C + GADB_38D) / 3 (min. : 0.0; max. : 10.0) (arrondir à .1)	GADBDDY = 1 et GADB_381 = 11 et GADB_382 = 11 et 0 <= GADB_38A <= 10 et 0 <= GADB_38C <= 10 et 0 <= GADB_38D <= 10	Perturbation = moyenne de trois items qui s'appliquaient au répondant. GADB_381 et GADB_382 ne s'appliquait (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

26) Indicateur de la perturbation attribuable au trouble d'anxiété généralisée

Nom de la variable : GADBFINT

Basée sur : GADB_38A, GADB_381, GADB_382, GADB_38C, GADB_38D, GADBDDY

Usage Antérieur : aucun

Description : Cette variable décrit la perturbation que le trouble d'anxiété généralisée a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si le trouble d'anxiété généralisée perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne.

Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois.

Valeur de GADBFINT	Condition(s)	Explication
SO	GADBDDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de trouble d'anxiété généralisée au cours des 12 derniers mois.
ND	GADB_38A = SO et GADB_381 = SO et GADB_382 = SO et GADB_38C = SO et GADB_38D = SO	Le répondant a répondu avoir vécu un épisode de trouble d'anxiété généralisé au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, mais les questions concernant la perturbation n'ont pas été posées.

1	GADBDDY = 1 et (4 <= GADB_38A <= 10 ou 4 <= GADB_381 <= 10 ou 4 <= GADB_382 <= 10 ou 4 <= GADB_38C <= 10 ou 4 <= GADB_38D <= 10)	Le trouble d'anxiété généralisée a perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne au cours des 12 derniers mois.
2	GADBDDY = 1 et (0 <= GADB_38A <= 3 et (0 <= GADB_381 <= 3 ou GADB_381 = 11) et (0 <= GADB_382 <= 3 ou GADB_382 = 11) et 0 <= GADB_38C <= 3 et 0 <= GADB_38D <= 3)	Le trouble d'anxiété généralisée n'a pas perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne au cours des 12 derniers mois.
ND	GADBDDY = ND ou (GADB_38A = NSP, R, ND) ou (GADB_381 = NSP, R, ND) ou (GADB_382 = NSP, R, ND) ou (GADB_38C = NSP, R, ND) ou (GADB_38D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

État de stress post-traumatique (26 VD)

Pour les besoins de l'ESCC, l'état de stress post-traumatique est un état psychiatrique qui peut apparaître à la suite d'un événement traumatique constituant une menace de blessure ou de mort pour la personne ou pour autrui. Les symptômes de l'état de stress post-traumatique peuvent être classés dans l'une des trois grandes catégories, soit :

- 1) l'événement traumatique est constamment revécu, ce qui perturbe l'activité quotidienne (souvenirs répétitifs de l'événement provoquant un sentiment de détresse; rêves répétitifs de l'événement; épisodes de flash-back où l'événement semble se reproduire; réactions physiologiques à des situations pouvant rappeler l'événement traumatique);
- 2) évitement (incapacité de se rappeler d'aspects importants du traumatisme; absence d'intérêt pour les activités normales; sentiment de détachement; sentiment de ne pas avoir d'avenir; émoussement des émotions ou sentiment d'être détaché de tout; gamme restreinte d'humeurs; efforts pour éviter les endroits, les personnes ou les objets qui éveillent des souvenirs du traumatisme);
- 3) activation neurovégétative (irritabilité ou accès de colère; difficultés de sommeil; difficultés de concentration; réaction de sursaut exagérée; hyper vigilance).

Les questions sur l'état de stress post-traumatique sont fondées sur une version reconnue du 'World Mental Health du Composite International Diagnostic Interview' (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l'ESCC. L'instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le monde.

Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l'évaluation des troubles mentaux conformément à l'opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L'abréviation DSM désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l'ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV ou le DSM-III-R. L'ESCC 1.2 n'offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10.

Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC (interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de travail qui examinera les différences méthodologiques pour s'assurer que les comparaisons entre pays soient faites de façon appropriée.

L'état de stress post-traumatique est l'un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s'entend des 12 mois qui ont précédé l'interview.

La documentation qui accompagne les données de l'ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récurrence, à la durée, à l'âge au moment de l'apparition et à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses.

En ce qui concerne l'état de stress post-traumatique, les variables d'intérêt sont :

Variable	Concept	Numéro d la variable
PTSBPDS	Algorithme – vie	15
PTSBDDY	Algorithme - 12 mois	24

PTSBDKBY	Durée	17
PTSBDINT	Perturbation – 12 mois	25

Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées à l'état de stress post-traumatique, ainsi que leur variables temporaires respectives sont opérationnalisées de façon à satisfaire partiellement aux définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire.

L'instrument de l'ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d'informations sur le nombre de symptômes, la gravité, la durée et l'intensité globale du trouble. Toutefois, l'approche structurée utilisée pour l'instrument informatisé n'est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n'existe aucun algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du trouble. En outre, bien que l'instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour l'opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe.

En plus de l'information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l'utilisation des services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l'ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé que les données de l'ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l'information canadienne déjà recueillie dans le cadre de l'ESCC 1.1 et des cycles de l'ENSP réalisés antérieurement.

Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. Cette correspondance vise uniquement à faciliter l'interprétation des résultats en permettant un langage commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l'existence d'une correspondance directe entre nos critères et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au questionnaire et aux algorithmes.

Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un état de stress post-traumatique au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

- 1) avoir été exposé à un événement traumatique dans lequel il a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement blessés ou ont été menacés de mort ou de blessure grave, ou bien durant lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui a été menacée;
- 2) avoir été exposé à un événement traumatique auquel sa réaction s'est traduite par une peur intense ou un sentiment d'impuissance ou d'horreur;
- 3) revivre de façon persistante l'événement traumatique en ayant des souvenirs, des rêves ou des 'flash-back' répétitifs provoquant un sentiment intense de détresse ou une réactivité psychologique lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement;
- 4) un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale;
- 5) la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative accrue;
- 6) que la perturbation dure plus d'un mois; et

- 7) qu'elle entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un état de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois :

- 1) remplir les critères d'état de stress post-traumatique au cours de la vie;
- 2) avoir eu des réactions au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview;
- 3) avoir revécu l'événement en ayant des souvenirs, des rêves ou des 'flash-back' répétitifs provoquant un sentiment de détresse ou une réactivité physiologique lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview;
- 4) un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview;
- 5) la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

État de stress post-traumatique – Au cours de la vie

1) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère A, partie 1

Nom de la variable : PTSBDA1

Basée sur : PTSB_01, PTSB_02, PTSB_03, PTSB_04A

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir été exposés à un événement traumatique dans lequel ils ont vécu, ont été témoins ou ont été confrontés à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement blessés ou ont été menacés de mort ou de blessure grave, ou bien durant lesquels l'intégrité physique du répondant ou celle d'autrui a été menacée.

Nota : Cette variable détermine si un événement a été déclaré pour soit PTSB_03, soit PTSB_04. Comme PTSB_04 était une question de type « Cochez toutes les réponses applicables », déterminer une non-réponse pour tous.

Valeur de PTSBDA1	Condition(s)	Explication
1	PTSB_01 = 1 et (PTSB_03 < SO ou PTSB_04A = 1, 2)	Le répondant remplit le critère A, partie 1, de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré avoir été exposé à un événement traumatique.
2	(PTSB_01 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré avoir été exposé à un événement traumatique.
ND	(PTSB_01 = NSP, R, ND) ou (PTSB_02 = NSP, R, ND) ou (PTSB_03 = NSP, R, ND) ou (PTSB_04A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère A, partie 2

Nom de la variable : PTSBDA2

Basée sur : PTSB_F7, PTSB_F7A, PTSB_F7B, PTSB_F7C

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leur réaction à leur pire événement traumatique s'est traduite par une peur intense ou un sentiment d'impuissance ou d'horreur.

Valeur de PTSBDA2	Condition(s)	Explication
1	PTSB_F7 = 1 ou PTSB_F7A = 1 ou PTSB_F7B = 1 ou PTSB_F7C = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré que sa réaction s'est traduite par une peur intense ou un sentiment d'impuissance ou d'horreur.
2	(PTSB_F7 = 2, SO) et (PTSB_F7A = 2, SO) et (PTSB_F7B = 2, SO) et (PTSB_F7C = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que sa réaction s'est traduite par une peur intense ou un sentiment d'impuissance ou d'horreur.
ND	(PTSB_F7 = NSP, R, ND) ou (PTSB_F7A = NSP, R, ND) ou (PTSB_F7B = NSP, R, ND) ou (PTSB_F7C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

3) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère A (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : PTSBDA

Basée sur : PTSBDA1, PTSBDA2

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique que les répondants ont déclaré :

- 1) avoir été exposés à un événement traumatique dans lequel ils ont vécu, ont été témoins ou ont été confrontés à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement blessés ou ont été menacés de mort ou de blessure grave, ou bien durant lesquels l'intégrité physique du répondant ou celle d'autrui a pu être menacée; et
- 2) que leur réaction à leur pire événement traumatique s'est traduite par une peur intense ou un sentiment d'impuissance ou d'horreur.

Valeur de PTSBDA	Condition(s)	Explication
1	PTSBDA1 = 1 et PTSBDA2 = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré avoir été exposé à un événement traumatique auquel sa réaction s'est traduite par une peur intense ou un sentiment d'impuissance ou d'horreur.
2	PTSBDA1 = 2 ou PTSBDA2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré avoir été exposé à un événement traumatique ou y avoir réagi par une peur intense ou un sentiment d'impuissance ou d'horreur.
ND	PTSBDA1 = ND ou PTSBDA2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

4) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère B, partie 1

Nom de la variable : PTSBDB1

Basée sur : PTSB_H6, PTSB_H7, PTSB_H8, PTSB_H9, PTSB_I0

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré revivre l'événement traumatique de l'une ou de plusieurs des façons suivantes : sentiments répétitifs et envahissants de l'événement provoquant un sentiment de détresse; rêves répétitifs de l'événement provoquant un sentiment de détresse; impression ou agissements soudains « comme si » l'événement traumatique allait se reproduire, par exemple des 'flash-back' ou des hallucinations; ou détresse physiologique intense lors de l'exposition à des indices internes ou externes pouvant évoquer un aspect de l'événement traumatique en cause ou y ressembler.

Valeur de PTSBDB1	Condition(s)	Explication
1	PTSB_H6 = 1 ou PTSB_H7 = 1 ou PTSB_H8 = 1 ou PTSB_H9 = 1 ou PTSB_I0 = 1	Le répondant remplit le critère B, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré revivre l'événement traumatique en ayant des souvenirs, des rêves et des 'flash-back' répétitifs provoquant un sentiment de détresse ou une détresse physiologique intense lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement.

2	(PTSB_H6 = 2, SO) et (PTSB_H7 = 2, SO) et (PTSB_H8 = 2, SO) et (PTSB_H9 = 2, SO) et (PTSB_I0 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère B, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré revivre l'événement traumatique en ayant des souvenirs, des rêves et des flash-back répétitifs provoquant un sentiment de détresse ou une détresse physiologique intense lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement.
ND	(PTSB_H6 = NSP, R, ND) ou (PTSB_H7 = NSP, R, ND) ou (PTSB_H8 = NSP, R, ND) ou (PTSB_H9 = NSP, R, ND) ou (PTSB_I0 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère B, partie 2

Nom de la variable : PTSBDB2

Basée sur : PTSB_L3

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré revivre constamment l'événement traumatique. Les répondants remplissant le critère de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI ont déclaré que leurs réactions se produisent au moins une fois par mois.

Valeur de PTSBDB2	Condition(s)	Explication
1	(PTSB_L3 = 2, 3, 4, 5)	Le répondant remplit le critère B, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré des réactions se produisant au moins une fois par mois.
2	(PTSB_L3 = 1, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère B, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré de réactions se produisant au moins une fois par mois.
ND	(PTSB_L3 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

6) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère B (parties 1, 2 combinées)

Nom de la variable : PTSBDB

Basée sur : PTSBDB1, PTSBDB2

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré :

- 1) revivre l'événement traumatique en ayant des souvenirs, des rêves ou des flash-back répétitifs provoquant un sentiment de détresse ou une détresse psychologique intense lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement; et
- 2) que ces réactions se produisent au moins une fois par mois.

Valeur de PTSBDB	Condition(s)	Explication
1	PTSBDB1 = 1 et PTSBDB2 = 1	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré revivre l'événement en ayant des souvenirs, des rêves ou des flash-back répétitifs provoquant un sentiment de détresse ou une détresse physiologique intense lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement, et que ces réactions se produisent au moins une fois par mois.
2	PTSBDB1 = 2 ou PTSBDB2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré revivre un événement traumatique en ayant des souvenirs, des rêves ou des flash-back répétitifs provoquant un sentiment de détresse ou une détresse physiologique intense lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement, ou bien ces réactions ne se produisent pas au moins une fois par mois.
ND	PTSBDB1 = ND ou PTSBDB2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

7) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère C, partie 1

Nom de la variable : PTSBDC1

Basée sur : PTSB_F8, PTSB_F9, PTSB_G0, PTSB_G1, PTSB_G2, PTSB_G3, PTSB_G4

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale comme en témoigne la présence d'au moins trois des manifestations suivantes :

- 1) efforts pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations associés au traumatisme;
- 2) efforts pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui éveillent des souvenirs du traumatisme;
- 3) incapacité de se rappeler d'un aspect important du traumatisme;
- 4) réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes ou bien réduction de la participation à ces activités;
- 5) sentiment de détachement d'autrui ou bien de devenir étranger par rapport aux autres;
- 6) restriction des affects;
- 7) sentiment d'avenir « bouché ».

Valeur de PTSBDC1	Condition(s)	Explication
1	Au moins trois de : (PTSB_F8, PTSB_F9, PTSB_G0, PTSB_G1, PTSB_G2, PTSB_G3, PTSB_G4) = 1	Le répondant remplit le critère C, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale.
2	Au moins cinq de : (PTSB_F8, PTSB_F9, PTSB_G0, PTSB_G1, PTSB_G2, PTSB_G3, PTSB_G4) = 2, SO	Le répondant ne remplit pas le critère C, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale.
ND	(PTSB_F8 = NSP, R, ND) ou (PTSB_F9 = NSP, R, ND) ou (PTSB_G0 = NSP, R, ND) ou (PTSB_G1 = NSP, R, ND) ou (PTSB_G2 = NSP, R, ND) ou (PTSB_G3 = NSP, R, ND) ou (PTSB_G4 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère C, partie 2

Nom de la variable : PTSBDC2

Basée sur : PTSB_L3

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs réactions d'évitement et d'émoussement sont persistantes. Les répondants qui remplissent le critère de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI ont déclaré que leurs réactions se produisent au moins une fois par mois.

Valeur de PTSBDC2	Condition(s)	Explication
1	(PTSB_L3 = 2, 3, 4, 5)	Le répondant remplit le critère C, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré que ses réactions se produisent au moins une fois par mois.
2	(PTSB_L3 = 1, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C, partie 2 de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré de réactions se produisant au moins une fois par mois.
ND	(PTSB_L3 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

9) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère C (parties 1, 2 combinées)

Nom de la variable : PTSBDC

Basée sur : PTSBDC1, PTSBDC2

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale ainsi que des réactions se produisant au moins une fois par mois.

Valeur de PTSBDC	Condition(s)	Explication
1	PTSBDC1 = 1 et PTSBDC2 = 1	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale ainsi que des réactions se produisant au moins une fois par mois.
2	PTSBDC1 = 2 ou	Le répondant ne remplit pas le

	PTSBDC2 = 2	critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale ou bien ses réactions ne produisent pas au moins une fois par mois.
ND	PTSBDC1 = ND ou PTSBDC2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

10) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère D, partie 1

Nom de la variable : PTSBDD1

Basée sur : PTSB_J2, PTSB_J3, PTSB_J4, PTSB_J5, PTSB_J6

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative comme en témoigne la présence d'au moins deux des manifestations suivantes :

- 1) difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu;
- 2) irritabilité ou accès de colère;
- 3) difficultés de concentration;
- 4) hyper vigilance; et
- 5) réaction de sursaut exagérée.

Valeur de PTSBDD1	Condition(s)	Explication
1	Au moins deux de : (PTSB_J2, PTSB_J3, PTSB_J4, PTSB_J5, PTSB_J6) = 1	Le répondant remplit le critère D, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative.
2	Au moins quatre de : (PTSB_J2, PTSB_J3, PTSB_J4, PTSB_J5, PTSB_J6) = 2, SO	Le répondant ne remplit pas le critère D, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative.
ND	(PTSB_J2 = NSP, R, ND) ou (PTSB_J3 = NSP, R, ND) ou (PTSB_J4 = NSP, R, ND) ou (PTSB_J5 = NSP, R, ND) ou (PTSB_J6 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

11) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère D, partie 2

Nom de la variable : PTSBDD2

Basée sur : PTSB_L3

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré la présence de symptômes persistants d'activation neurovégétative. Les répondants qui remplissent le critère de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI ont déclaré que leurs réactions se produisent au moins une fois par mois.

Valeur de PTSBDD2	Condition(s)	Explication
1	(PTSB_L3 = 2, 3, 4, 5)	Le répondant remplit le critère D, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré que ses réactions se produisent au moins une fois par mois.
2	(PTSB_L3 = 1, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère D, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré de réactions se produisant au moins une fois par mois.
ND	PTSB_L3 = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

12) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère D (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : PTSBDD

Basée sur : PTSBDD1, PTSBDD2

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré :

- 1) la présence de symptômes traduisant une activation neurovégétative et
- 2) que les symptômes se produisent au moins une fois par mois.

Valeur de PTSBDD	Condition(s)	Explication
1	PTSBDD1 = 1 et PTSBDD2 = 1	Le répondant remplit le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré la présence de symptômes traduisant une activation neurovégétative et se produisant au moins une fois par mois.

2	PTSBDD1 = 2 ou PTSBDD2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative et se produisant au moins une fois par mois.
ND	PTSBDD1 = ND ou PTSBDD2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

13) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère E

Nom de la variable : PTSBDE

Basée sur : PTSB_KB1, PTSB_KB2, PTSB_KB3, PTSB_KB4, PTSB_KB5, PTSB_L1

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs réactions à leur pire événement ont duré au moins un mois.

Valeur de PTSBDE	Condition(s)	Explication
1	30 <= PTSB_KB2 <= 901 ou 4 <= PTSB_KB3 <= 104 ou 1 <= PTSB_KB4 <= 36 ou 1 <= PTSB_KB5 < 996 ou PTSB_L1 = 1	Le répondant remplit le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré des réactions d'une durée d'au moins un mois.
2	(PTSB_KB2 < 30 ou PTSB_KB3 < 4 ou PTSB_KB1 = SO) et (PTSB_L1 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré de réactions d'une durée d'au moins un mois. Nota : Comme la durée minimale pour PTSB_KB4 et PTSB_KB5 est d'un mois et d'un an, respectivement, il n'est pas nécessaire de les inclure dans la déclaration Non.
ND	PTSB_KB1 = NSP, R, ND) ou PTSB_KB2 = NSP, R, ND) ou PTSB_KB3 = NSP, R ND) ou PTSB_KB4 = NSP, R, ND) ou PTSB_KB5 = NSP, R, ND) ou PTSB_L1 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

14) État de stress post-traumatique au cours de la vie – critère F

Nom de la variable : PTSBDF

Basée sur : PTSB_L4, PTSB_L5, PTSB_80, PTSB_78A, PTSB_781, PTSB_782, PTSB_78C, PTSB_78D, PTSB_89

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs réactions au traumatisme ont entraîné une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Nota : La WMH2000 n'inclut pas PTSB_89 (jamais hospitalisé) mais son inclusion est conforme aux algorithmes pour d'autres troubles.

Valeur de PTSBDF	Condition(s)	Explication
1	(PTSB_L4 = 3, 4, 5) ou (PTSB_L5 = 3, 4, 5) ou (5 <= PTSB_80 < 996) ou (4 <= PTSB_78A <= 10) ou (4 <= PTSB_781 <= 10) ou (4 <= PTSB_782 <= 10) ou (4 <= PTSB_78C <= 10) ou (4 <= PTSB_78D <= 10) ou PTSB_89 = 1	Le répondant remplit le critère F de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant a déclaré que ses réactions ont entraîné une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
2	(PTSB_L4 = 1, 2, NA) et (PTSB_L5 = 1, 2, NA) et (PTSB_80 < 5 or PTSB_80 = 996) et (PTSB_78A < 4 or PTSB_78A = 96) et (PTSB_781 < 4 or PTSB_781 = 96) et (PTSB_782 < 4 or PTSB_782 = 96) et (PTSB_78C < 4 or PTSB_78C = 96) et (PTSB_78D < 4 or PTSB_78D = 96) et (PTSB_89 = 2, NA)	Le répondant ne remplit pas le critère F de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI, de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré de réactions qui ont entraîné une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	(PTSB_L4 = DK, R, NS) ou (PTSB_L5 = DK, R, NS) ou (PTSB_80 = DK, R, NS) ou (PTSB_78A = DK, R, NS) ou (PTSB_781 = DK, R, NS) ou (PTSB_782 = DK, R, NS) ou (PTSB_78C = DK, R, NS) ou (PTSB_78D = DK, R, NS) ou (PTSB_89 = DK, R, NS)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

15) Algorithme pour l'état de stress post-traumatique au cours de la vie

Nom de la variable : PTSBDPDS

Basée sur : PTSBDA, PTSBDB, PTSBDC, PTSBDD, PTSBDE, PTSBDF

Usage antérieur : Aucun

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si les répondants remplissent ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères ont déclaré :

- 1) avoir été exposés à un événement traumatique dans lequel le répondant a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement blessés ou ont été menacés de mort ou de blessure grave ou bien durant lesquels l'intégrité physique du répondant ou celle d'autrui a pu être menacée;
- 2) réagir à l'événement traumatique par une peur intense ou un sentiment d'impuissance ou d'horreur;
- 3) revivre l'événement constamment en ayant des souvenirs, des rêves ou des flash-back répétitifs provoquant un sentiment de détresse ou une réactivité physiologique lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement;
- 4) un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale;
- 5) la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative;
- 6) des réactions d'une durée d'au moins un mois; et
- 7) des réactions entraînant une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Valeur de PTSBDPDS	Condition(s)	Explication
1	PTSBDA = 1 et PTSBDB = 1 et PTSBDC = 1 et PTSBDD = 1 et PTSBDE = 1 et PTSBDF = 1	Le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie.
2	PTSBDA = 2 ou PTSBDB = 2 ou PTSBDC = 2 ou PTSBDD = 2 ou PTSBDE = 2 ou PTSBDF = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie.
ND	PTSBDA = ND ou PTSBDB = ND ou PTSBDC = ND ou PTSBDD = ND ou PTSBDE = ND ou PTSBDF = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

16) Délai entre le pire événement et le début des symptômes (en années)**Nom de la variable :** PTSBDKAY**Basée sur :** PTSB_KA1, PTSB_KA2, PTSB_KA3, PTSB_KA4, PTSB_KA5**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable indique le délai écoulé entre le moment où le pire événement a eu lieu et le début des symptômes (en années).

Valeur de PTSBDKAY	Condition(s)	Explication
SO	PTSB_KA1 = SO	On n'a pas posé au répondant les questions nécessaires au calcul.
ND	(PTSB_KA1 = NSP, R, ND) ou (PTSB_KA2 = NSP, R, ND) ou (PTSB_KA3 = NSP, R, ND) ou (PTSB_KA4 = NSP, R, ND) ou (PTSB_KA5 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur dans PTSB_KA2 / 365 (arrondir à .01)	PTSB_KA2 <= 901	Période écoulée entre le pire événement et le début des symptômes (en années).
Valeur dans PTSB_KA3 / 52 (arrondir à .01)	PTSB_KA3 <= 104	Période écoulée entre le pire événement et le début des symptômes (en années).
Valeur dans PTSB_KA4 / 12 (arrondir à .01)	PTSB_KA4 <= 36	Période écoulée entre le pire événement et le début des symptômes (en années).
Valeur dans PTSB_KA5	PTSB_KA5 < SO	Période écoulée entre le pire événement et le début des symptômes (en années).

17) Durée des symptômes associés au pire événement (en années)**Nom de la variable :** PTSBDKBY**Basée sur :** PTSB_KB1, PTSB_KB2, PTSB_KB3, PTSB_KB4, PTSB_KB5**Usage antérieur :** Aucun**Description :** Cette variable indique la durée des réactions du répondant (en années).

Valeur de PTSBDKBY	Condition(s)	Explication
SO	PTSB_KB1 = SO	On n'a pas posé au répondant les questions nécessaires au calcul.
ND	(PTSB_KB1 = NSP, R, ND) ou (PTSB_KB2 = NSP, R, ND) ou (PTSB_KB3 = NSP, R, ND) ou (PTSB_KB4 = NSP, R, ND) ou (PTSB_KB5 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur dans PTSB_KB2 / 365 (arrondir à .01)	PTSB_KB2 <= 901	Durée des réactions au pire épisode (en années).
Valeur dans PTSB_KB3 / 52 (arrondir à .01)	PTSB_KB3 <= 104	Durée des réactions au pire épisode (en années).
Valeur dans PTSB_KB4 / 12 (arrondir à .01)	PTSB_KB4 <= 36	Durée des réactions au pire épisode (en années).

Valeur dans PTSB_KB5	PTSB_KB5 < SO	Durée des réactions au pire épisode (en années).
----------------------	---------------	--

18) État de stress post-traumatique – persistance de l'ESPT (en années)

Nom de la variable : PTSBDPER

Basée sur : PTSBDPDS, PTSBDKBY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique la plus longue période durant laquelle le répondant a continué d'avoir les réactions associées à son pire événement traumatique (en années). Calculé seulement pour les répondants qui remplissent les critères d'état de stress post-traumatique au cours de la vie.

Valeur de PTSBDPER	Condition(s)	Explication
SO	PTSDPDS = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie.
Valeur de PTS_PER	PTSDPDS = 1 et PTSDKBY < SO	Durée des réactions au pire épisode (en années).
ND	PTSDPDS = ND ou PTSDKBY = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

État de stress post-traumatique – 12 derniers mois

19) État de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois – critère A

Nom de la variable : PTSBDYA

Basée sur : PTSDPDS

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie.

Valeur de PTSBDYA	Condition(s)	Explication
1	PTSDPDS = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 derniers mois. Le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie.
2	PTSDPDS = 2	Répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 derniers mois. Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours de la vie.
ND	PTSDPDS = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

20) État de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois – critère B**Nom de la variable** : PTSBDYB**Basée sur** : PTSB_Z0**Usage antérieur** : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent avoir des réactions comme des souvenirs ou des rêves provoquant un sentiment de détresse, un sentiment d'être détaché des autres ou déprimé, des troubles au niveau du sommeil ou de la concentration, ou être plus énervé ou sursauter plus facilement, qui ont commencé au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de PTSBDYB	Condition(s)	Explication
1	PTSB_Z0 = 1	Répondant remplit tous les critères B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 derniers mois. Le répondant a déclaré avoir eu des réactions associées à l'état de stress post-traumatique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(PTSB_Z0 = 2, SO)	Répondant ne remplit pas tous les critères B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré avoir eu des réactions associées à l'état de stress post-traumatique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(PTSB_Z0 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

21) État de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois – critère C

Nom de la variable : PTSBDYC

Basée sur : PTSB_Z1H, PTSB_Z1I, PTSB_Z1J, PTSB_Z1K, PTSB_Z1L

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré revivre l'événement en ayant des souvenirs ou des rêves répétitifs provoquant un sentiment de détresse, l'impression ou des agissements « comme si » l'événement allait se reproduire ou un sentiment de détresse psychologique ou une détresse physiologique intense lors de l'exposition à des indices internes ou externes pouvant évoquer un aspect de l'événement traumatique ou y ressembler au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Nota : Les questions sont équivalentes à celles utilisées pour le critère B, partie 1, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie.

Valeur de PTSBDYC	Condition(s)	Explication
1	PTSB_Z1H = 1 ou PTSB_Z1I = 1 ou PTSB_Z1J = 1 ou PTSB_Z1K = 1 ou PTSB_Z1L = 1	Répondant remplit tous les critères C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 derniers mois. Le répondant a déclaré avoir revécu l'événement en ayant des souvenirs, des rêves ou des flash-back répétitifs provoquant un sentiment de détresse ou une détresse physiologique intense lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'interview.
2	(PTSB_Z1H = 2, SO) et (PTSB_Z1I = 2, SO) et (PTSB_Z1J = 2, SO) et (PTSB_Z1K = 2, SO) et (PTSB_Z1L = 2, SO)	Répondant ne remplit pas tous les critères C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré avoir revécu l'événement en ayant des souvenirs, des rêves ou des flash-back répétitifs provoquant un sentiment de détresse ou une détresse physiologique intense lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'interview.
ND	(PTSB_Z1H = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1I = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1J = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1K = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1L = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

22) État de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois – critère D

Nom de la variable : PTSBDYD

Basée sur : PTSB_Z1A, PTSB_Z1B, PTSB_Z1C, PTSB_Z1D, PTSB_Z1E, PTSB_Z1F, PTSB_Z1G

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale comme en témoigne la présence d'au moins trois des manifestations suivantes au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview :

- 1) efforts pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations associés au traumatisme;
- 2) efforts pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui éveillent des souvenirs du traumatisme;
- 3) incapacité de se rappeler d'un aspect important du traumatisme;
- 4) réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes ou bien réduction de la participation à ces activités;
- 5) sentiment de détachement d'autrui ou bien de devenir étranger par rapport aux autres;
- 6) restriction des affects;
- 7) sentiment d'avenir « bouché ».

Nota : Ce critère n'est pas utilisé dans l'algorithme de la WMH2000. Les questions sont équivalentes à celles utilisées pour le critère C, partie 1, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie.

Valeur de PTSBDYD	Condition(s)	Explication
1	Au moins trois de : (PTSB_Z1A, PTSB_Z1B, PTSB_Z1C, PTSB_Z1D, PTSB_Z1E, PTSB_Z1F, PTSB_Z1G) = 1	Répondant remplit tous les critères D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 derniers mois. Le répondant a déclaré un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	Au moins cinq de : (PTSB_Z1A, PTSB_Z1B, PTSB_Z1C, PTSB_Z1D, PTSB_Z1E, PTSB_Z1F, PTSB_Z1G) = 2, SO	Répondant ne remplit pas tous les critères D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(PTSB_Z1A = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1B = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1C = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1D = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1E = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1F = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1G = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

23) État de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois – critère E

Nom de la variable : PTSBDYE

Basée sur : PTSB_Z1M, PTSB_Z1N, PTSB_Z1O, PTSB_Z1P, PTSB_Z1Q

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative comme en témoigne la présence d'au moins deux des manifestations suivantes au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview :

- 1) difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu;
- 2) irritabilité ou accès de colère;
- 3) difficultés de concentration;
- 4) hyper vigilance;
- 5) réaction de sursaut exagérée.

Nota : Les questions sont équivalentes à celles utilisées pour le critère D, partie 1, d'état de stress post-traumatique au cours de la vie.

Valeur de PTSBDYE	Condition(s)	Explication
1	Au moins deux de : (PTSB_Z1M, PTSB_Z1N, PTSB_Z1O, PTSB_Z1P, PTSB_Z1Q) = 1	Répondant remplit tous les critères E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 derniers mois. Le répondant a déclaré la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	Au moins quatre de : (PTSB_Z1M, PTSB_Z1N, PTSB_Z1O, PTSB_Z1P, PTSB_Z1Q) = 2, SO	Répondant ne remplit pas tous les critères E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour les 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(PTSB_Z1M = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1N = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1O = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1P = NSP, R, ND) ou (PTSB_Z1Q = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

24) Algorithme pour un état de stress post-traumatique au cours des 12 mois derniers mois

Nom de la variable : PTSBDDY

Basée sur : PTSBDYA, PTSBDYB, PTSBDYC, PTSBDYD, PTSBDYE

Usage antérieur : Aucun

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si les répondants remplissent ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de l'état de stress post-traumatique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères ont déclaré :

- 1) remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de l'état de stress post-traumatique au cours de la vie;
- 2) avoir eu des réactions au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview;
- 3) avoir revécu l'événement en ayant des souvenirs, des rêves ou des 'flash-back' répétitifs provoquant un sentiment de détresse ou une réactivité physiologique lors de l'exposition à ce qui rappelle l'événement au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview;

- 4) un évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et un émoussement de la réactivité générale au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview; et
- 5) la présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de PTSBDDY	Condition(s)	Explication
1	PTSB_DYA = 1 et PTSB_DYB = 1 et PTSB_DYC = 1 et PTSB_DYD = 1 et PTSB_DYE = 1	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois.
2	PTSB_DYA = 2 ou PTSB_DYB = 2 ou PTSB_DYC = 2 ou PTSB_DYD = 2 ou PTSB_DYE = 2	Le répondant ne remplit pas tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'état de stress post-traumatique au cours des 12 derniers mois.
ND	PTSB_DYA = ND ou PTSB_DYB = ND ou PTSB_DYC = ND ou PTSB_DYD = ND ou PTSB_DYE = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

25) Trouble attribuable à l'état de stress post-traumatique (ESPT) – moyenne

Nom de la variable : PTSBDINT

Basée sur : PTSB_78A, PTSB_781, PTSB_782, PTSB_78C, PTSB_78D, PTSBDDY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit la perturbation que le ESPT a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items.

Nota : Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de ESPT au cours des 12 derniers mois.

Valeur de PTSBDINT	Condition(s)	Explication
SO	PTSBDDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de ESPT au cours des 12 derniers mois.
ND	PTSB_78A = SO	Les questions concernant la perturbation n'ont pas été posées au répondant parce qu'il y avait incohérence dans ses réponses.
ND	PTSBDDY = ND ou (PTSB_78A = NSP, R, ou ND) ou (PTSB_781 = NSP, R, ou ND) ou (PTSB_782 = NSP, R, ou ND) ou (PTSB_78C = NSP, R, ou ND) ou (PTSB_78D = NSP, R, ou ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$(PTSB_78A + PTSB_781 + PTSB_782 + PTSB_78C + PTSB_78D) / 5$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PTSBDDY = 1 et $0 \leq PTSB_781 \leq 10$ et $0 \leq PTSB_782 \leq 10$ et $0 \leq PTSB_78A \leq 10$ et $0 \leq PTSB_78C \leq 10$ et $0 \leq PTSB_78D \leq 10$	Perturbation = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.

(PTSB_78A + PTSB_782 + PTSB_78C + PTSB_78D) / 4 (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PTSBDDY = 1 et PTSB_781 = 11 et 0 <= PTSB_782 <= 10 et 0 <= PTSB_78A <= 10 et 0 <= PTSB_78C <= 10 et 0 <= PTSB_78D <= 10	Perturbation = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. PTSB_781 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
(PTSB_78A + PTSB_781 + PTSB_78C + PTSB_78D) / 4 (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PTSBDDY = 1 et 0 <= PTSB_781 <= 10 et PTSB_782 = 11 et 0 <= PTSB_78A <= 10 et 0 <= PTSB_78C <= 10 et 0 <= PTSB_78D <= 10	Perturbation = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. PTSB_782 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
(PTSB_78A + PTSB_78C + PTSB_78D) / 3 (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PTSBDDY = 1 et PTSB_781 = 11 et PTSB_782 = 11 et 0 <= PTSB_78A <= 10 et 0 <= PTSB_78C <= 10 et 0 <= PTSB_78D <= 10	Perturbation = moyenne de trois items qui s'appliquaient au répondant. PTSB_781 et PTSB_782 ne s'appliquaient pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

26) Indicateur du trouble attribuable à l'état de stress post-traumatique (ESPT)

Nom de la variable : PTSBFINT

Basée sur : PTSB_78A, PTSB_781, PTSB_782, PTSB_78C, PTSB_78D, PTSBDDY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit la perturbation que le ESPT a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si l'ESPT perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne.

Nota : Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de ESPT au cours des 12 derniers mois.

Valeur de PTSBFINT	Condition(s)	Explication
SO	PTSBDDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de ESPT au cours des 12 derniers mois.
ND	PTSB_78A = SO	Les questions concernant la perturbation n'ont pas été posées au répondant parce qu'il y avait incohérence dans ses réponses.
1	PTSBDDY = 1 et (4 <= PTSB_78A <= 10 ou 4 <= PTSB_781 <= 10 ou 4 <= PTSB_782 <= 10 ou 4 <= PTSB_78C <= 10 ou 4 <= PTSB_78D <= 10)	Le ESPT a perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne au cours des 12 derniers mois.

2	PTSBDDY = 1 et (0 <= PTSB_78A <= 3 et (0 <= PTSB_781 <= 3 ou PTSB_781 = 11) et (0 <= PTSB_782 <= 3 ou PTSB_782 = 11) et 0 <= PTSB_78C <= 3 et 0 <= PTSB_78D <= 3)	Le ESPT n'a pas perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne au cours des 12 derniers mois.
ND	PTSBDDY = ND ou (PTSB_78A = NSP, R, ND) ou (PTSB_781 = NSP, R, ND) ou (PTSB_782 = NSP, R, ND) ou (PTSB_78C = NSP, R, ND) ou (PTSB_78D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Consommation d'alcool (3 VD)

Ces variables examinent la fréquence, la régularité et l'ampleur de la consommation d'alcool.

1) Genre de buveur

Nom de la variable : ALCBDTYP

Basée sur : ALCB_2, ALCB_5B

Usage antérieur :

ESCC cycle 1.1 : ALCADTYP

ENSP cycle 4 : ALCODTYP

ENSP cycle 3 : ALC8DTYP

ENSP cycle 2 : ALC6DTYP

ENSP cycle 1 : ALC4DTYP

Description : Cette variable détermine le genre de buveur du répondant en fonction de ses habitudes de consommation.

Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm

Valeur de ALCBDTYP	Condition(s)	Explication
ND	(ALCB_2 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
1	$1 < \text{ALCB_2} < \text{SO}$	Buveur régulier
2	$\text{ALCB_2} = 1$	Buveur occasionnel
3	$\text{ALCB_5B} = 1$	Ancien buveur
4	$\text{ALCB_5B} = 2$	N'a jamais bu

2) Consommation hebdomadaire

Nom de la variable : ALCBDWKY

Basée sur : ALCB_1, ALCB_5A1, ALCB_5A2, ALCB_5A3, ALCB_5A4, ALCB_5A5, ALCB_5A6, ALCB_5A7

Usage antérieur :

ESCC cycle 1.1 : ALCADWKY

ENSP cycle 4 : ALCODWKY

ENSP cycle 3 : ALC8DWKY

ENSP cycle 2 : ALC6DWKY

ENSP cycle 1 : ALC4DWKY

Description : Cette variable indique la somme des consommations que le répondant a pris tous les jours, au cours de la semaine précédant l'interview. La variable dérivée est calculée uniquement pour les répondants qui ont pris au moins une consommation au cours des 12 derniers mois.

Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm

Valeur de ALCBDWKY	Condition(s)	Explication
SO	$\text{ALCB_1} = 2$	Le répondant n'a pas pris de consommation au cours de la dernière année.
0	$\text{ALCB_5A1} = \text{SO}$	Le répondant n'a pas pris de consommation la semaine dernière.
ND	(ALCB_5A1 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A2 = NSP, R, ND) ou	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au

	(ALCB_5A3 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A4 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A5 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A6 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A7 = NSP, R, ND)	moins une question nécessaire au calcul.
(ALCB_5A1 + ALCB_5A2 + ALCB_5A3 + ALCB_5A4 + ALCB_5A5 + ALCB_5A6 + ALCB_5A7) (min : 0; max : 693)	0 <= ALCB_5A1 < 100 et 0 <= ALCB_5A2 < 100 et 0 <= ALCB_5A3 < 100 et 0 <= ALCB_5A4 < 100 et 0 <= ALCB_5A5 < 100 et 0 <= ALCB_5A6 < 100 et 0 <= ALCB_5A7 < 100	Le répondant a consommé de l'alcool la semaine dernière.

3) Moyenne quotidienne des consommations d'alcool

Nom de la variable : ALCBDDLY

Basée sur : ALCBDWKY

Usage antérieur :

ESCC 1.1 : ALCADDLY

ENSP cycle 4 : ALCODDLY

ENSP cycle 3 : ALC8DDLY

ENSP cycle 2 : ALC6DDLY

ENSP cycle 1 : ALC4DDLY

Description : Cette variable représente le nombre moyen de consommations du répondant par jour. On le calcule en prenant le total des consommations hebdomadaires que l'on divise par sept. La variable dérivée n'est calculée que pour les répondants qui avaient pris au moins une consommation au cours des 12 derniers mois.

Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm

Valeur de ALCBDDLY	Condition(s)	Explication
ND	ALCBDWKY = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
SO	ALCBDWKY = SO	Sans objet
ALCBDWKY / 7 (min : 0; max : 99) (arrondir au nombre entier)	ALCBDWKY < 694	Moyenne quotidienne des consommations d'alcool

Dépendance à l'alcool/Abus d'alcool (4 VD)

L'ESCC comprend la gamme complète des questions élaborées par Kessler et Mroczek pour produire la mesure de la dépendance à l'égard de l'alcool. Lors du cycle 1.2 de l'ESCC, les répondants qui ont dit avoir consommé au moins cinq verres à une même occasion au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois et ceux qui ont fait la même déclaration pour une autre période de 12 mois au cours de leur vie ont répondu aux questions sur la dépendance à l'alcool.

Note: Il n'y a pas de variable pour la dépendance à l'alcool au cours de la vie ou pour la variable se rapportant à la probabilité prévue d'une dépendance à l'alcool au cours de la vie. Une erreur dans les instructions "passez à" du questionnaire a fait en sorte que les symptômes au cours de la vie des répondants qui ont aussi répondu aux questions sur la dépendance au cours des 12 derniers mois n'ont pas bien été évalués. Spécifiquement, si un répondant disait "oui" aux symptômes pour les 12 derniers mois, on ne lui demandait pas si il en avait fait l'expérience auparavant. Ainsi, ces répondants ont des réponses au cours de la vie seulement pour les questions au cours des 12 derniers mois auxquelles ils ont répondu "non".

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si (ALDB_01 = 1, 2) alors ALDRQ01 = (2 - ALDB_01)	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions ALDB_01 à ALDB_09A (sauf ALDB_02 et ALDB_08) de 1 et 2 à 1 et 0 respectivement pour toutes les questions avec catégories de réponses valides (c.-à-d. ancien code 2 'Non' devient 0 'Non', et 1 'Oui' demeure le même).
Si (ALDB_01L = 1, 2) alors ALDRQ01L = (2 - ALDB_01L)	
Si (ALDB_01A = 1, 2) alors ALDRQ01A = (2 - ALDB_01A)	
Si (ALDB_03 = 1, 2) alors ALDRQ03 = (2 - ALDB_03)	
Si (ALDB_03L = 1, 2) alors ALDRQ03L = (2 - ALDB_03L)	
Si (ALDB_03A = 1, 2) alors ALDRQ03A = (2 - ALDB_03A)	
Si (ALDB_04 = 1, 2) alors ALDRQ04 = (2 - ALDB_04)	
Si (ALDB_04L = 1, 2) alors ALDRQ04L = (2 - ALDB_04L)	
Si (ALDB_04A = 1, 2) alors ALDRQ04A = (2 - ALDB_04A)	
Si (ALDB_05 = 1, 2) alors ALDRQ05 = (2 - ALDB_05)	
Si (ALDB_05L = 1, 2) alors ALDRQ05L = (2 - ALDB_05L)	
Si (ALDB_05A = 1, 2) alors ALDRQ05A = (2 - ALDB_05A)	
Si (ALDB_06 = 1, 2) alors ALDRQ06 = (2 - ALDB_06)	
Si (ALDB_06L = 1, 2) alors ALDRQ06L = (2 - ALDB_06L)	
Si (ALDB_06A = 1, 2) alors ALDRQ06A = (2 - ALDB_06A)	
Si (ALDB_07 = 1, 2) alors ALDRQ07 = (2 - ALDB_07)	
Si (ALDB_07L = 1, 2) alors ALDRQ07L = (2 - ALDB_07L)	
Si (ALDB_07A = 1, 2) alors ALDRQ07A = (2 - ALDB_07A)	
Si (ALDB_09 = 1, 2) alors ALDRQ09 = (2 - ALDB_09)	
Si (ALDB_09L = 1, 2) alors ALDRQ09L = (2 - ALDB_09L)	
Si (ALDB_09A = 1, 2) alors ALDRQ09A = (2 -	

ALDB_09A) Si (ALDB_10 = 1, 2) alors ALDRQ10 = (2 - ALDB_10) Si (ALDB_10L = 1, 2) alors ALDRQ10L = (2 - ALDB_10L) Si (ALDB_10A = 1, 2) alors ALDRQ10A = (2 - ALDB_10A) Si (ALDB_11 = 1, 2) alors ALDRQ11 = (2 - ALDB_11) Si (ALDB_11L = 1, 2) alors ALDRQ11L = (2 - ALDB_11L) Si (ALDB_11A = 1, 2) alors ALDRQ11A = (2 - ALDB_11A) Si (ALDB_12 = 1, 2) alors ALDRQ12 = (2 - ALDB_12) Si (ALDB_12L = 1, 2) alors ALDRQ12L = (2 - ALDB_12L) Si (ALDB_12A = 1, 2) alors ALDRQ12A = (2 - ALDB_12A) Si (ALDB_13 = 1, 2) alors ALDRQ13 = (2 - ALDB_13) Si (ALDB_13L = 1, 2) alors ALDRQ13L = (2 - ALDB_13L) Si (ALDB_13A = 1, 2) alors ALDRQ13A = (2 - ALDB_13A) Si (ALDB_14 = 1, 2) alors ALDRQ14 = (2 - ALDB_14) Si (ALDB_14L = 1, 2) alors ALDRQ14L = (2 - ALDB_14L) Si (ALDB_14A = 1, 2) alors ALDRQ14A = (2 - ALDB_14A)	
--	--

1) Échelle de dépendance à l'alcool (cote du questionnaire abrégé) – 12 mois

Nom de la variable : ALDBDSF

Basée sur : ALDB_01, ALDB_03, ALDB_04, ALDB_05, ALDB_06, ALDB_07, ALDB_09

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : ALDADSF

Description : Cette variable a été recueillie pour mesurer la dépendance à l'alcool du répondant au cours des 12 mois précédant l'interview. La dépendance à l'alcool se rapporte à la tolérance, l'état de manque ou la perte de contrôle ou à des problèmes sociaux ou physiques liés à la consommation d'alcool. Les questions posées pour évaluer la dépendance à l'alcool se fondent sur les travaux de Kessler et Mroczek (de l'Université du Michigan). L'indice est fondé sur un sous-ensemble de questions tirées de la Composite International Diagnostic Interview (CIDI). La CIDI est un instrument diagnostique structuré qui a été conçu pour produire des diagnostics conformément à une opérationnalisation partielle des définitions et des critères de diagnostics du trouble d'utilisation des substances psychoactives du DSM-III-R.

Source : Kessler R.C., G. Andrews, D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine.

Valeur de ALDBDSFY	Condition(s)	Explication
0	ALDB_01= SO	Le répondant n'avait pas bu suffisamment au cours des 12 derniers mois pour répondre aux questions sur la dépendance à l'alcool pour cette période particulière.
ND	(ALDB_01 = NSP, R, ND) ou (ALDB_03 = NSP, R, ND) ou (ALDB_04 = NSP, R, ND) ou	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au

	(ALDB_05 = NSP, R, ND) ou (ALDB_06 = NSP, R, ND) ou (ALDB_07 = NSP, R, ND) ou (ALDB_09 = NSP, R, ND)	calcul.
ALDRQ01 + ALDRQ03 + ALDRQ04 + ALDRQ05 + ALDRQ06 + ALDRQ07 + ALDRQ09 (min : 0; max : 7)	(ALDRQ01 = 0, 1) et (ALDRQ03 = 0, 1) et (ALDRQ04 = 0, 1) et (ALDRQ05 = 0, 1) et (ALDRQ06 = 0, 1) et (ALDRQ07 = 0, 1) et (ALDRQ09 = 0, 1)	Le répondant a répondu oui ou non aux questions requises pour le calcul.

2) Probabilité prévue pour les répondants (dépendance à l'alcool) – 12 mois

Nom de la variable : ALDBDPP

Basée sur : ALDBDSF

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : ALDADPP

Description : La probabilité prévue de la dépendance à l'alcool des répondants a été attribuée d'après la cote calculée pour le questionnaire abrégé. La mesure de la dépendance à l'alcool du questionnaire abrégé vise à produire une mesure fondée sur l'opérationnalisation partielle du critère A et du critère B du diagnostic du trouble d'utilisation de substances psychoactives du DSM-III-R. On a attribué une probabilité nulle aux personnes qui ont répondu non aux questions filtres. La règle optimale de classification dichotomique consiste à définir toutes les personnes qui obtiennent une cote égale ou supérieure à trois pour le questionnaire abrégé comme étant des cas probables et celles qui obtiennent une cote comprise entre zéro et deux comme n'étant probablement pas des cas de dépendance à l'alcool.

D'après des renseignements tirés du National Comorbidity Survey (États-Unis), on a procédé à la classification croisée des cotes obtenues sur l'échelle de dépistage et des désignations de cas de dépendance à l'alcool fondées sur le programme diagnostique informatisé de la CIDI.

Valeur de ALDBDPP	Condition(s)	Explication
SO	ALDBDSF = SO	Transformation des valeurs calculées dans ALDBDSF
ND	ALDBDSF = ND	
0.00	ALDBDSF = 0	
0.05	ALDBDSF = 1	
0.40	ALDBDSF = 2	
0.85	ALDBDSF = 3	
1.00	3 < ALDBDSF < SO	

3) Trouble causé par l'alcool au cours des 12 derniers mois – Moyenne

Nom de la variable : ALDBDINT

Basée sur : ALDB_15A, ALDB_5B1, ALDB_5B2, ALDB_15C, ALDB_15D

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit le trouble ou la perturbation attribué à la consommation d'alcool sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items

Valeur de ALDBDINT	Condition(s)	Explication
SO	ALDB_15A = SO	Le répondant n'avait pas bu assez fréquemment ou n'a pas mentionné de problèmes liés à la consommation d'alcool.
ND	(ALDB_15A = NSP, R, ND) ou (ALDB_5B1 = NSP, R, ND) ou (ALDB_5B2 = NSP, R, ND) ou (ALDB_15C = NSP, R, ND) ou (ALDB_15D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$(ALDB_15A + ALDB_5B1 + ALDB_5B2 + ALDB_15C + ALDB_15D) / 5$ (min : 0.0; max : 10.0) (Arrondir à .1)	0 <= ALDB_5B1 <= 10 et 0 <= ALDB_5B2 <= 10 et 0 <= ALDB_15A <= 10 et 0 <= ALDB_15C <= 10 et 0 <= ALDB_15D <= 10	Degré de trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
$(ALDB_15A + ALDB_5B2 + ALDB_15C + ALDB_15D) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (Arrondir à .1)	ALDB_5B1 = 11 et 0 <= ALDB_5B2 <= 10 et 0 <= ALDB_15A <= 10 et 0 <= ALDB_15C <= 10 et 0 <= ALDB_15D <= 10	Degré de trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquent au répondant. ALDB_5B1 ne s'applique pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
$(ALDB_15A + ALDB_5B1 + ALDB_15C + ALDB_15D) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (Arrondir à .1)	0 <= ALDB_5B1 <= 10 et ALDB_5B2 = 11 et 0 <= ALDB_15A <= 10 et 0 <= ALDB_15C <= 10 et 0 <= ALDB_15D <= 10	Degré de trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquent au répondant. ALDB_5B2 ne s'applique pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
$(ALDB_15A + ALDB_15C + ALDB_15D) / 3$ (min : 0.0; max : 10.0) (Arrondir à .1)	ALDB_5B1 = 11 et ALDB_5B2 = 11 et 0 <= ALDB_15A <= 10 et 0 <= ALDB_15C <= 10 et 0 <= ALDB_15D <= 10	Degré de trouble = moyenne de trois items qui s'appliquent au répondant. ALDB_5B1 et ALDB_5B2 ne s'appliquent pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

4) Indicateur du trouble causé par la consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : ALDBFINT

Basée sur : ALDB_15A, ALDB_5B1, ALDB_5B2, ALDB_15C, ALDB_15D

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit le trouble ou la perturbation attribué à la consommation d'alcool sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si consommation d'alcool perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles.

Valeur de ALDBFINT	Condition(s)	Explication
SO	ALDB_15A = SO	Le répondant n'avait pas bu assez fréquemment ou n'a pas mentionné de problèmes liés à la consommation d'alcool.
1	4 <= ALDB_15A <= 10 ou 4 <= ALDB_5B1 <= 10 ou 4 <= ALDB_5B2 <= 10 ou 4 <= ALDB_15C <= 10 ou 4 <= ALDB_15D <= 10	La consommation d'alcool a perturbé significativement les activités routinières, le fonctionnement au travail (dans les études), ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
2	0 <= ALDB_15A <= 3 et (0 <= ALDB_5B1 <= 3 ou ALDB_5B1 = 11) et (0 <= ALDB_5B2 <= 3 ou ALDB_5B2 = 11) et 0 <= ALDB_15C <= 3 et 0 <= ALDB_15D <= 3	La consommation d'alcool n'a pas perturbé significativement les activités routinières, le fonctionnement au travail (dans les études), ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
ND	(ALDB_15A = NSP, R, ND) ou (ALDB_5B1 = NSP, R, ND) ou (ALDB_5B2 = NSP, R, ND) ou (ALDB_15C = NSP, R, ND) ou (ALDB_15D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Troubles figurant au DSM en général (6 VD)

Le DSM réfère au Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders utilisé par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux internationalement reconnue qui existe en plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux que l'on trouve dans l'ESCC 1.2 sont codés soit à l'aide du DSM-IV ou du DSM-III-R. Les variables dérivées de cette section ne font pas elles-mêmes partie du système de classification du DSM. Ce sont cependant des indicateurs sommaires dont les variables constitutives sont codées suivant les normes de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI.

Pour les besoins de documentation, le mot «trouble(s)» tel qu'il apparaît à cette section peut faire référence à un trouble, un épisode, un état, ou un problème.

Pour les besoins de documentation vis-à-vis le Supplément de l'enquête de 2002 sur la santé dans les collectivités pour les Forces canadiennes (santé mentale), les variables dérivées et les algorithmes liés aux problèmes et états de santé mentale ont été développées dans le cadre de l'ESCC 1.2. Pour des besoins de compatibilité, une partie de la documentation pour ce supplément se rapporte à l'ESCC 1.2.

1) Diagnostic au cours de la vie – n'importe quel trouble

Nom de la variable : MHPBFCL

Basée sur : DEPBDDPS, GADBDGDS, PADBDPDS, SOPBDSP, PTSBDPDS

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant n'importe quel trouble mesuré au cours de la vie.

Note: Cette variable n'est pas comparable à «Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n'importe quel trouble ou n'importe quelle dépendance à une substance retenus» (MHPBFCY) puisqu'elle n'inclut pas la dépendance à l'alcool ou aux drogues.

Valeur de MHPBFCL	Condition(s)	Explication
1	DEPBDDPS = 1 ou GADBDGDS = 1 ou PADBDPDS = 1 ou SOPBDSP = 1 ou PTSBDPDS = 1	Le répondant remplit les critères d'au moins un trouble énuméré au cours de sa vie.
2	DEPBDDPS = 2 et GADBDGDS = 2 et PADBDPDS = 2 et SOPBDSP = 2 et PTSBDPDS = 2	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles énumérés au cours de sa vie.
ND	DEPBDDPS = ND ou GADBDGDS = ND ou PADBDPDS = ND ou SOPBDSP = ND ou PTSBDPDS = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une variable nécessaire au calcul.

2) Diagnostic au cours de la vie – n'importe quel trouble anxieux

Nom de la variable : MHPBFCLA

Basée sur : GADBDGDS, PADBDPDS, SOPBDSP, PTSBDPDS

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant n'importe quel trouble anxieux mesuré (trouble d'anxiété généralisée, trouble panique, phobie sociale, état de stress post-traumatique) au cours de la vie.

Valeur de MHPBFCLA	Condition(s)	Explication
1	GADBDGDS = 1 ou PADBDPDS = 1 ou SOPBDSP = 1 ou PTSBDPDS = 1	Le répondant remplit les critères d'au moins un trouble anxieux énuméré au cours de sa vie.
2	GADBDGDS = 2 et PADBDPDS = 2 et SOPBDSP = 2 et PTSBDPDS = 2	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles anxieux énumérés au cours de la vie.
ND	GADBDGDS = ND ou PADBDPDS = ND ou SOPBDSP = ND ou PTSBDPDS = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une variable nécessaire au calcul.

3) Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n'importe quel trouble ou n'importe quelle dépendance à une substance retenus

Nom de la variable : MHPBFCY

Basée sur : DEPBDDY, GADBDDY, PADBDDY, SOPBDPY, PTSBDDY, ALDBDSFY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant n'importe quel des troubles retenus au cours des 12 derniers mois.

Valeur de MHPBFCY	Condition(s)	Explication
1	DEPBDDY = 1 ou GADBDDY = 1 ou PADBDDY = 1 ou SOPBDPY = 1 ou PTSBDDY = 1 ou $3 \leq \text{ALDBDSFY} < 50$	Le répondant remplit les critères d'au moins un trouble énuméré au cours des 12 derniers mois.
2	DEPBDDY = 2 et GADBDDY = 2 et PADBDDY = 2 et SOPBDPY = 2 et PTSBDDY = 2 et ALDBDSFY < 3	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles énumérés au cours des 12 derniers mois.
ND	DEPBDDY = ND ou GADBDDY = ND ou PADBDDY = ND ou SOPBDPY = ND ou PTSBDDY = ND ou ALDBDSFY = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une variable nécessaire au calcul.

4) Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n'importe quel trouble anxieux

Nom de la variable : MHPBFCYA

Basée sur : GADBDDY, PADBDDY, SOPBDPY, PTSBDDY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant l'un ou l'autre des troubles anxieux mesurés de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois (trouble d'anxiété généralisée, trouble panique, phobie sociale, état de stress post-traumatique).

Valeur de MHPBFCYA	Condition(s)	Explication
1	GADBDDY = 1 ou PADBDDY = 1 ou SOPBDPY = 1 ou PTSBDDY = 1	Le répondant remplit les critères d'au moins un trouble anxieux énuméré au cours des 12 derniers mois.
2	GADBDDY = 2 et PADBDDY = 2 et SOPBDPY = 2 et PTSBDDY = 2	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles anxieux énumérés au cours des 12 derniers mois.
ND	GADBDDY = ND ou PADBDDY = ND ou SOPBDPY = ND ou PTSBDDY = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une variable nécessaire au calcul.

5) Indicateur de la perturbation attribuable à n'importe quel trouble ou n'importe quelle dépendance à une substance retenus au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : MHPBFCFI

Basée sur : DEPBFIN, PADBFINT, SOPBFINT, GADBFINT, PTSBFINT, ALDBFINT, MHPBFCY

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable décrit la perturbation qu'au moins un trouble mesuré a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Elle n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'au moins un trouble au cours des 12 derniers mois.

Valeur de MHPBFCFI	Condition(s)	Explication
SO	MHPBFCY = 2	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles mesurés au cours des 12 derniers mois.
1	DEPBFIN = 1 ou PADBFINT = 1 ou SOPBFINT = 1 ou GADBFINT = 1 ou PTSBFINT = 1 ou ALDBFINT = 1	Au moins un trouble mesuré a perturbé de façon importante la vie du répondant au cours des 12 derniers mois.
2	(DEPBFIN = 2, SO) et (PADBFINT = 2, SO) et (SOPBFINT = 2, SO) et (GADBFINT = 2, SO) et (PTSBFINT = 2, SO) et (ALDBFINT = 2, SO)	Il n'y a pas eu de perturbation importante de la vie du répondant au cours des 12 derniers mois à cause d'au moins un des troubles mesurés.
ND	DEPBFIN = ND ou PADBFINT = ND ou SOPBFINT = ND ou GADBFINT = ND ou PTSBFINT = ND ou ALDBFINT = ND ou MHPBFCY = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une variable nécessaire au calcul.

6) Âge au moment de la première manifestation – n'importe quel trouble retenu

Nom de la variable : MHPBDON

Basée sur : MHPBFCL, DEPBDON, PADBDON, SOPBDON, GADBDON

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique l'âge du répondant au moment de la première manifestation du trouble, chez les répondants qui remplissent les critères de n'importe quel trouble au cours de la vie. Elle n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'au moins un trouble au cours de la vie, à l'exclusion de la dépendance à une substance.

Valeur de MHPBDON	Condition(s)	Explication
SO	MHPBFCL = 2 ou (DEPBDON = SO et PADBDON = SO et SOPBDON = SO et GADBDON = SO)	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles mesurés au cours de la vie.
Minimum de (DEPBDON, PADBDON, SOPBDON, GADBDON) (min : 0; max : âge actuel)	MHPBFCL = 1 et au moins un de (DEPBDON, PADBDON, SOPBDON, GADBDON) <= 130	L'âge au moment du premier épisode est calculé pour les répondants qui ont au moins un âge valide de manifestation. Nota : 130 est la valeur maximale de l'âge.
ND	MHPBFCL = ND ou DEPBDON = ND ou PADBDON = ND ou SOPBDON = ND ou GADBDON = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une variable nécessaire au calcul.

Troubles alimentaires (2 VD)

Le module des troubles alimentaires est fondé sur le test des attitudes alimentaires (Eating Attitudes Test - EAT) élaboré par le Dr David M. Garner. L'EAT-26 est probablement la mesure normalisée la plus répandue des symptômes et préoccupations caractéristiques des troubles alimentaires, même si elle ne produit pas de diagnostic précis.

1) Cote sur l'échelle des attitudes alimentaires - modifiée

Nom de la variable : ETABDIND

Basée sur : ETAB_01A, ETAB_01B, ETAB_02, ETAB_03, ETAB_04, ETAB_05, ETAB_06, ETAB_07, ETAB_08, ETAB_09, ETAB_10, ETAB_11, ETAB_12, ETAB_13, ETAB_14, ETAB_15, ETAB_16, ETAB_17, ETAB_18, ETAB_19, ETAB_20, ETAB_21, ETAB_22, ETAB_23, ETAB_24, ETAB_25, ETAB_26, ETAB_27

Usage antérieur : Aucun

Description : La variable qui suit est une mesure des symptômes et préoccupations caractéristiques des troubles alimentaires. Le EAT est généralement administré aux individus qui ont manifesté des symptômes ou des préoccupations reliés à leurs attitudes et comportements relatifs à l'alimentation. Afin d'évaluer les préoccupations quant aux comportements et attitudes alimentaires au cours des 12 derniers mois et au cours de la vie, deux « questions-filtres » ont été ajoutées au cycle 1.2 de l'ESCC. Les répondants qui ont fourni des réponses positives aux « questions-filtres » se sont fait poser l'éventail complet des items/questions du EAT-26. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur. Les troubles alimentaires sont d'autant plus prononcés que la cote est élevée.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
For ETAB_02--ETAB_26: Si ETAB_xx = 01 alors ETARQxx = 3 Si ETAB_xx = 02 alors ETARQxx = 2 Si ETAB_xx = 03 alors ETARQxx = 1 Si ETAB_xx = 04 alors ETARQxx = 0 Si ETAB_xx = 05 alors ETARQxx = 0 Si ETAB_xx = 06 alors ETARQxx = 0	Recoder les valeurs de 0 à 3 pour toutes les questions pour lesquelles la valeur ne manque pas.
For ETAB_27: Si ETAB_27 = 01 alors ETARQ27 = 0 Si ETAB_27 = 02 alors ETARQ27 = 0 Si ETAB_27 = 03 alors ETARQ27 = 0 Si ETAB_27 = 04 alors ETARQ27 = 1 Si ETAB_27 = 05 alors ETARQ27 = 2 Si ETAB_27 = 06 alors ETARQ27 = 3	Recoder les valeurs de 0 à 3 pour toutes les questions pour lesquelles la valeur ne manque pas.

Valeur de ETABDIND	Condition(s)	Explication
ND	(ETAB_01A = NSP, R, ND) ou (ETAB_01B = NSP, R, ND) ou (ETAB_02 = NSP, R, ND) ou (ETAB_03 = NSP, R, ND) ou (ETAB_04 = NSP, R, ND) ou (ETAB_05 = NSP, R, ND) ou (ETAB_06 = NSP, R, ND) ou (ETAB_07 = NSP, R, ND) ou (ETAB_08 = NSP, R, ND) ou (ETAB_09 = NSP, R, ND) ou (ETAB_10 = NSP, R, ND) ou (ETAB_11 = NSP, R, ND) ou	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

	(ETAB_12 = NSP, R, ND) ou (ETAB_13 = NSP, R, ND) ou (ETAB_14 = NSP, R, ND) ou (ETAB_15 = NSP, R, ND) ou (ETAB_16 = NSP, R, ND) ou (ETAB_17 = NSP, R, ND) ou (ETAB_18 = NSP, R, ND) ou (ETAB_19 = NSP, R, ND) ou (ETAB_20 = NSP, R, ND) ou (ETAB_21 = NSP, R, ND) ou (ETAB_22 = NSP, R, ND) ou (ETAB_23 = NSP, R, ND) ou (ETAB_24 = NSP, R, ND) ou (ETAB_25 = NSP, R, ND) ou (ETAB_26 = NSP, R, ND) ou (ETAB_27 = NSP, R, ND)	
SO	ETAB_01A = 2 ou ETAB_01B = 2	Le répondant n'a manifesté aucune crainte ni préoccupation concernant l'excès de poids et n'a pas été considéré comme courant le risque de présenter un trouble alimentaire.
ETARQ02 + ETARQ03 + ETARQ04 + ETARQ05 + ETARQ06 + ETARQ07 + ETARQ08 + ETARQ09 + ETARQ10 + ETARQ11 + ETARQ12 + ETARQ13 + ETARQ14 + ETARQ15 + ETARQ16 + ETARQ17 + ETARQ18 + ETARQ19 + ETARQ20 + ETARQ21 + ETARQ22 + ETARQ23 + ETARQ24 + ETARQ25 + ETARQ26 + ETARQ27 (min : 0; max : 78)	1 <= ETAB_02 <= 6 et 1 <= ETAB_03 <= 6 et 1 <= ETAB_04 <= 6 et 1 <= ETAB_05 <= 6 et 1 <= ETAB_06 <= 6 et 1 <= ETAB_07 <= 6 et 1 <= ETAB_08 <= 6 et 1 <= ETAB_09 <= 6 et 1 <= ETAB_10 <= 6 et 1 <= ETAB_11 <= 6 et 1 <= ETAB_12 <= 6 et 1 <= ETAB_13 <= 6 et 1 <= ETAB_14 <= 6 et 1 <= ETAB_15 <= 6 et 1 <= ETAB_16 <= 6 et 1 <= ETAB_17 <= 6 et 1 <= ETAB_18 <= 6 et 1 <= ETAB_19 <= 6 et 1 <= ETAB_20 <= 6 et 1 <= ETAB_21 <= 6 et 1 <= ETAB_22 <= 6 et 1 <= ETAB_23 <= 6 et 1 <= ETAB_24 <= 6 et 1 <= ETAB_25 <= 6 et 1 <= ETAB_26 <= 6 et 1 <= ETAB_27 <= 6	Score obtenu sur l'échelle EAT-26.

2) Indicateur de risque de troubles alimentaires - modifiée

Nom de la variable : ETABFIND

Basée sur : ETABDIND

Usage antérieur : Aucun

Description : Indicateur fondé sur la cote obtenue sur l'échelle des attitudes alimentaires. Les personnes dont la cote est supérieure au seuil établi courent le risque de présenter des troubles alimentaires.

Valeur de ETABFIND	Condition(s)	Explication
ND	(ETABDIND = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable nécessaire au calcul.
1	$21 \leq \text{ETABDIND} \leq 78$	Le répondant court le risque de présenter des troubles alimentaires.
2	$0 \leq \text{ETABDIND} \leq 20$ ou ETABDIND = SO	Le répondant ne présente vraisemblablement pas de troubles alimentaires.

Limitation des activités (4 VD)

1) Incidences des problèmes de santé

Nom de la variable : RACBDIMP

Basée sur : RACB_2A, RACB_2B1 RACB_2B2, RACB_2C

Usage antérieur :

ESCC cycle 1.1 : RACADIMP

Description : La variable est une mesure brute de l'incidence des problèmes de santé physique, de santé mentale et de santé à long terme dans les principales sphères de la vie : la maison, le travail, l'école, et d'autres activités.

Nota : Il ne faut pas utiliser cette variable pour obtenir le taux d'incapacité ou de limitation des activités au sein de la population. La variable est calculée d'après RACB_2A, RACB_2B1, RACB_2B2 et RACB_2C. Ces questions, plus RACB_1, ont été posées dans le cadre du Recensement de 2001 dans le but de prélever un échantillon en vue de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA) post-censitaire de 2001. De plus, compte tenu de différences dans la formulation des questions entre l'ESCC et l'Enquête nationale sur la santé de la population (les questions de l'ENSP sont des questions du Recensement de 1991), RACADIMP NE doivent PAS être comparées aux variables RES_FLG, RAC6F1, RAC8F1, ou RAC0F1 de l'ENSP.

Valeur de RACBDIMP	Condition(s)	Explication
ND	(RACB_2A = NSP, R, ND) ou (RACB_2B1 = NSP, R, ND) ou (RACB_2B2 = NSP, R, ND) ou (RACB_2C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
2	RACB_2A = 2 ou RACB_2B1 = 2 ou RACB_2B2 = 2 ou RACB_2C = 2	Souvent
1	RACB_2A = 1 ou RACB_2B1 = 1 ou RACB_2B2 = 1 ou RACB_2C = 1	Parfois
3	RACB_2A = 3 et (RACB_2B1 = 3, 4) et (RACB_2B2 = 3, 4) et RACB_2C = 3	Jamais

2) Participation et limitations d'activités

Nom de la variable : RACBDPAL

Basée sur : RACB_1, RACB_2A, RACB_2B1, RACB_2B2, RACB_2C

Usage antérieur : aucun

Description : La variable est la même que la variable RACBDIMP, sauf qu'il est tenu compte de la réponse à la question RACB_1 dans RACBDPAL. Cette variable dérivée est une modification de la variable dérivée de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA). L'attribution de la cote est la même dans l'EPLA, sauf pour le calcul de la non-réponse. Dans le cas de l'EPLA, on considère que les réponses « ne sait pas » et « refus » sont négatives (fixées à « jamais »), plutôt qu'une non-réponse. Ce traitement est incompatible avec la façon dont les réponses « NSP » et « R » sont traitées dans le cas de l'ESCC et, par conséquent, lors du calcul de notre variable dérivée, les réponses « NSP » et « R » demeurent équivalentes à « non déclaré ».

Valeur de RACBDPAL	Condition(s)	Explication
ND	(RACB_2A = NSP, R, ND) ou (RACB_2B1 = NSP, R, ND) ou (RACB_2B2 = NSP, R, ND) ou (RACB_2C = NSP, R, ND) ou (RACB_1 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
2	RACB_2A = 2 ou RACB_2B1 = 2 ou RACB_2B2 = 2 ou RACB_2C = 2 ou RACB_1 = 2	Souvent
1	RACB_2A = 1 ou RACB_2B1 = 1 ou RACB_2B2 = 1 ou RACB_2C = 1 ou RACB_1 = 1	Parfois
3	RACB_2A = 3 et (RACB_2B1 = 3, 4) et (RACB_2B2 = 3, 4) et RACB_2C = 3 et RACB_1 = 3	Jamais

3) A besoin d'aide pour certaines tâches

Nom de la variable : RACBF6R

Basée sur : RACB_6A, RACB_6B1, RACB_6C, RACB_6D, RACB_6E, RACB_6F, RACB_6G

Usage antérieur : aucun

Description : La dépendance renvoie au besoin d'aide (pour des raisons de santé) pour les activités de la vie quotidienne, comme la préparation des repas, l'épicerie ou d'autres nécessités, les travaux ménagers quotidiens, les travaux lourds (le lavage des murs, les travaux à l'extérieur) et les soins personnels (se laver, s'habiller ou manger), se déplacer dans la maison, ou payer les factures.

Nota : RACBF6R est modifiée, comparativement à RACAF6 (ESCC Cycle 1.1), par ajout de RACB_6G. La série de tâches comprises a été révisée en prenant pour base l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités. Donc, cette variable dérivée ayant été modifiée pour tenir compte d'une série de tâches révisée, elle n'est pas strictement comparable à RACAF6.

Valeur de RACBF6R	Condition(s)	Explication
1	RACB_6A = 1 ou RACB_6B1 = 1 ou RACB_6C = 1 ou RACB_6D = 1 ou RACB_6E = 1 ou RACB_6F = 1 ou RACB_6G = 1	A besoin d'aide pour au moins une tâche.
2	RACB_6A = 2 et RACB_6B1 = 2 et RACB_6C = 2 et RACB_6D = 2 et RACB_6E = 2 et RACB_6F = 2 et RACB_6G = 2	N'a pas besoin d'aide.

ND	(RACB_6A = NSP, R, ND) ou (RACB_6B1 = NSP, R, ND) ou (RACB_6C = NSP, R, ND) ou (RACB_6D = NSP, R, ND) ou (RACB_6E = NSP, R, ND) ou (RACB_6F = NSP, R, ND) ou (RACB_6G = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

4) Difficultés dans les situations sociales

Nom de la variable : RACBF7

Basée sur : RACB_7A, RACB_7B, RACB_7C

Usage antérieur : aucun

Description : Cette variable a trait aux difficultés éprouvées (pour des raisons de santé) dans des situations telles que se faire ou garder des amis, avoir affaire à des personnes que l'on ne connaît pas bien, ou amorcer ou entretenir une conversation.

Valeur de RACBF7	Condition(s)	Explication
1	RACB_7A = 1 ou RACB_7B = 1 ou RACB_7C = 1	Éprouve de la difficulté dans au moins une des situations sociales.
2	RACB_7A = 2 et RACB_7B = 2 et RACB_7C = 2	Le répondant n'éprouve aucune difficulté dans les situations sociales.
ND	(RACB_7A = NSP, R, ND) ou (RACB_7B = NSP, R, ND) ou (RACB_7C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Incapacité au cours des deux dernières semaines (5 VD)

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si TWDB_2 = SO alors TWDB_2 = 0	Remettre les valeurs SO de TWDB_2 à 0.
Si TWDB_4 = SO alors TWDB_4 = 0	Remettre les valeurs SO de TWDB_4 à 0.

1) Nombre total de jours d'incapacité

Nom de la variable : TWDBDDDY

Basée sur : TWDB_2, TWDB_4

Usage Antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : TWDADDDY

ENSP Cycle 3 : TWC8DDDDY

ENSP Cycle 2 : TWC6DDDDY

ENSP Cycle 1 : TWC4DDDDY

Description: Le nombre de jours au cours des deux dernières semaines pendant lesquelles le répondant a été alité ou a dû limiter ses activités à cause d'une maladie ou d'une blessure.

Source : Enquête sociale générale – Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : <http://www.statcan.ca/francais/sdds/3894f.htm>

Valeur de TWDBDDDY	Condition(s)	Explication
ND	(TWDB_2 = NSP, R, ND) ou (TWDB_4 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
TWDRQ2 + TWDRQ4 (min : 0; max : 14)	TWDRQ2 < 15 et TWDRQ4 < 15	Le nombre de jours au cours des deux dernières semaines pendant lesquelles le répondant a été alité ou a dû limiter ses activités.

2) Nombre total de jours d'alitement à cause d'un problème de santé mentale

Nom de la variable : TWDBDMQ2

Basée sur : TWDB_2, TWDB_2A, TWDB_2B

Usage antérieur : aucun

Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a dû garder le lit à cause d'une maladie ou d'une blessure liée à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de TWDBDMQ2	Condition(s)	Explication
TWDB_2 (min : 0; max : 1)	TWDB_2A = 1	Nombre de jours d'alitement pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_2A = 2	Aucun jour d'alitement pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
TWDB_2B (min : 0; max : 14)	TWDB_2B < 15	Nombre de jours d'alitement pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_2 = SO	Aucun jour d'alitement pour des problèmes liés à la santé

		émotionnelle ou mentale
ND	(TWDB_2A = NSP, R, ND) ou (TWDB_2B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

3) Nombre de jours de limitation des activités à cause d'un problème lié à la santé mentale

Nom de la variable : TWDBDMQ4

Basée sur : TWDB_4, TWDB_4A, TWDB_4B

Usage antérieur : aucun

Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a dû limiter ses activités à cause d'une maladie ou d'une blessure liée à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de TWDBDMQ4	Condition(s)	Explication
TWDB_4 (min : 0; max : 14)	TWDB_4A = 1	Nombre de jours de limitation des activités pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_4A = 2	Aucun jour de limitation des activités pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
TWDB_4B (min : 0; max : 14)	TWDB_4B < 15	Nombre de jours de limitation des activités pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_4 = SO	Aucun jour de limitation des activités pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
ND	(TWDB_4A = NSP, R, ND) ou (TWDB_4B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

4) Nombre total de jours exigeant un effort supplémentaire à cause de problèmes liés à la santé mentale

Nom de la variable : TWDBDMQ6

Basée sur : TWDB_6, TWDB_6A, TWDB_6B

Usage antérieur : aucun

Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a dû faire plus d'efforts pour accomplir, au niveau habituel, son travail ou d'autres activités quotidiennes à cause d'une maladie ou d'une blessure due à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de TWDBDMQ6	Condition(s)	Explication
TWDB_6 (min : 0; max : 1)	TWDB_6A = 1	Nombre de jours d'effort supplémentaire à cause de problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_6A = 2	Aucun jour d'effort supplémentaire à cause de problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
TWDB_6B	TWDB_6B < 15	Nombre de jours d'effort

(min : 0; max : 14)		supplémentaire à cause de problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_6 = SO	Aucun jour d'effort supplémentaire à cause de problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
ND	(TWDB_6A = NSP, R, ND) ou (TWDB_6B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Nombre total de journées d'incapacité à cause de problèmes liés à la santé mentale

Nom de la variable : TWDBDMH

Basée sur : TWDBDMQ2, TWDBDMQ4

Usage antérieur : aucun

Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a gardé le lit ou a limité ses activités à cause d'une maladie ou d'une blessure liée à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de TWDBDMH	Condition(s)	Explication
ND	TWDBDMQ2 = ND ou TWDBDMQ4 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une variable dérivée nécessaire au calcul.
TWDBDMQ2 + TWDBDMQ4 (min : 0; max : 14)	TWDBDMQ2 < 15 et TWDBDMQ4 < 15	Nombre total, au cours des deux dernières semaines, de jours d'incapacité à cause de problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale.

Utilisation des services de santé par les membres des FC - Services 1 (7 VD)

1) Indicateur de consultation d'un médecin en titre pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue au cours de la vie

Nom de la variable : SR1BFLMD

Basée sur : SR1B_10A, SR1B_10B, SR1B_10C

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consulté un médecin en titre au cours de sa vie au sujet de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Nota : Cette variable est similaire à HCUAFHPC de l'ESCC Cycle 1.1. Cette variable du premier cycle est restreinte aux 12 derniers mois et se réfère à la santé émotionnelle ou mentale; elle exclut la mention explicite de l'alcool et des drogues.

Valeur de SR1BFLMD	Condition(s)	Explication
1	SR1B_10A = 1 ou SR1B_10B = 1 ou SR1B_10C = 1	Le répondant a consulté au moins une fois dans sa vie un médecin en titre pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
2	SR1B_10A = 2 et SR1B_10B = 2 et SR1B_10C = 2	Le répondant n'a jamais consulté de médecin en titre au sujet de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
ND	(SR1B_10A = SO, R, ND) ou (SR1B_10B = SO, R, ND) ou (SR1B_10C = SO, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Nombre de consultations avec médecin en titre pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : SR1BDNMD

Basée sur : SR1B_3A, SR1B_3B, SR1B_3C

Usage antérieur :

ESCC 1.1: HCUADMDC (psychiatres pas spécifiquement différenciés)

ENSP Cycle 4 : HCC0DMDC (psychiatres pas spécifiquement différenciés)

ENSP Cycle 3 : HCC8DMDC (psychiatres pas spécifiquement différenciés)

ENSP Cycle 2 : HCC6DMDC (psychiatres pas spécifiquement différenciés)

ENSP Cycle 1 : HCC4DMDC (psychiatres pas spécifiquement différenciés)

Description : Cette variable indique le nombre de fois le répondant a consulté un médecin en titre au cours des 12 mois précédents l'enquête pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue. La consultation peut avoir été faite en personne ou par téléphone avec (a) un psychiatre, (b) un médecin de famille, omnipraticien ou médecin militaire, et (c) un autre médecin tel qu'un cardiologue, gynécologue ou urologue.

Nota : Le répondant doit identifier le nombre de consultations qu'il a eu avec le médecin en titre qu'il a consulté le plus souvent de chacune des trois catégories. La variable dérivée reflète le nombre de consultations avec ces trois médecins en titre.

Reformatages temporaires :

Reformatage	Explication
Si (SR1B_10A = 2 ou SR1B_1A = 4) alors SR1RQ023A = 0	Aucune consultation avec un psychiatre au cours des 12 mois précédents l'enquête
Si (SR1B_10B = 2 ou SR1B_1B = 4) alors SR1RQ023B = 0	Aucune consultation avec un médecin de famille, omnipraticien ou médecin militaire au cours des 12 mois précédents l'enquête
Si (SR1B_10C = 2 ou SR1B_1C = 4) alors SR1RQ023C = 0	Aucune consultation avec un autre médecin tel qu'un cardiologue... au cours des 12 mois précédents l'enquête

Valeur de SR1BDNMD	Condition(s)	Explication
SR1RQ23A + SR1RQ23B + SR1RQ23C (min : 0; max : 995)	(0 <= SR1B_3A <= 365 et 0 <= SR1B_3B <= 365 et 0 <= SR1B_3C <= 365)	Toutes les composantes ont des codes valides.
ND	(SR1B_3A = NSP, R, ND) ou (SR1B_3B = NSP, R, ND) ou (SR1B_3C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

3) Indicateur de consultation, au cours de la vie, de professionnel (n'importe quel) au sujet de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Nom de la variable : SR1BFLAP

Basée sur : SR1B_10I

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consulté un professionnel au cours de sa vie au sujet de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Nota : Cette variable est similaire à HCUAFHPC de l'ESCC Cycle 1.1. Cette variable du premier cycle est restreinte aux 12 derniers mois et se réfère à la santé émotionnelle ou mentale; elle exclut la mention explicite de l'alcool et des drogues. Les questions de l'ESCC Cycle 1.1 comprennent plusieurs catégories de professionnels de la santé.

D'autres variables mesurant l'utilisation des services de santé existent : ESCC Cycle 1.1 : HCUAFHPC; ENSP Cycle 4 : HCC0DHPC; ENSP Cycle 3 : HCC8DHPC; ENSP Cycle 2 : HCC6DHPC; et ENSP Cycle 1 : HCC4DHPC.

Valeur de SR1BFLAP	Condition(s)	Explication
1	SR1B_10I = 2	Le répondant a consulté au moins une fois dans sa vie un professionnel pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
2	SR1B_10I = 1	Le répondant n'a jamais consulté de professionnel au sujet de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
ND	(SR1B_10I = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

4) Indicateur d'utilisation de toute ressource pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue au cours de la vie

Nom de la variable : SR1BFLRU

Basée sur : SR1B_02, SR1B_10I, SR1B_AOA, SR1B_A1A, SR1B_A2A

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé des ressources pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue. Spécifiquement, a déjà passé la nuit à l'hôpital ou a déjà consulté un professionnel, a utilisé un groupe de soutien ou de discussion sur Internet, assisté aux réunions d'un groupe d'entraide ou utilisé une ligne d'aide téléphonique au cours de sa vie.

Valeur de SR1BFLRU	Condition(s)	Explication
1	(SR1B_02 = 1, SO) ou SR1B_10I = 2 ou SR1B_AOA = 1 ou SR1B_A1A = 1 ou SR1B_A2A = 1	Le répondant a utilisé au moins une ressource pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
2	SR1B_02 = 2 et SR1B_10I = 1 et SR1B_AOA = 2 et SR1B_A1A = 2 et	Le répondant n'a jamais utilisé de ressource pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation

	SR1B_A2A = 2	d'alcool ou de drogue.
ND	(SR1B_02 = NSP, R, ND) ou (SR1B_10I = NSP, R, ND) ou (SR1B_AOA = NSP, R, ND) ou (SR1B_A1A = NSP, R, ND) ou (SR1B_A2A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Nombre de catégories de ressources utilisées, au cours de la vie, pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Nom de la variable : SR1BDRCT

Basée sur : SR1B_02, SR1B_10A-SR1B_10H, SR1B_AOA, SR1B_A1A, SR1B_A2A

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique le nombre de différents types de ressources utilisées au cours de la vie pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Reformatages temporaires :

Reformatage	Explication
Si SR1B_02 = 2 alors SR1RQ002 = 0 Si SR1B_02 = SO alors SR1RQ002 = 1	A été hospitalisé pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue : reformater Non à 0 et SO à 1.
Si SR1B_10A = 2 alors SR1RQ010A = 0 Si SR1B_10B = 2 alors SR1RQ010B = 0 Si SR1B_10C = 2 alors SR1RQ010C = 0 Si SR1B_10D = 2 alors SR1RQ010D = 0 Si SR1B_10E = 2 alors SR1RQ010E = 0 Si SR1B_10F = 2 alors SR1RQ010F = 0 Si SR1B_10G = 2 alors SR1RQ010G = 0 Si SR1B_10H = 2 alors SR1RQ010H = 0	A consulté un professionnel pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue : reformater Non à 0.
Si SR1B_AOA = 2 alors SR1RQ100A = 0	A utilisé un groupe de soutien ou de discussion sur Internet pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue : reformater Non à 0.
Si SR1B_A1A = 2 alors SR1RQ101A = 0	A utilisé un groupe d'entraide pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue : reformater Non à 0.
Si SR1B_A2A = 2 alors SR1RQ102A = 0	A utilisé une ligne d'aide téléphonique pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue : reformater Non à 0.

Valeur de SR1BDRCT	Condition(s)	Explication
ND	(SR1B_02 = NSP, R, ND) ou (SR1B_10A = NSP, R, ND) ou (SR1B_10B = NSP, R, ND) ou (SR1B_10C = NSP, R, ND) ou (SR1B_10D = NSP, R, ND) ou (SR1B_10E = NSP, R, ND) ou (SR1B_10F = NSP, R, ND) ou (SR1B_10G = NSP, R, ND) ou (SR1B_10H = NSP, R, ND) ou (SR1B_AOA = NSP, R, ND) ou (SR1B_A1A = NSP, R, ND) ou (SR1B_A2A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SR1RQ002 + SR1RQ010A +	(SR1RQ002 = 0, 1) et	Nombre de ressources utilisées au

SR1RQ010B + SR1RQ010C + SR1RQ010D + SR1RQ010E + SR1RQ010F + SR1RQ010G + SR1RQ010H + SR1RQ100A + SR1RQ101A + SR1RQ102A (min : 0; max : 12)	(SR1RQ010A = 0, 1) et (SR1RQ010B = 0, 1) et (SR1RQ010C = 0, 1) et (SR1RQ010D = 0, 1) et (SR1RQ010E = 0, 1) et (SR1RQ010F = 0, 1) et (SR1RQ010G = 0, 1) et (SR1RQ010H = 0, 1) et (SR1RQ100A = 0, 1) et (SR1RQ101A = 0, 1) et (SR1RQ102A = 0, 1)	cours de la vie pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
--	--	---

6) Indicateur d'utilisation de toute ressource pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : SR1BFYRU

Basée sur : SR1B_05A, SR1B_08, SR1B_1A à SR1B_1G, SR1B_91, SR1B_AOB, SR1B_A1C, SR1B_A2C

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si le répondant a utilisé au cours des 12 derniers mois des ressources pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Spécifiquement, a déjà passé la nuit à l'hôpital ou a déjà consulté un professionnel, a utilisé un groupe de soutien ou de discussion sur Internet, assisté aux réunions d'un groupe d'entraide ou utilisé une ligne d'aide téléphonique au cours des 12 mois précédents l'enquête.

Valeur de SR1BFYRU	Condition(s)	Explication
1	1 <= SR1B_05A <= 3 ou SR1B_08 = 1 ou 1 <= SR1B_1A <= 3 ou 1 <= SR1B_1B <= 3 ou 1 <= SR1B_1C <= 3 ou 1 <= SR1B_1D <= 3 ou 1 <= SR1B_1E <= 3 ou 1 <= SR1B_1F <= 3 ou 1 <= SR1B_1G <= 3 ou 1 <= SR1B_91 <= 13 ou 1 <= SR1B_AOB <= 3 ou 1 <= SR1B_A1C <= 3 ou 1 <= SR1B_A2C <= 3	Le répondant a utilisé au moins une ressource au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
2	(SR1B_05A = 4, SO) et (SR1B_08 = 2, SO) et (SR1B_1A = 4, SO) et (SR1B_1B = 4, SO) et (SR1B_1C = 4, SO) et (SR1B_1D = 4, SO) et (SR1B_1E = 4, SO) et (SR1B_1F = 4, SO) et (SR1B_1G = 4, SO) et (SR1B_91 = 14, SO) et (SR1B_AOB = 4, SO) et (SR1B_A1C = 4, SO) et (SR1B_A2C = 4, SO)	Le répondant n'a utilisé aucune ressource au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
ND	(SR1B_05A = NSP, R, ND) ou (SR1B_08 = NSP, R, ND) ou (SR1B_1A = NSP, R, ND) ou	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au

	(SR1B_1B = NSP, R, ND) ou (SR1B_1C = NSP, R, ND) ou (SR1B_1D = NSP, R, ND) ou (SR1B_1E = NSP, R, ND) ou (SR1B_1F = NSP, R, ND) ou (SR1B_1G = NSP, R, ND) ou (SR1B_91 = NSP, R, ND) ou (SR1B_AOB = NSP, R, ND) ou (SR1B_A1C = NSP, R, ND) ou (SR1B_A2C = NSP, R, ND)	calcul.
--	--	---------

7) Nombre de catégories de ressources utilisées au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Nom de la variable : SR1BDYCT

Basée sur : SR1B_05A, SR1B_08, SR1B_1A à SR1B_1G, SR1B_91, SR1B_AOB, SR1B_A1C, SR1B_A2C

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique le nombre de différents types de ressources utilisées au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Reformatages temporaires :

Reformatage	Explication
Si (SR1B_05A = 4, SO) alors SR1RQ005A = 0 Si 1 <= SR1B_05A <= 3 alors SR1RQ005A = 1 Si (SR1B_08 = 2, SO) alors SR1RQ008 = 0	Recoder 4 ("il y a plus d'un an") et SO à 0 (Non). Recoder 1, 2, 3 ("Durant le dernier mois" à "il y a entre 7-12 mois") à 1 (Oui). Recoder 2, SO à 0 (Non).
Si (SR1B_1A = 4, SO) alors SR1RQ021A = 0 Si 1 <= SR1B_1A <= 3 alors SR1RQ021A = 1 Si (SR1B_1B = 4, SO) alors SR1RQ021B = 0 Si 1 <= SR1B_1B <= 3 alors SR1RQ021B = 1 Si (SR1B_1C = 4, SO) alors SR1RQ021C = 0 Si 1 <= SR1B_1C <= 3 alors SR1RQ021C = 1 Si (SR1B_1D = 4, SO) alors SR1RQ021D = 0 Si 1 <= SR1B_1D <= 3 alors SR1RQ021D = 1 Si (SR1B_1E = 4, SO) alors SR1RQ021E = 0 Si 1 <= SR1B_1E <= 3 alors SR1RQ021E = 1 Si (SR1B_1F = 4, SO) alors SR1RQ021F = 0 Si 1 <= SR1B_1F <= 3 alors SR1RQ021F = 1 Si (SR1B_1G = 4, SO) alors SR1RQ021G = 0 Si 1 <= SR1B_1G <= 3 alors SR1RQ021G = 1	Recoder 4 ("il y a plus d'un an") et SO à 0 (Non). Recoder 1, 2, 3 ("Durant le dernier mois" à "il y a entre 7-12 mois") à 1 (Oui).
Si (SR1B_91 = 14, SO) alors SR1RQ091 = 0 Si 1 <= SR1B_91 <= 13 alors SR1RQ091 = 1	Reformater 14 ("aucun") et SO à 0 (Non). Reformater 1 à 13 à 1 (Oui).
Si (SR1B_AOB = 4, SO) alors SR1RQ100B = 0 Si 1 <= SR1B_AOB <= 3 alors SR1RQ100B = 1	Recoder 4 ("il y a plus d'un an") et SO à 0 (Non). Recoder 1, 2, 3 ("Durant le dernier mois" à "il y a entre 7-12 mois") à 1 (Oui).
Si (SR1B_A1C = 4, SO) alors SR1RQ101C = 0	Recoder 4 ("il y a plus d'un an") et SO à 0 (Non).

Si $1 \leq SR1B_A1C \leq 3$ alors $SR1RQ101C = 1$	Recoder 1, 2, 3 ("Durant le dernier mois" à "il y a entre 7-12 mois") à 1 (Oui).
Si ($SR1B_A2C = 4$, SO) alors $SR1RQ102C = 0$ Si $1 \leq SR1B_A2C \leq 3$ alors $SR1RQ102C = 1$	Recoder 4 ("il y a plus d'un an") et SO à 0 (Non). Recoder 1, 2, 3 ("Durant le dernier mois" à "il y a entre 7-12 mois") à 1 (Oui).

Valeur de SR1BDYCT	Condition(s)	Explication
ND	(SR1B_05A = NSP, R, ND) ou (SR1B_08 = NSP, R, ND) ou (SR1B_1A = NSP, R, ND) ou (SR1B_1B = NSP, R, ND) ou (SR1B_1C = NSP, R, ND) ou (SR1B_1D = NSP, R, ND) ou (SR1B_1E = NSP, R, ND) ou (SR1B_1F = NSP, R, ND) ou (SR1B_1G = NSP, R, ND) ou (SR1B_91 = NSP, R, ND) ou (SR1B_AOB = NSP, R, ND) ou (SR1B_A1C = NSP, R, ND) ou (SR1B_A2C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SR1RQ005A + SR1RQ008 + SR1RQ021A + SR1RQ021B + SR1RQ021C + SR1RQ021D + SR1RQ021E + SR1RQ021F + SR1RQ021G + SR1RQ091 + SR1RQ100B + SR1RQ101C + SR1RQ102C (min : 0; max : 12)	(SR1RQ005A = 0, 1) et (SR1RQ008 = 0, 1) et (SR1RQ021A = 0, 1) et (SR1RQ021B = 0, 1) et (SR1RQ021C = 0, 1) et (SR1RQ021D = 0, 1) et (SR1RQ021E = 0, 1) et (SR1RQ021F = 0, 1) et (SR1RQ021G = 0, 1) et (SR1RQ091 = 0, 1) et (SR1RQ100B = 0, 1) et (SR1RQ101C = 0, 1) et (SR1RQ102C = 0, 1)	Nombre de ressources utilisées au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Utilisation des soins de santé par les membres des FC - Services 2 (4 VD)

1) Indicateur précisant si de l'aide a été reçue au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Nom de la variable : SR2BFH12

Basée sur : SR2B_1A, SR2B_1B, SR2B_1C, SR2B_1D, SR2B_1E, SR2B_1F, SR2B_1G, SR2B_1H

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique si de l'aide a été reçue au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de SR2BFH12	Condition(s)	Explication
ND	(SR2B_1A = NSP, R, ND) ou (SR2B_1B = NSP, R, ND) ou (SR2B_1C = NSP, R, ND) ou (SR2B_1D = NSP, R, ND) ou (SR2B_1E = NSP, R, ND) ou (SR2B_1F = NSP, R, ND) ou (SR2B_1G = NSP, R, ND) ou (SR2B_1H = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
1	SR2B_1A = 1 ou SR2B_1B = 1 ou SR2B_1C = 1 ou SR2B_1D = 1 ou SR2B_1E = 1 ou SR2B_1F = 1 ou SR2B_1G = 1	Le répondant a reçu au moins un type d'aide au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
2	SR2B_1A = 2 et SR2B_1B = 2 et SR2B_1C = 2 et SR2B_1D = 2 et SR2B_1E = 2 et SR2B_1F = 2 et SR2B_1G = 2 et SR2B_1H = 1	Le répondant n'a pas reçu d'aide au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

2) Nombre de types d'aide reçue au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Nom de la variable : SR2BDHCT

Basée sur : SR2B_1A, SR2B_1B, SR2B_1C, SR2B_1D, SR2B_1E, SR2B_1F, SR2B_1G, SR2B_1H

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique le nombre de types d'aide reçue au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Nota : Les variables d'entrée provisoires sont initialisées à zéro et converties à « 1 » si la condition est vérifiée.

Valeur des variables temporaires	Explication
Si SR2B_1A = 2 alors SR2RQ01A = 0 Si SR2B_1B = 2 alors SR2RQ01B = 0 Si SR2B_1C = 2 alors SR2RQ01C = 0 Si SR2B_1D = 2 alors SR2RQ01D = 0 Si SR2B_1E = 2 alors SR2RQ01E = 0 Si SR2B_1F = 2 alors SR2RQ01F = 0 Si SR2B_1G = 2 alors SR2RQ01G = 0	Recodage de toutes les réponses « NON » de 2 à 0 (y compris sans objet).

Valeur de SR2BDHCT	Condition(s)	Explication
ND	(SR2B_1A = NSP, R, ND) ou (SR2B_1B = NSP, R, ND) ou (SR2B_1C = NSP, R, ND) ou (SR2B_1D = NSP, R, ND) ou (SR2B_1E = NSP, R, ND) ou (SR2B_1F = NSP, R, ND) ou (SR2B_1G = NSP, R, ND) ou (SR2B_1H = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SR2RQ01A + SR2RQ01B + SR2RQ01C + SR2RQ01D + SR2RQ01E + SR2RQ01F + SR2RQ01G (min : 0; max : 7)	(SR2RQ01A = 1, 0) et (SR2RQ01B = 1, 0) et (SR2RQ01C = 1, 0) et (SR2RQ01D = 1, 0) et (SR2RQ01E = 1, 0) et (SR2RQ01F = 1, 0) et (SR2RQ01G = 1, 0)	Nombre de types d'aide utilisée au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

3) Indicateur précisant si de l'aide était nécessaire, mais n'a pas été reçue, au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Nom de la variable : SR2BFHUN

Basée sur : SR2B_2B, SR2B_3B, SR2B_4B, SR2B_5B, SR2B_6B, SR2B_7B

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique qu'un certain type d'aide était nécessaire, mais n'a pas été reçue, au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de SR2BFHUN	Condition(s)	Explication
1	SR2B_2B = 1 ou SR2B_3B = 1 ou SR2B_4B = 1 ou SR2B_5B = 1 ou SR2B_6B = 1 ou SR2B_7B = 1	Au moins un type d'aide nécessaire, mais non reçue, pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
2	(SR2B_2B = 2, SO) et (SR2B_3B = 2, SO) et (SR2B_4B = 2, SO) et (SR2B_5B = 2, SO) et (SR2B_6B = 2, SO) et (SR2B_7B = 2, SO)	Aucune aide nécessaire pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
ND	(SR2B_2B = NSP, R, ND) ou (SR2B_3B = NSP, R, ND) ou (SR2B_4B = NSP, R, ND) ou (SR2B_5B = NSP, R, ND) ou (SR2B_6B = NSP, R, ND) ou (SR2B_7B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

4) Indicateur précisant que de l'aide a été reçue au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue, mais qu'elle n'était pas suffisante

Nom de la variable : SR2BFHAN

Basée sur : SR2B_2A, SR2B_3A, SR2B_4A, SR2B_5A, SR2B_6A, SR2B_7A

Usage antérieur : Aucun

Description : Cette variable indique de l'aide a été reçue au cours des 12 derniers mois, mais de l'aide supplémentaire était nécessaire pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de SR2BFHAN	Condition(s)	Explication
1	SR2B_2A = 2 ou SR2B_3A = 2 ou SR2B_4A = 2 ou SR2B_5A = 2 ou SR2B_6A = 2 ou SR2B_7A = 2	De l'aide a été reçue, mais de l'aide supplémentaire était nécessaire pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

2	(SR2B_2A = 1, SO) et (SR2B_3A = 1, SO) et (SR2B_4A = 1, SO) et (SR2B_5A = 1, SO) et (SR2B_6A = 1, SO) et (SR2B_7A = 1, SO)	Aucune aide (supplémentaire) n'était nécessaire pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
ND	(SR2B_2A = NSP, R, ND) ou (SR2B_3A = NSP, R, ND) ou (SR2B_4A = NSP, R, ND) ou (SR2B_5A = NSP, R, ND) ou (SR2B_6A = NSP, R, ND) ou (SR2B_7A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Soutien social (4 VD)

La « Medical Outcomes Study (MOS) Social Support Survey » donne des indicateurs de quatre catégories de soutien social. On a réduit un groupe initial de 50 éléments à 19 éléments de soutien fonctionnel couvrant cinq dimensions :

Soutien émotionnel – l'expression d'une affectivité positive, d'une compréhension empathique et de l'encouragement des expressions des sentiments.

- Soutien informationnel – l'offre de conseils, d'information, d'orientation ou de rétroaction.
- Soutien concret – la prestation d'aide matérielle ou d'aide en terme de comportement.
- Interaction sociale positive – la capacité que les autres personnes ont d'avoir du plaisir avec vous.
- Affection – qui concerne l'expression d'amour et d'affection.
-
- Les analyses empiriques ont montré que les éléments concernant le soutien émotionnel et informationnel devraient être regroupés.
-
- Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, « The MOS Support Survey » (Medical Outcomes Study Social Support Survey), *Social Sciences & Medicine*; 32: 705 - 714

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si SSMB_02 <= 5 alors SSMB_02 = (SSMB_02 - 1)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 5, à 0 à 4 pour les questions avec catégories de réponses. Où 0 renvoie à « jamais » et 4 renvoie à « tout le temps ».
Si SSMB_03 <= 5 alors SSMB_03 = (SSMB_03 - 1)	
Si SSMB_04 <= 5 alors SSMB_04 = (SSMB_04 - 1)	
Si SSMB_05 <= 5 alors SSMB_05 = (SSMB_05 - 1)	
Si SSMB_06 <= 5 alors SSMB_06 = (SSMB_06 - 1)	
Si SSMB_07 <= 5 alors SSMB_07 = (SSMB_07 - 1)	
Si SSMB_08 <= 5 alors SSMB_08 = (SSMB_08 - 1)	
Si SSMB_09 <= 5 alors SSMB_09 = (SSMB_09 - 1)	
Si SSMB_10 <= 5 alors SSMB_10 = (SSMB_10 - 1)	
Si SSMB_11 <= 5 alors SSMB_11 = (SSMB_11 - 1)	
Si SSMB_12 <= 5 alors SSMB_12 = (SSMB_12 - 1)	
Si SSMB_13 <= 5 alors SSMB_13 = (SSMB_13 - 1)	
Si SSMB_14 <= 5 alors SSMB_14 = (SSMB_14 - 1)	
Si SSMB_15 <= 5 alors SSMB_15 = (SSMB_15 - 1)	
Si SSMB_16 <= 5 alors SSMB_16 = (SSMB_16 - 1)	
Si SSMB_17 <= 5 alors SSMB_17 = (SSMB_17 - 1)	
Si SSMB_18 <= 5 alors SSMB_18 = (SSMB_18 - 1)	
Si SSMB_19 <= 5 alors SSMB_19 = (SSMB_19 - 1)	
Si SSMB_20 <= 5 alors SSMB_20 = (SSMB_20 - 1)	

1) Soutien concret – sous-échelle MOS

Nom de la variable : SSMBDTNG

Basée sur : SSMB_02, SSMB_05, SSMB_12, SSMB_15

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SSMA DTNG

ENSP Cycle 4 : SSC0DTNG

ENSP Cycle 3 : SSC8DTNG

Description : La variable détermine le soutien concret dont dispose le répondant. On a demandé au répondant si quelqu'un pourrait l'aider s'il était confiné au lit, pour aller chez le médecin, pour lui préparer des repas ou pour faire les travaux ménagers.

Valeur de SSMBDTNG	Condition(s)	Explication
ND	(SSMB_02 = NSP, R, ND) ou (SSMB_05 = NSP, R, ND) ou (SSMB_12 = NSP, R, ND) ou (SSMB_15 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SSMB_02 + SSMB_05 + SSMB_12 + SSMB_15 (min : 0; max : 16)	0 <= SSMB_02 <= 4 et 0 <= SSMB_05 <= 4 et 0 <= SSMB_12 <= 4 et 0 <= SSMB_15 <= 4	Quantité de soutien concret.

2) Affection – sous échelle MOS

Nom de la variable : SSMBDAFF

Basée sur : SSMB_06, SSMB_10, SSMB_20

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SSMA DAFF

ENSP Cycle 4 : SSC0DAFF

ENSP Cycle 3 : SSC8DAFF

Description : La variable détermine l'affection que le répondant reçoit. On a demandé au répondant si quelqu'un lui témoignait de l'amour, le prenait dans ses bras ou si quelqu'un l'aimait et le faisait se sentir désirable.

Valeur de SSMBDAFF	Condition(s)	Explication
ND	(SSMB_06 = NSP, R, ND) ou (SSMB_10 = NSP, R, ND) ou (SSMB_20 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SSMB_06 + SSMB_10 + SSMB_20 (min : 0; max : 12)	0 <= SSMB_06 <= 4 et 0 <= SSMB_10 <= 4 et 0 <= SSMB_20 <= 4	Quantité d'affection reçu

3) Intéraction sociale positive – sous-échelle MOS

Nom de la variable : SSMBDSOC

Basée sur : SSMB_07, SSMB_11, SSMB_14, SSMB_18

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SSMADSOC

ENSP Cycle 4 : SSC0DSOC

ENSP Cycle 3 : SSC8DSOC

Description : La variable détermine dans quelle mesure le répondant prend part à des interactions sociales positives. On a demandé au répondant s'il pouvait passer un bon moment avec quelqu'un, relaxer avec quelqu'un, faire des activités avec quelqu'un pour se changer les idées ou faire des choses plaisantes avec quelqu'un.

Valeur de SSMBDSOC	Condition(s)	Explication
ND	(SSMB_07 = NSP, R, ND) ou (SSMB_11 = NSP, R, ND) ou (SSMB_14 = NSP, R, ND) ou (SSMB_18 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SSMB_07 + SSMB_11 + SSMB_14 + SSMB_18 (min : 0; max : 16)	0 <= SSMB_07 <= 4 et 0 <= SSMB_11 <= 4 et 0 <= SSMB_14 <= 4 et 0 <= SSMB_18 <= 4	Quantité d'interaction sociale positive.

4) Soutien émotionnel ou informationnel – sous-échelle MOS

Nom de la variable : SSMBDEMO

Basée sur : SSMB_03, SSMB_04, SSMB_08, SSMB_09, SSMB_13, SSMB_16, SSMB_17, SSMB_19

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SSMADEMO

ENSP Cycle 4 : SSC0DEMO

ENSP Cycle 3 : SSC8DEMO

Description : La variable suivante détermine le soutien émotionnel ou informationnel du répondant. On a demandé au répondant si quelqu'un pouvait l'écouter et le conseiller en temps de crise, lui donner des renseignements ou s'il avait quelqu'un à qui il pouvait se confier et parler, ou quelqu'un qui comprend ses problèmes.

Valeur de SSMBDEMO	Condition(s)	Explication
ND	(SSMB_03 = NSP, R, ND) ou (SSMB_04 = NSP, R, ND) ou (SSMB_08 = NSP, R, ND) ou (SSMB_09 = NSP, R, ND) ou (SSMB_13 = NSP, R, ND) ou (SSMB_16 = NSP, R, ND) ou (SSMB_17 = NSP, R, ND) ou (SSMB_19 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SSMB_03 + SSMB_04 + SSMB_08 + SSMB_09 + SSMB_13 + SSMB_16 + SSMB_17 + SSMB_19 (min : 0; max : 32)	0 <= SSMB_03 <= 4 et 0 <= SSMB_04 <= 4 et 0 <= SSMB_08 <= 4 et 0 <= SSMB_09 <= 4 et 0 <= SSMB_13 <= 4 et 0 <= SSMB_16 <= 4 et 0 <= SSMB_17 <= 4 et 0 <= SSMB_19 <= 4	Le soutien émotionnel ou informationnel est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

Caractéristiques sociodémographiques (8 VD)

1) Code du pays de naissance

Nom de la variable : SDCBCCB

Basée sur : SDCB_1

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SDCACCB

ENSP Cycle 3 : SDC8CB

ENSP Cycle 2 : SDC6CB

Description : Cette variable identifie le pays de naissance du répondant.

Spécifications techniques : Cette variable est codée automatiquement d'après SDCB_1 et les réponses en toutes lettres provenant de la catégorie « autre, précisez ». Ces dernières sont inscrites au moyen du fichier de référence du Recensement.

2) Pays de naissance (variable groupée)

Nom de la variable : SDCBGCB

Basée sur : SDCBCCB

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SDCAGCB

ENSP Cycle 3 : SDC8GCB

ENSP Cycle 2 : SDC6GCB

Description : Cette variable classe le répondant en fonction de son pays de naissance en groupes précis.

Valeur de SDCBGCB	Condition(s)	Explication
ND	(SDCBCCB = 000, NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
1	0 < SDCBCCB < 14	Canada
2	100 <= SDCBCCB < 200 ou SDCBCCB = 206	Autre pays d'Amérique du Nord
3	200 < SDCBCCB < 206 ou 206 < SDCBCCB < 500	Amérique du Sud, Amérique centrale et Antilles
4	500 <= SDCBCCB < 600	Europe
5	600 <= SDCBCCB < 700	Afrique
6	700 <= SDCBCCB < 800	Asie
7	800 <= SDCBCCB < 900	Océanie

3) Âge au moment de l'immigration

Nom de la variable : SDCBDAIM

Basée sur : SDCB_3, DHHB_YOB

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SDCADAIM

ENSP Cycle 3 : SDC8DAIM

ENSP Cycle 2 : SDC6DAIM

ENSP Cycle 1 : SDC4DAIM

Description : Cette variable indique l'âge du répondant au moment de son immigration au Canada.

Source : Enquête sociale générale – Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm

Valeur de SDCBDAIM	Condition(s)	Explication
SO	SDCB_3 = SO	Le répondant n'est pas un immigrant.
ND	(SDCB_3 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
SDCB_3 - DHHB_YOB (min : 0; max : âge actuel)	SDCB_3 < SO	Le répondant est un immigrant.

4) Indicateur d'immigration

Nom de la variable : SDCBFIMM

Basée sur : SDCB_3

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SDCAFIMM

ENSP Cycle 3 : SDC8FIMM

ENSP Cycle 2 : SDC6FIMM

ENSP Cycle 1 : SDC4FIMM

Description : Cette variable indique si le répondant est un immigrant.

Valeur de SDCBFIMM	Condition(s)	Explication
2	SDCB_3 = SO	Le répondant n'est pas un immigrant.
1	SDCB_3 < SO	Le répondant est un immigrant.
ND	(SDCB_3 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

5) Nombre d'années au Canada depuis l'immigration

Nom de la variable : SDCBDRES

Basée sur : SDCB_3

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SDCADRES

ENSP Cycle 4 : SDC0DRES

ENSP Cycle 3 : SDC8DRES

ENSP Cycle 2 : SDC6DRES

ENSP Cycle 1 : SDC4DRES

Description : Cette variable identifie le nombre d'années que le répondant est au Canada depuis son immigration.

Valeur de SDCBDRES	Condition(s)	Explication
SO	SDCB_3 = SO	Le répondant n'est pas un immigrant.
ND	(SDCB_3 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
Année de l'interview - SDCB_3 (min : 0; max : (âge actuel))	SDCB_3 < SO	Le répondant est un immigrant.

6) Langue(s) parlée(s) par le répondant

Nom de la variable : SDCBDLNG

Basée sur : SDCB_5A, SDCB_5B, SDCB_5C, SDCB_5D, SDCB_5E, SDCB_5F, SDCB_5G, SDCB_5H, SDCB_5I, SDCB_5J, SDCB_5K, SDCB_5L, SDCB_5M, SDCB_5N, SDCB_5O, SDCB_5P, SDCB_5Q, SDCB_5R, SDCB_5S, SDCB_5T, SDCB_5U, SDCB_5V, SDCB_5W

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SDCADLNG

ENSP Cycle 4 : SDC0DLNG

ENSP Cycle 3 : SDC8DLNG

ENSP Cycle 2 : SDC6DLNG

ENSP Cycle 1 : SDC4DLNG

Description : Cette variable représente la ou les langues que le répondant peut parler.

Valeur de SDCBDLNG	Condition(s)	Explication
ND	(SDCB_5A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
1	SDCB_5A = 1 et SDCB_5B > 1 et SDCB_5C > 1 et SDCB_5D > 1 et SDCB_5E > 1 et SDCB_5F > 1 et SDCB_5G > 1 et SDCB_5H > 1 et SDCB_5I > 1 et SDCB_5J > 1 et SDCB_5K > 1 et SDCB_5L > 1 et SDCB_5M > 1 et SDCB_5N > 1 et	Anglais seulement

	SDCB_5O > 1 et SDCB_5P > 1 et SDCB_5Q > 1 et SDCB_5R > 1 et SDCB_5S > 1 et SDCB_5T > 1 et SDCB_5U > 1 et SDCB_5V > 1 et SDCB_5W > 1	
2	SDCB_5A > 1 et SDCB_5B = 1 et SDCB_5C > 1 et SDCB_5D > 1 et SDCB_5E > 1 et SDCB_5F > 1 et SDCB_5G > 1 et SDCB_5H > 1 et SDCB_5I > 1 et SDCB_5J > 1 et SDCB_5K > 1 et SDCB_5L > 1 et SDCB_5M > 1 et SDCB_5N > 1 et SDCB_5O > 1 et SDCB_5P > 1 et SDCB_5Q > 1 et SDCB_5R > 1 et SDCB_5S > 1 et SDCB_5T > 1 et SDCB_5U > 1 et SDCB_5V > 1 et SDCB_5W > 1	Français seulement
3	SDCB_5A = 1 et SDCB_5B = 1 et SDCB_5C > 1 et SDCB_5D > 1 et SDCB_5E > 1 et SDCB_5F > 1 et SDCB_5G > 1 et SDCB_5H > 1 et SDCB_5I > 1 et SDCB_5J > 1 et SDCB_5K > 1 et SDCB_5L > 1 et SDCB_5M > 1 et SDCB_5N > 1 et SDCB_5O > 1 et SDCB_5P > 1 et SDCB_5Q > 1 et SDCB_5R > 1 et SDCB_5S > 1 et SDCB_5T > 1 et SDCB_5U > 1 et SDCB_5V > 1 et SDCB_5W > 1	Anglais et français seulement
4	(SDCB_5A = 1 et SDCB_5B = 1) et	Anglais, français et autre

	(SDCB_5C = 1 ou SDCB_5D = 1 ou SDCB_5E = 1 ou SDCB_5F = 1 ou SDCB_5G = 1 ou SDCB_5H = 1 ou SDCB_5I = 1 ou SDCB_5J = 1 ou SDCB_5K = 1 ou SDCB_5L = 1 ou SDCB_5M = 1 ou SDCB_5N = 1 ou SDCB_5O = 1 ou SDCB_5P = 1 ou SDCB_5Q = 1 ou SDCB_5R = 1 ou SDCB_5S = 1 ou SDCB_5T = 1 ou SDCB_5U = 1 ou SDCB_5V = 1 ou SDCB_5W = 1)	
5	(SDCB_5A = 1 et SDCB_5B > 1) et (SDCB_5C = 1 ou SDCB_5D = 1 ou SDCB_5E = 1 ou SDCB_5F = 1 ou SDCB_5G = 1 ou SDCB_5H = 1 ou SDCB_5I = 1 ou SDCB_5J = 1 ou SDCB_5K = 1 ou SDCB_5L = 1 ou SDCB_5M = 1 ou SDCB_5N = 1 ou SDCB_5O = 1 ou SDCB_5P = 1 ou SDCB_5Q = 1 ou SDCB_5R = 1 ou SDCB_5S = 1 ou SDCB_5T = 1 ou SDCB_5U = 1 ou SDCB_5V = 1 ou SDCB_5W = 1)	Anglais et autre (autre que français)
6	(SDCB_5A > 1 et SDCB_5B = 1) et (SDCB_5C = 1 ou SDCB_5D = 1 ou SDCB_5E = 1 ou SDCB_5F = 1 ou SDCB_5G = 1 ou SDCB_5H = 1 ou SDCB_5I = 1 ou SDCB_5J = 1 ou SDCB_5K = 1 ou SDCB_5L = 1 ou SDCB_5M = 1 ou)	Français et autre (autre que l'anglais)

	SDCB_5N = 1 ou SDCB_5O = 1 ou SDCB_5P = 1 ou SDCB_5Q = 1 ou SDCB_5R = 1 ou SDCB_5S = 1 ou SDCB_5T = 1 ou SDCB_5U = 1 ou SDCB_5V = 1 ou SDCB_5W = 1)	
7	(SDCB_5A > 1 et SDCB_5B > 1) et (SDCB_5C = 1 ou SDCB_5D = 1 ou SDCB_5E = 1 ou SDCB_5F = 1 ou SDCB_5G = 1 ou SDCB_5H = 1 ou SDCB_5I = 1 ou SDCB_5J = 1 ou SDCB_5K = 1 ou SDCB_5L = 1 ou SDCB_5M = 1 ou SDCB_5N = 1 ou SDCB_5O = 1 ou SDCB_5P = 1 ou SDCB_5Q = 1 ou SDCB_5R = 1 ou SDCB_5S = 1 ou SDCB_5T = 1 ou SDCB_5U = 1 ou SDCB_5V = 1 ou SDCB_5W = 1)	Ni anglais ni français (autre)

7) Origine culturelle ou raciale

Nom de la variable : SDCBDRAC

Basée sur : SDCB_7A, SDCB_7B, SDCB_7C, SDCB_7D, SDCB_7E, SDCB_7F, SDCB_7G, SDCB_7H, SDCB_7I, SDCB_7J, SDCB_7K, SDCB_7L, SDCB_7M

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : SDCADRAC

ENSP Cycle 4 : SDC0DRAC

ENSP Cycle 3 : SDC8DRAC

ENSP Cycle 2 : SDC6DRAC

Description : Cette variable indique la race d'origine du répondant.

Valeur de SDCBDRAC	Condition(s)	Explication
ND	(SDCB_7A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
1	SDCB_7A = 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et	Blanc seulement

	SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	
2	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D = 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	Noir seulement
3	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K = 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	Coréen seulement
4	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E = 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	Philippin seulement
5	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J = 1 et	Japonais seulement

	SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	
6	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B = 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	Chinois seulement
7	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L = 1 et SDCB_7M > 1	Autochtone seulement
8	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C = 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	Sud-Asiatique seulement
9	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G = 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	Asiatique du Sud-Est seulement
10	SDCB_7A > 1 et	Arabe seulement

	SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H = 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	
11	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I = 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	Asiatique de l'Ouest seulement
12	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F = 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M > 1	Latino-américain seulement
13	SDCB_7A > 1 et SDCB_7B > 1 et SDCB_7C > 1 et SDCB_7D > 1 et SDCB_7E > 1 et SDCB_7F > 1 et SDCB_7G > 1 et SDCB_7H > 1 et SDCB_7I > 1 et SDCB_7J > 1 et SDCB_7K > 1 et SDCB_7L > 1 et SDCB_7M = 1	Autre race
14	Plus d'une catégorie indiquée	Race/origine culturelle multiple

8) Première langue officielle apprise et encore comprise

Nom de la variable : SDCBDFL1

Basée sur : SDCB_6A, SDCB_6B, SDCB_6C, SDCB_6D, SDCB_6E, SDCB_6F, SDCB_6G, SDCB_6H, SDCB_6I, SDCB_6J, SDCB_6K, SDCB_6L, SDCB_6M, SDCB_6N, SDCB_6O, SDCB_6P, SDCB_6Q, SDCB_6R, SDCB_6S, SDCB_6T, SDCB_6U, SDCB_6V, SDCB_6W

Usage antérieur : Aucun

Description : Première langue officielle parlée et encore comprise telle que rapporté par le répondant.

Note : Variable créée spécifiquement pour FC.

Valeur de SDCBDFL1	Condition(s)	Explication
ND	(SDCB_6A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
1	SDCB_6A = 1 et SDCB_6B > 1 et SDCB_6C > 1 et SDCB_6D > 1 et SDCB_6E > 1 et SDCB_6F > 1 et SDCB_6G > 1 et SDCB_6H > 1 et SDCB_6I > 1 et SDCB_6J > 1 et SDCB_6K > 1 et SDCB_6L > 1 et SDCB_6M > 1 et SDCB_6N > 1 et SDCB_6O > 1 et SDCB_6P > 1 et SDCB_6Q > 1 et SDCB_6R > 1 et SDCB_6S > 1 et SDCB_6T > 1 et SDCB_6U > 1 et SDCB_6V > 1 et SDCB_6W > 1	Anglais seulement
2	SDCB_6A > 1 et SDCB_6B = 1 et SDCB_6C > 1 et SDCB_6D > 1 et SDCB_6E > 1 et SDCB_6F > 1 et SDCB_6G > 1 et SDCB_6H > 1 et SDCB_6I > 1 et SDCB_6J > 1 et SDCB_6K > 1 et SDCB_6L > 1 et SDCB_6M > 1 et SDCB_6N > 1 et SDCB_6O > 1 et SDCB_6P > 1 et SDCB_6Q > 1 et SDCB_6R > 1 et SDCB_6S > 1 et	Français seulement

	SDCB_6T > 1 et SDCB_6U > 1 et SDCB_6V > 1 et SDCB_6W > 1	
3	(SDCB_6A = 1 et SDCB_6B = 1) et SDCB_6C > 1 et SDCB_6D > 1 et SDCB_6E > 1 et SDCB_6F > 1 et SDCB_6G > 1 et SDCB_6H > 1 et SDCB_6I > 1 et SDCB_6J > 1 et SDCB_6K > 1 et SDCB_6L > 1 et SDCB_6M > 1 et SDCB_6N > 1 et SDCB_6O > 1 et SDCB_6P > 1 et SDCB_6Q > 1 et SDCB_6R > 1 et SDCB_6S > 1 et SDCB_6T > 1 et SDCB_6U > 1 et SDCB_6V > 1 et SDCB_6W > 1	Anglais et français seulement
4	(SDCB_6A = 1 et SDCB_6B = 1) et (SDCB_6C = 1 ou SDCB_6D = 1 ou SDCB_6E = 1 ou SDCB_6F = 1 ou SDCB_6G = 1 ou SDCB_6H = 1 ou SDCB_6I = 1 ou SDCB_6J = 1 ou SDCB_6K = 1 ou SDCB_6L = 1 ou SDCB_6M = 1 ou SDCB_6N = 1 ou SDCB_6O = 1 ou SDCB_6P = 1 ou SDCB_6Q = 1 ou SDCB_6R = 1 ou SDCB_6S = 1 ou SDCB_6T = 1 ou SDCB_6U = 1 ou SDCB_6V = 1 ou SDCB_6W = 1)	Anglais, français et autre
5	(SDCB_6A = 1 et SDCB_6B > 1) et (SDCB_6C = 1 ou SDCB_6D = 1 ou SDCB_6E = 1 ou SDCB_6F = 1 ou SDCB_6G = 1 ou	Anglais et autre (autre que français)

	SDCB_6H = 1 ou SDCB_6I = 1 ou SDCB_6J = 1 ou SDCB_6K = 1 ou SDCB_6L = 1 ou SDCB_6M = 1 ou SDCB_6N = 1 ou SDCB_6O = 1 ou SDCB_6P = 1 ou SDCB_6Q = 1 ou SDCB_6R = 1 ou SDCB_6S = 1 ou SDCB_6T = 1 ou SDCB_6U = 1 ou SDCB_6V = 1 ou SDCB_6W = 1)	
6	(SDCB_6A > 1 et SDCB_6B = 1) et (SDCB_6C = 1 ou SDCB_6D = 1 ou SDCB_6E = 1 ou SDCB_6F = 1 ou SDCB_6G = 1 ou SDCB_6H = 1 ou SDCB_6I = 1 ou SDCB_6J = 1 ou SDCB_6K = 1 ou SDCB_6L = 1 ou SDCB_6M = 1 ou SDCB_6N = 1 ou SDCB_6O = 1 ou SDCB_6P = 1 ou SDCB_6Q = 1 ou SDCB_6R = 1 ou SDCB_6S = 1 ou SDCB_6T = 1 ou SDCB_6U = 1 ou SDCB_6V = 1 ou SDCB_6W = 1)	Français et autre (autre que l'anglais)
7	(SDCB_6A > 1 et SDCB_6B > 1) et (SDCB_6C = 1 ou SDCB_6D = 1 ou SDCB_6E = 1 ou SDCB_6F = 1 ou SDCB_6G = 1 ou SDCB_6H = 1 ou SDCB_6I = 1 ou SDCB_6J = 1 ou SDCB_6K = 1 ou SDCB_6L = 1 ou SDCB_6M = 1 ou SDCB_6N = 1 ou SDCB_6O = 1 ou SDCB_6P = 1 ou SDCB_6Q = 1 ou SDCB_6R = 1 ou	Ni anglais ni français (autre)

	SDCB_6S = 1 ou SDCB_6T = 1 ou SDCB_6U = 1 ou SDCB_6V = 1 ou SDCB_6W = 1)	
--	--	--

Facteurs de stress chez l'enfant et chez l'adulte (1 VD)

1) Facteurs de stress chez l'enfant et chez l'adulte

Nom de la variable : CASBDINX

Basée sur : CASB_1, CASB_2, CASB_3, CASB_4, CASB_5, CASB_6

Usage antérieur : Aucun

Description : Cet indice mesure le nombre d'événements traumatisants auxquels les répondants ont été exposés pendant leur enfance, leur adolescence ou à l'âge adulte. Les événements comprennent une longue hospitalisation, le divorce ou séparation des parents, le chômage prolongé des parents, expulsé(e) de la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal, la consommation fréquente d'alcool ou l'usage fréquent de drogues par un parent ou pris(e) en charge par un service de protection de la jeunesse. Le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée.

Nota : Cette variable est une version modifiée d'une variable utilisée dans le Cycle 4 de l'ENSP (ST_ODT1) et le Cycle 1 (ST_4DT1) de l'ENSP. Il y a des différences entre les variables utilisés dans l'ENSP et l'ESCC. Dans l'ENSP, il y a 7 variables et l'ESCC a 6 variables. Par conséquent, l'échelle de l'ESCC est de 0.0 à 6.0 tandis que l'échelle de l'ENSP est 0.0 à 7.0. L'ENSP a deux variables additionnelles que l'ESCC n'a pas : « effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années » et « été maltraité physiquement. » L'ESCC a une variable que l'ENSP n'a pas : « pris(e) en charge par un service de protection de la jeunesse. »

Reformatages temporaires :

Valeur du reformatages temporaires	Explication
Si CASB_1 <> 1 alors CASRQ1 = 0 Si CASB_2 <> 1 alors CASRQ2 = 0 Si CASB_3 <> 1 alors CASRQ3 = 0 Si CASB_4 <> 1 alors CASRQ4 = 0 Si CASB_5 <> 1 alors CASRQ5 = 0 Si CASB_6 <> 1 alors CASRQ6 = 0	Convertir la valeur « 2 » (non) à zéro pour permettre de calculer.

Création du reformatages temporaires :

Valeur du reformatages temporaires CASRCT12	Condition(s)	Explication
CASRCT12 = CASRQ1 + 1 CASRCT12 = CASRQ2 + 1 CASRCT12 = CASRQ3 + 1 CASRCT12 = CASRQ4 + 1 CASRCT12 = CASRQ5 + 1 CASRCT12 = CASRQ6 + 1 (min : 0; max : 6)	1 <= CASB_1 <= 2 1 <= CASB_2 <= 2 1 <= CASB_3 <= 2 1 <= CASB_4 <= 2 1 <= CASB_5 <= 2 1 <= CASB_6 <= 2	Total des réponses « oui » et « non » de l'échelle de six questions.

Value of CASBDINX	Condition(s)	Explication
ND	0 <= CASRCT12 <= 4	Le répondant qui a répondu « oui » ou « non » à quatre réponses ou moins de l'échelle de six questions.
$((\text{CASRQ1} + \text{CASRQ2} + \text{CASRQ3} + \text{CASRQ4} + \text{CASRQ5} + \text{CASRQ6}) * 6) / \text{CASRCT12}$ (Arrondir à zéro décimale) (min : 0; max : 6)	5 <= CASRCT12 <= 6	Le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée.

Population active des Forces Canadiennes (6 VD)

1) Situation en regard de l'activité la semaine dernière (questionnaire complet)

Nom de la variable : FLFBDWSL

Basée sur : FLFB_01, FLFB_50

Usage antérieur : Modification des variables suivantes :

ESCC Cycle 1.2 : LFBFDWSL

ESCC Cycle 1.1 : LBFADWSL

Description : Cette variable permet de classer le répondant en fonction de sa situation en regard de l'activité au cours de la semaine précédant l'interview et inclut les raisons pour lesquelles il ne travaille pas.

Nota : Cette variable est une modification des variables du module de la population active (EPA) et ne sont pas exactement les mêmes.

Valeur de FLFBDWSL	Condition(s)	Explication
1	FLFB_01 = 1	Le répondant travaillait à un emploi ou une entreprise.
2	(FLFB_50 = 8, 9, 10, 12, 13)	Le répondant travaillait à un emploi – mise à pied temporaire ou saisonnière.
3	0 < FLFB_50 < 8 ou FLFB_50 = 11 ou 13 < FLFB_50 < SO	Le répondant travaillait à un emploi – absent pour d'autres raisons.
ND	(FLFB_01 = NSP, R, ND) ou (FLFB_50 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Principale raison pour ne pas travailler au cours de la semaine dernière

Nom de la variable : FLFBDRNW

Basée sur : FLFB_01, FLFB_50

Usage antérieur : Modification des variables suivantes :

ESCC Cycle 1.2 : LFBFDRNW

ESCC Cycle 1.1 : LBFADRNW

Description : Cette variable indique la raison principale pour laquelle le répondant ne travaillait pas au cours de la semaine précédant l'interview.

Nota : Les valeurs de cette variable ont été changées pour correspondre aux valeurs du module de la population active (EPA) de l'ESCC Cycle 1.2.

Valeur de FLFBDRNW	Condition(s)	Explication
SO	FLFB_01 = 1	Le répondant travaillait
2	FLFB_50 = 1	Maladie ou incapacité
3	FLFB_50 = 2	Responsabilité familiale – enfants
4	FLFB_50 = 3	Responsabilité familiale – parents âgés
5	FLFB_50 = 4	Enceinte / congé de maternité
6	FLFB_50 = 5	Autres responsabilités personnelles ou familiales
7	FLFB_50 = 6	Vacances
8	FLFB_50 = 14	Congé d'études
11	FLFB_50 = 7	Conflit de travail
12	FLFB_50 = 8	Mise à pied temporaire
13	FLFB_50 = 9	Mise à pied saisonnière

14	FLFB_50 = 10	Emploi temporaire, sans travail
18	FLFB_50 = 11	Horaire de travail
15	FLFB_50 = 12	Travailleur indépendant, sans travail
16	FLFB_50 = 13	Entreprise saisonnière
19	FLFB_50 = 15	Autre
ND	(FLFB_50 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

3) Emplois multiples

Nom de la variable : FLFBDMJS

Basée sur : FLFB_03, FLFB_51A

Usage antérieur : Modification des variables suivantes :

ESCC Cycle 1.2 : LBFBDMJS

ESCC Cycle 1.1 : LBFADMJS

Description : Cette variable permet de classer le répondant en fonction du fait qu'il a eu et qu'il a ou non des emplois multiples au cours de la dernière année.

Valeur de FLFBDMJS	Condition(s)	Explication
1	FLFB_51A = 52	A présentement des emplois multiples – en a eus pendant toute l'année dernière
2	FLFB_51A < 52	A présentement des emplois multiples – pas tout au long de la dernière année
3	FLFB_03 = 2	A présentement seulement un emploi
ND	(FLFB_03 = NSP, R, ND) ou (FLFB_51A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

4) Nombre total d'heures travaillées par semaine

Nom de la variable : FLFBDHPW

Basée sur : FLFB_42A, FLFB_42B

Usage antérieur : Modification des variables suivantes :

ESCC Cycle 1.2 : LBFBDHPW

ESCC Cycle 1.1 : LBFADHPW

Description : Cette variable identifie le nombre total d'heures travaillées par semaine par le répondant.

Valeur de FLFBDHPW	Condition(s)	Explication
FLFB_42A + FLFB_42B	FLFB_42A < SO et FLFB_42B < SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi.
FLFB_42B	FLFB_42B < SO et FLFB_42A = SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi dans les Forces canadiennes.

ND	(FLFB_42A = NSP, R, ND) ou (FLFB_42B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

5) Emploi à temps plein/temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles)

Nom de la variable : FLFBDPFT

Basée sur : FLFBHPW

Usage antérieur : Modification des variables suivantes :

ESCC Cycle 1.2 : LFBFBPFT

ESCC Cycle 1.1 : LBFADPFT

ENSP Cycle 4 : LSCODPFT

Description : Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

Valeur de FLFBDPFT	Condition(s)	Explication
ND	FLFBHPW = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
1	$30 \leq \text{FLFBHPW} \leq 168$	Temps plein
2	$1 \leq \text{FLFBHPW} < 30$	Temps partiel

6) Situation au cours de la dernière année

Nom de la variable : FLFBDJST

Basée sur : FLFB_61, FLFB_71

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.2 : LFBFDJST

ESCC Cycle 1.1 : LBFADJST

ENSP Cycle 4 : LSCODJST

Description : Cette variable indique la situation d'emploi du répondant au cours de la dernière année.

Valeur de FLFBDJST	Condition(s)	Explication
1	FLFB_61 = 52	Le répondant travaillait à un emploi tout au long de la dernière année.
4	$(\text{FLFB}_61 + \text{FLFB}_71) = 52$ et $\text{FLFB}_61 < 52$ et $0 < \text{FLFB}_71 < 52$	Le répondant travaillait à un emploi durant une partie de l'année – était sans emploi et à la recherche d'un emploi durant l'autre partie de l'année.
5	FLFB_61 < 52 et FLFB_71 = 0	Le répondant travaillait à un emploi durant une partie de l'année – et était sans emploi et n'était pas à la recherche d'emploi durant l'autre partie de l'année.
7	$(\text{FLFB}_61 + \text{FLFB}_71) < 52$ et FLFB_61 < 52 et $0 < \text{FLFB}_71 < 52$	Le répondant travaillait à un emploi durant une partie de l'année – était sans emploi et était à la recherche d'un emploi durant une partie de l'année – était sans emploi et n'était pas à la recherche d'emploi durant l'autre partie de l'année.

ND	(FLFB_61 = NSP, R, ND) ou (FLFB_71 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

Stress au travail (6 VD)

Les questions relatives au stress au travail ont été subdivisées en six composantes. Comme c'est le cas pour l'indice global, les réponses aux questions reflètent les perceptions des répondants et les différentes dimensions de leur travail. Le nom de chaque sous-échelle reflète la dimension mesurée. On a demandé aux répondants âgés de 15 à 75 ans qui travaillaient ou qui avaient une entreprise en tout temps au cours des 12 derniers mois d'évaluer leur principal emploi. L'indice de 12 questions, fondé sur un ensemble plus large de questions de Karasek (voir Karasek R, Theorell T. *Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life*. New York: Basic Books, Inc. 1990.), reflète les perceptions qu'ont les répondants des différentes dimensions de leur travail, comme la sécurité au travail, le soutien social, la monotonie, les efforts physiques requis et l'étendue de leur participation au processus de prise de décisions. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

Références : aller voir : Schwartz J, Pieper C, Karasek RA. « A procedure for linking psychosocial job characteristics data to health surveys. » *American Journal of Public Health* 1988; 78: 904-9.
 Karasek R, Theorell T. *Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life*. New York: Basic Books, Inc. 1990.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si WSTB_401 <= 5 alors WSTB_401 = (WSTB_401 - 1) Si WSTB_402 <= 5 alors WSTB_402 = (WSTB_402 - 1) Si WSTB_403 <= 5 alors WSTB_403 = (WSTB_403 - 1) Si WSTB_404 <= 5 alors WSTB_404 = (WSTB_404 - 1) Si WSTB_405 <= 5 alors WSTB_405 = (WSTB_405 - 1) Si WSTB_406 <= 5 alors WSTB_406 = (WSTB_406 - 1) Si WSTB_407 <= 5 alors WSTB_407 = (WSTB_407 - 1) Si WSTB_408 <= 5 alors WSTB_408 = (WSTB_408 - 1) Si WSTB_409 <= 5 alors WSTB_409 = (WSTB_409 - 1) Si WSTB_410 <= 5 alors WSTB_410 = (WSTB_410 - 1) Si WSTB_411 <= 5 alors WSTB_411 = (WSTB_411 - 1) Si WSTB_412 <= 5 alors WSTB_412 = (WSTB_412 - 1)	Modifier l'échelle des réponses pour les questions WSTB_401 à WSTB_412 de 1 à 5, à 0 à 4 pour toutes les questions ayant des catégories de réponse valide.
Si WSTB_404 <= 4 alors WSTB_404 = (4 - WSTB_404) Si WSTB_405 <= 4 alors WSTB_405 = (4 - WSTB_405) Si WSTB_408 <= 4 alors WSTB_408 = (4 - WSTB_408) Si WSTB_410 <= 4 alors WSTB_410 = (4 - WSTB_410)	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée WSTB_404, WSTB_405, WSTB_408, WSTB_410 quand ces questions ont des catégories de réponse valide (c.-à-d., codes de réponse de 0 à 4).

1) Échelle de l'indice du stress au travail – Latitude de décision : discrétion relative à la compétence (aptitudes requises)

Nom de la variable : WSTBDSKI

Basée sur : WSTB_401, WSTB_402, WSTB_404

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : WSTADSKI

ENSP Cycle 4 : ST_ODW12

ENSP Cycle 1 : ST_4DW12

Description : Cette variable détermine la diversité des tâches du répondant dans le cadre de son emploi principal au cours des 12 derniers mois. On demandait aux répondants s'ils devaient continuellement apprendre de nouvelles choses ou si leur travail exigeait un degré élevé de compétences et si leur travail consistait à refaire toujours les mêmes choses.

Valeur de WSTBDSKI	Condition(s)	Explication
ND	(WSTB_401 = NSP, R, ND) ou (WSTB_402 = NSP, R, ND) ou (WSTB_404 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
WSTB_401 + WSTB_402 + WSTB_404 (min : 0; max : 12)	0 <= WSTB_401 <= 4 et 0 <= WSTB_402 <= 4 et 0 <= WSTB_404 <= 4	Score obtenu de la sous-échelle de latitude de décision : discrétion relative à la compétence.

2) Échelle de l'indice du stress au travail – latitude de décision : pouvoir décisionnel

Nom de la variable : WSTBDAUT

Basée sur : WSTB_401, WSTB_403, WSTB_409

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : WSTADAUT

ENSP Cycle 4 : ST_ODW13

ENSP Cycle 1 : ST_4DW13

Description : Cette variable détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois lui permet une marge de manœuvre suffisante et s'il a son mot à dire dans le déroulement des choses.

Valeur de WSTBDAUT	Condition(s)	Explication
ND	(WSTB_403 = NSP, R, ND) ou (WSTB_409 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
WSTB_403 + WSTB_409 (min : 0; max : 8)	0 <= WSTB_403 <= 4 et 0 <= WSTB_409 <= 4	Score obtenu de la sous-échelle de latitude de décision : pouvoir décisionnel.

3) Échelle de l'indice du stress au travail – demandes psychologiques

Nom de la variable : WSTBDPSY

Basée sur : WSTB_401, WSTB_405, WSTB_406

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : WSTADPSY

ENSP Cycle 4 : ST_ODW14

ENSP Cycle 1 : ST_4DW14

Description : Cette variable détermine si le répondant a pu éviter d'être touché par les demandes conflictuelles des autres employés et si l'horaire de son principal emploi au cours des 12 derniers mois a été très chargé.

Valeur de WSTBDPSY	Condition(s)	Explication
ND	(WSTB_405 = NSP, R, ND) ou (WSTB_406 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
WSTB_405 + WSTB_406 (min : 0; max : 8)	0 <= WSTB_405 <= 4 et 0 <= WSTB_406 <= 4	Score obtenu de la sous-échelle des demandes psychologiques.

4) Échelle de l'indice du stress au travail – menace de perdre son emploi

Nom de la variable : WSTBDJIN

Basée sur : WSTB_401, WSTB_407

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : WSTADJIN

ENSP Cycle 4 : ST_ODW15

ENSP Cycle 1 : ST_4DW15

Description : Cette variable détermine si le répondant estime que la sécurité de son emploi principal était bonne.

Valeur de WSTBDJIN	Condition(s)	Explication
ND	(WSTB_407 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
WSTB_407 (min : 0 ; max : 4)	0 <= WSTB_407 <= 4	Score obtenu de la sous-échelle des menaces de perdre son emploi.

5) Échelle de l'indice du stress au travail – exigences physiques

Nom de la variable : WSTBDPHY

Basée sur : WSTB_401, WSTB_408

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : WSTADPHY

ENSP Cycle 4 : ST_ODW16

ENSP Cycle 1 : ST_4DW16

Description : Cette variable détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois exigeait beaucoup d'efforts physiques.

Valeur de WSTBDPHY	Condition(s)	Explication
ND	(WSTB_408 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
WSTB_408 (min : 0; max : 4)	$0 \leq WSTB_408 \leq 4$	Score obtenu de la sous-échelle des exigences physiques.

6) Échelle de l'indice du stress au travail – soutien social

Nom de la variable : WSTBDSOC

Basée sur : WSTB_401, WSTB_410, WSTB_411, WSTB_412

Usage antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : WSTADSOC

ENSP Cycle 4 : ST_ODW17

ENSP Cycle 1 : ST_4DW17

Description : Cette variable détermine si le superviseur et les collègues du répondant l'aident ou non dans l'exercice de ses fonctions. De plus, elle détermine si le répondant a été exposé à de l'hostilité ou à des conflits de la part de ses collègues dans le cadre de son principal emploi au cours des 12 derniers mois.

Valeur de WSTBDSOC	Condition(s)	Explication
ND	(WSTB_410 = NSP, R, ND) ou (WSTB_411 = NSP, R, ND) ou (WSTB_412 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
WSTB_410 + WSTB_411 + WSTB_412 (min : 0; max : 12)	$0 \leq WSTB_410 \leq 4$ et $0 \leq WSTB_411 \leq 4$ et $0 \leq WSTB_412 \leq 4$	Score obtenu de la sous-échelle de soutien social.

Revenu (5 VD)

1) Revenu total du ménage, deux catégories

Nom de la variable : INCB DIA2

Basée sur : DHHBDHSZ, INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F

Usage Antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : INCADIA2

ENSP Cycle 4 : INCODIA2

ENSP Cycle 3 : INC8DIA2

ENSP Cycle 2 : INC6DIA2

ENSP Cycle 1 : INC4DIA2

Description : La variable classe le revenu total du ménage dans 2 catégories basé sur le revenu total du ménage et le nombre de personnes vivant dans le ménage.

Valeur de INCB DIA2	Condition(s)	Explication
ND	(INCB_3A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu.
1	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3A = 3 ou INCB_3B = 1 ou INCB_3D = 1] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et (INCB_3A = 1, 3) ou DHHBDHSZ >= 5 et [(INCB_3A = 1, 3) ou INCB_3F = 1]	Faible revenu Moins de 15 000 \$ (1, 2 personnes); Moins de 20 000 \$ (3, 4 personnes) Moins de 30 000 \$ (5 personnes et plus)
2	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3A = 2 ou INCB_3D = 2] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et INCB_3A = 2 ou DHHBDHSZ >= 5 et [INCB_3E = 2 ou INCB_3F = 2]	Revenu moyen ou élevé 15 000 \$ et plus (1, 2 personnes) 20 000 \$ et plus (3, 4 personnes) 30 000 \$ et plus (5 personnes et plus)
ND	Autre	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer.

2) Revenu total du ménage, quatre catégories

Nom de la variable : INCBDA4

Basée sur : DHHBDHSZ, INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F, INCB_3G

Usage Antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : INCADIA4

ENSP Cycle 4 : INCODIA4

ENSP Cycle 3 : INC8DIA4

ENSP Cycle 2 : INC6DIA4

ENSP Cycle 1 : INC4DIA4

Description : La variable permet de classer le revenu total du ménage en quatre catégories selon le revenu total du ménage et le nombre de personnes qui le composent.

Valeur de INCBDA4	Condition(s)	Explication
ND	(INCB_3A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu.
1	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3A = 3 ou INCB_3B = 1 ou INCB_3D = 1] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et (INCB_3A = 1, 3) ou DHHBDHSZ >= 5 et [(INCB_3A = 1, 3) ou INCB_3F = 1]	Revenu inférieur Moins de 15 000 \$ (1, 2 personnes); Moins de 20 000 \$ (3, 4 personnes) Moins de 30 000 \$ (5 personnes et plus)
2	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3D = 2 ou INCB_3F = 1] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et (INCB_3E = 1) ou DHHBDHSZ >= 5 et [INCB_3F = 2 ou (INCB_3G = 1, 2)]	Revenu inférieur ou moyen De 15 000 \$ à 29 999 \$ (1, 2 personnes); De 20 000 \$ à 39 999 \$ (3, 4 personnes); De 30 000 \$ à 59 999 \$ (5 personnes et plus)
3	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3F = 2 ou INCB_3G = 1, 2] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et (INCB_3G = 1, 2, 3) ou DHHBDHSZ >= 5 et INCB_3G = 3	Revenu supérieur moyen De 30 000 \$ à 59 999 \$ (1, 2 personnes); De 40 000 \$ à 79 999 \$ (3, 4 personnes); De 60 000 \$ à 79 999 \$ (5 personnes ou plus)
4	(DHHBDHSZ = 1, 2) et (INCB_3G = 3, 4) ou DHHBDHSZ >= 3 et INCB_3G = 4	Revenu supérieur 60 000 \$ et plus (1, 2 personnes); 80 000 \$ et plus (3 personnes et plus)
ND	Autre	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer.

3) Revenu total du ménage, cinq catégories

Nom de la variable : INCB DIA5

Basée sur : DHHBDHSZ, INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F, INCB_3G

Usage Antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : INCADIA5

ENSP Cycle 4 : INCODIA5

ENSP Cycle 3 : INC8DIA5

ENSP Cycle 2 : INC6DIA5

ENSP Cycle 1 : INC4DIA5

Description : La variable permet de classer le revenu total du ménage en cinq catégories en fonction du revenu total du ménage et du nombre de personnes qui le composent.

Valeur de INCB DIA5	Condition(s)	Explication
ND	(INCB_3A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu.
1	DHHBDHSZ < 5 et [INCB_3A = 3 ou INCB_3B = 1] ou DHHBDHSZ >= 5 et [INCB_3A = 3 ou INCB_3B = 1 ou INCB_3D = 1]	Revenu inférieur Moins de 10 000 \$ (1 à 4 personnes); Moins de 15 000 \$ (5 personnes et plus)
2	(DHHBDHSZ = 1, 2) et INCB_3D = 1 ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et INCB_3B = 2 ou DHHBDHSZ >= 5 et [INCB_3D = 2 ou INCB_3F = 1]	Revenu inférieur moyen De 10 000 \$ à 14 999 \$ (1, 2 personnes); De 10 000 \$ à 19 999 \$ (3, 4 personnes); De 15 000 \$ à 29 999 \$ (5 personnes ou plus)+
3	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3D = 2 ou INCB_3F = 1] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et INCB_3E = 1 ou DHHBDHSZ >= 5 et [INCB_3F = 2 ou (INCB_3G = 1, 2)]	Revenu moyen De 15 000 \$ à 29 999 \$ (1, 2 personnes); De 20 000 \$ à 39 999 \$ (3, 4 personnes); De 30 000 \$ à 59 999 \$ (5 personnes et plus)
4	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3F = 2 ou (INCB_3G = 1, 2)] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et (INCB_3G = 1, 2, 3) ou DHHBDHSZ >= 5 et INCB_3G = 3	Revenu supérieur moyen De 30 000 \$ à 59 999 \$ (1, 2 personnes); De 40 000 \$ à 79 999 \$ (3, 4 personnes); De 60 000 \$ à 79 999 \$ (5 personnes et plus)

5	(DHHBDHSZ = 1, 2) et (INCB_3G = 3, 4) ou DHHBDHSZ >= 3 et INCB_3G = 4	Revenu supérieur 60 000 \$ et plus (1, 2 personnes); 80 000 \$ et plus (3 personnes et plus)
ND	Autre	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer.

4) Revenu total du ménage, toutes provenances

Nom de la variable : INCBDHH

Basée sur : INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F, INCB_3G

Usage Antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : INCADHH

ENSP Cycle 4 : INCODHH

ENSP Cycle 3 : INC8DHH

ENSP Cycle 2 : INC6DHH

ENSP Cycle 1 : INC4DHH

Description : La variable regroupe le revenu total du ménage de toutes provenances.

Valeur de INCBDHH	Condition(s)	Explication
ND	(INCB_3A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu.
1	INCB_3A = 3	Aucun revenu
2	INCB_3C = 1	Moins de 5 000 \$
3	INCB_3C = 2	De 5 000 \$ à 9 999 \$
4	INCB_3D = 1	De 10 000 \$ à 14 999 \$
5	INCB_3D = 2	De 15 000 \$ à 19 999 \$
6	INCB_3F = 1	De 20 000 \$ à 29 999 \$
7	INCB_3F = 2	De 30 000 \$ à 39 999 \$
8	INCB_3G = 1	De 40 000 \$ à 49 999 \$
9	INCB_3G = 2	De 50 000 \$ à 59 999 \$
10	INCB_3G = 3	De 60 000 \$ à 79 999 \$
11	INCB_3G = 4	De 80 000 \$ et plus
ND	Autre	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer.

5) Revenu personnel, toutes provenances

Nom de la variable : INCBDPER

Basée sur : DHHB_AGE, INCB_4A, INCB_4B, INCB_4C, INCB_4D, INCB_4E, INCB_4F, INCB_4G

Usage Antérieur :

ESCC Cycle 1.1 : INCADPER

ENSP Cycle 4 : INCODPER

ENSP Cycle 3 : INC8DPER

ENSP Cycle 2 : INC6DPER

ENSP Cycle 1 : INC4DPER

Description : La variable détermine le revenu personnel du répondant de toutes provenances.

Valeur de INCBDPER	Condition(s)	Explication
SO	DHHB_AGE < 15	Population exclue – Âge < 15
ND	(INCB_4A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu.
1	(INCB_4A = 3, SO)	Aucun revenu
2	INCB_4C = 1	Moins de 5 000 \$
3	INCB_4C = 2	De 5 000 \$ à 9 999 \$
4	INCB_4D = 1	De 10 000 \$ à 14 999 \$
5	INCB_4D = 2	De 15 000 \$ à 19 999 \$
6	INCB_4F = 1	De 20 000 \$ à 29 999 \$
7	INCB_4F = 2	De 30 000 \$ à 39 999 \$
8	INCB_4G = 1	De 40 000 \$ à 49 999 \$
9	INCB_4G = 2	De 50 000 \$ à 59 999 \$
10	INCB_4G = 3	De 60 000 \$ à 79 999 \$
11	INCB_4G = 4	De 80 000 \$ et plus
ND	Autre	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer.

Administration (1 VD)

1) Interview effectuée au téléphone ou sur place

Nom de la variable : ADMBDN09

Basée sur : fichier CASE EVENT

Usage antérieur :

ESCC cycle 1.1 : ADMA_N09 (Variable recueillie).

Description : Cette variable décrit le format de l'interview (téléphonique ou sur place). La question : « Cette interview a-t-elle été réalisée par téléphone ou sur place? » n'a pas été posée lors du cycle 1.2 car, au départ, les interviews téléphoniques n'étaient pas permises. Plus tard, cette restriction a été éliminée et l'on s'est efforcé d'obtenir une approximation de la variable recueillie.

La variable ADMBDN09 est calculée au moyen du fichier de renseignements sur les cas CASE EVENT. Ce fichier contient, pour chaque contact avec un logement sélectionné, un enregistrement indiquant la méthode utilisée (téléphonique ou sur place) et la date et l'heure du début et de fin du contact. On suppose que l'enregistrement pour lequel la durée est la plus longue est celui du contact correspondant à l'entièreté ou à une partie importante de l'interview de la composante sur la santé. La méthode consignée pour ce contact est celle attribuée à la variable ADMBDN09.

Valeur de ADMBDN09	Condition	Explication
1	Le contact le plus long était téléphonique	Au téléphone
2	Le contact le plus long était sur place	Face à face
ND	Pas d'enregistrement connexe de renseignements sur les cas (CASE EVENT)	Non déclaré

Annexe 1 - Titres et codes MOC des groupes professionnels militaires de la Force régulière

Titre	Abréviation	MOS ID	Code
Contrôle aérospatial	C AERO	00184	39
Agent de contrôle de radar aérospatial	AC RDR	00104	170
Opérateur(trice) de contrôle aérospatial	OP C AERO	00104	168
Agent de contrôle aérospatial	AC AE	00104	169
Génie aérospatial	G AERO	00185	41
Technicien(ne) de systèmes d'information stratégiques et de télécommunications aérospatiales	TECH SITA	00109	226
Navigateur(trice) aérien(ne) — Maritime	NAV AIR - MAR	00182	31
Navigateur(trice) aérien(ne) — Transport	NAV AIR - TPT	00182	31
Contrôle de la circulation aérienne	CA	00268	63
Contrôle des armes aériennes	CA AIR	00269	64
Opérateur(trice) de détecteurs électroniques aéroportés	OP DEA	00019	081
Technicien(ne) en structures d'aéronefs	TEC SA	00138	565
Génie de l'air	GA	00189	46
Technicien(ne) de munitions	TEC MUN	00169	921
Arme blindée	BLINDÉS	00178	21
Artillerie	ARTIL	00179	22
Artilleur de défense aérienne	ARTIL DA	00009	022
Artilleur de campagne	ARTIL	00008	021
Technicien(ne) en systèmes aéronautiques	TEC AERO	00135	514
Technicien(ne) en systèmes avioniques	TEC AVIO	00136	526
Technicien(ne) en électronique biomédicale — Supérieure	TEC EB - SUP	00155	718
Technicien(ne) en électronique biomédicale	TEC EB	00155	736
Manoeuvrier	MAN	00105	181
Aumônier (catholique)	AUM C	00201	62
Aumônier (protestant)	AUM P	00200	61
Plongeur(euse) démineur(euse)	PD	00127	341
Technicien(ne) plongeur démineur	TEC PD	00128	342
Génie de combat	GÉNIE C	00339	043
Génie électronique et des communications	GE COMM	00186	42
Génie électronique et des communications — Opérations terrestres	GE COMM TER	00186	42
Génie électronique et des communications — Opérations aériennes	GE COMM AIR	00186	42
Chercheur(euse) en communications	CH COMM	00120	291
Surveillance — Génie construction	SURV GC	00307	649
Technicien(ne) de la construction	TEC CONSTR	00306	648
Cuisinier(ère)	CUIS	00164	861
Sténographie judiciaire	STEN JUD	00322	833

Titre	Abréviation	MOS ID	Code
Homme d'équipage	ÉQUIP	00005	011
Art dentaire	A DENT	00191	51
Art dentaire — Spécialiste en soins dentaires	A DENT-SPEC	00191	51
Technicien(ne) dentaire	TEC DENT	00335	738
Hygiéniste dentaire	TEC DENT - HYGST	00335	725
Technicien(ne) en distribution électrique	TEC DISTR ELEC	00302	642
Technicien(ne) en groupes électrogènes	TEC GE	00303	643
Électro-technicien(ne)	ELECTROTEC	00125	331
Génie	GÉNIE	00181	24
Sapeur	SAP	00012	041
Sapeur-opérateur d'équipement	SOE	00013	042
Technicien(ne) de conduite du tir	TCT	00327	434
Pompier	POMPIER	00149	651
Mécanicien de bord	MEC B	00021	091
Officier général	L OG	00172	11
Officiel général — aumônier (P)	L OG S - AUM (P)	00175	12
Officiel général — aumônier (C)	L OG S - AUM (C)	00175	12
Officiel général — art dentaire	L OG S - A DENT	00175	12
Officiel général — droit	L OG S - DROIT	00175	12
Officiel général — médecine	L OG S - MED	00175	12
Technicien(ne) en géomatique	TEC GEO	00238	142
Administration des services de santé	ASSAN	00192	48
Opérations des services de santé	OP SS	00193	52
Technicien(ne) de coque	TEC COQUE	00124	321
Technicien(ne) en imagerie	TEC IMAG	00137	541
Infanterie	INF	00180	23
Fantassin	FANT	00010	031
Officier du renseignement	RENS	00213	82
Spécialiste du renseignement	S RENS	00099	111
Technicien(ne) de systèmes d'information et de communications terrestres	TEC SICT	00110	227
Génie électrique et mécanique — terre	GEM	00187	43
Droit	DROIT	00204	67
Poseur de lignes	PL	00015	052
Logistique	LOG	00328	78
Logistique — air	LOG-AIR	00328	78
Logistique — terre	LOG-TERRE	00328	78
Logistique — mer	LOG-MER	00328	78
Électricien(ne) de marine	EL MAR	00126	332
Maître mécanicien(ne) de marine	M MEC MAR	00123	314
Mécanicien(ne) de marine	MEC MAR	00121	312
Technicien(ne) de mécanique navale	TEC MEC	00122	313
Génie maritime	G MAR	00188	44
Génie maritime — systèmes de combat	G MAR - SC	00188	44

Titre	Abréviation	MOS ID	Code
Génie maritime — mécanique navale	G MAR - MN	00188	44
Génie maritime — architecture navale	G MAR - AN	00188	44
Génie maritime — construction navale	G MAR - CN	00188	44
Opérations maritimes de surface et sous-marines — plongeur démineur	MAR SS - PD	00207	71
Opérations maritimes de surface et sous-marines — programmeur de systèmes	MAR SS - PS	00207	71
Opérations maritimes de surface et sous-marines — sous-marins	MAR SS - SS	00207	71
Opérations maritimes de surface et sous-marines — bâtiment de surface	MAR SS		71
Opérations maritimes de surface et sous-marines — bâtiment de surface	MAR SS - BS	00207	71
Technicien(ne) des matériaux	TEC MAT	00134	441
Médecine	MED	00196	55
Services paramédicaux	S PARAM	00197	56
Technicien(ne) de laboratoire médical	TEC LAB M	00152	734
Technicien(ne) de laboratoire médical — supérieur	TEC LAB M - SUP	00152	714
Technicien(ne) médical(e)	TEC MED	00334	737
Technicien(ne) médical(e) — médecine aéronautique	TEC MED - MED AERO	00334	731
Technicien(ne) médical(e) subalterne — médecine préventive	TEC MED - SUB MED PREV	00334	733
Technicien(ne) médical(e) — bloc opératoire	TEC MED - BO	00334	713
Technicien(ne) médical(e) — adjoint médical	TEC MED - AM	00334	732
Technicien(ne) médical(e) — technicien supérieur en médecine préventive	TEC MED - SUP MED PREV	00334	716
Médecine — spécialiste médical	MED-SPEC	00196	55
Technicien(ne) en météorologie	TEC MET	00100	121
Police militaire	PM	00161	811
Officier police militaire	O PM	00214	81
Conducteur(trice) de matériel mobile de soutien	CONDUCTEUR MMS	00171	935
Musique	MUS	00210	75
Musicien(ne)	MUSCN	00166	871
Opérateur(trice) d'équipement d'information de combat (marine)	OP EICM	00114	275
Communicateur(trice) naval(e)	COMM N	00299	277
Opérateur(trice) de détecteurs électroniques (marine)	OP DEM	00115	276
Électronicien(ne) naval(e) (acoustique)	ELECTRON N (A)	00116	283
Électronicien(ne) naval(e) (communications)	ELECTRON N (C)	00117	284
Électronicien(ne) naval(e) (gestionnaire)	ELECTRON N (G)	00119	286
Électronicien(ne) naval(e) (tactique)	ELECTRON N (T)	00118	285
Technicien(ne) d'armes navales	TEC AN	00017	065
Soins infirmiers	INFIRM	00195	57

Titre	Abréviation	MOS ID	Code
Opérateur(trice) en océanographie	OP OCEAN	00106	191
Administration du personnel	A PERS	00205	68
Sélection du personnel	S PERS	00208	72
Pharmacie	PHARM	00194	54
Physiothérapie	PHYS	00190	49
Pilote	PIL	00183	32
Technicien(ne) en plomberie et chauffage	TEC PC	00304	646
Poste	POSTE	00212	76
Commis des postes	COMMIS P	00167	881
Affaires publiques	AFF P	00203	66
Radio	RAD	00222	211
Technicien(ne) en réfrigération et mécanique	TEC REFR MEC	00301	641
Commis de soutien à la gestion des ressources	COMMIS SGR	00298	836
Technicien(ne) en recherche et sauvetage	TRS	00101	131
Opérateur(trice) de transmission	OP TRANS	00329	215
Travail social	T SOC	00198	58
Steward	STWD	00165	862
Technicien(ne) en approvisionnement	TEC APPR	00168	911
Opérateur(trice) de détecteurs acoustiques tactiques	OP DACT	00324	278
Télétypiste	TEL	00216	212
Technicien(ne) des mouvements	TEC MOUV	00170	933
Instruction	INSTR	00240	98
Instruction — air	INSTR - AIR	00240	98
Instruction — génie	INSTR - GÉNIE	00240	98
Instruction — terre	INSTR - TERRE	00240	98
Instruction — mer	INSTR - MER	00240	98
Instruction — spécial	INSTR - SP	00240	98
Développement de l'instruction	DEV INSTR	00211	74
Technicien(ne) de véhicules	TEC V	00129	411
Technicien(ne) de l'eau, des produits pétroliers et de l'environnement	TEC EPPE	00305	647
Technicien(ne) d'armement (terre)	TEC A (T)	00130	421
Technicien(ne) en radiologie - supérieur(e)	TEC RADIOL - SUP	00153	715
Technicien(ne) en radiologie	TEC RADIOL	00153	735

Annexe 2 – Titres et codes MOC des groupes professionnels militaires de la Réserve

Titre	Abréviation	MOS ID	Code
Agent de contrôle aérospatial	AC AE	00104	R169
Agent de contrôle de radar aérospatial	AC RDR	00104	R170
Technicien(ne) de systèmes d'information stratégiques et de télécommunications aérospatiales	TEC SITA	00109	R226
Navigateur(trice) aérien(ne) — maritime	NAV AIR - MAR	00182	R31
Navigateur(trice) aérien(ne) — transport	NAV AIR - TPT	00182	R31
Opérateur(trice) de détecteur électronique aéroporté — opérations de détection HS	OP DEA - OP DET HS	00019	R082
Opérateur(trice) de détecteur électronique aéroporté — opérations de détection MP	OP DEA - OP DET MP	00019	R081
Technicien(ne) en structures d'aéronefs — machiniste	TEC SA - MACH	00138	R567
Technicien(ne) en structures d'aéronefs — métaux	TEC SA - MET	00138	R566
Technicien(ne) en structures d'aéronefs — finisseur(euse)	TEC SA - FIN	00138	R568
Technicien(ne) en structures d'aéronefs	TEC SA	00138	R565
Arme blindée	BLINDÉS	00178	R25
Arme blindée — reconnaissance	BLINDÉS - REC	00178	R26
Artillerie — antiaérienne	ARTIL DA	00179	R28
Artillerie de campagne	ARTIL C	00179	R27
Artilleur de défense aérienne	ARTIL DA	00009	R022
Artilleur de campagne	ARTIL	00008	R021
Technicien(ne) en systèmes aéronautiques	TEC AERO	00135	R514
Technicien(ne) en systèmes avioniques — laboratoire	TEC AVIO-LAB	00136	R528
Technicien(ne) en systèmes avioniques — maintenance	TEC AVIO-MAIN	00136	R527
Technicien(ne) en systèmes avioniques	TEC AVIO	00136	R526
Manœuvrier(ère)	MAN	00105	R181
Cadre des instructeurs de cadets — air	CIC-AIR	00232	R93
Cadre des instructeurs de cadets — terre	CIC-TERRE	00232	R92
Cadre des instructeurs de cadets — mer	CIC-MER	00232	R91
Rangers canadiens	RANG CAN	00228	R95
Aumônier (catholique)	AUM (C)	00201	R62
Aumônier (protestant)	AUM (P)	00200	R61
Génie électronique et des communications	GE COMM	00186	R42
Génie électronique et des communications	GE COMM	00186	R42
Surveillant — génie construction	SURV GC	00307	R649
Technicien(ne) de la construction	CONSTR	00306	R648
Cuisinier(ère)	CUIS	00164	R861
Homme d'équipage (blindés)	ÉQUIP	00005	R012
Homme d'équipage — reconnaissance	ÉQUIP - REC	00005	R013
Dentiste	DENT-SPEC	00191	R51
Auxiliaire de clinique dentaire	ACD	00335	R722

Titre	Abréviation	MOS ID	Code
Plongeur(euse)	PLONGEUR	00226	R345
Technicien(ne) en distribution électrique	TEC DISTR ELEC	00302	R642
Technicien(ne) en groupes électrogènes	TEC GE	00303	R643
Génie	GÉNIE	00181	R24
Sapeur	SAP	00012	R041
Mécanicien(ne) de bord	MEC B	00021	R091
Officier général	L OG	00172	R11
Administration des services de santé	ASSAN	00192	R48
Opérations des services de santé	OP SS	00193	R52
Technicien(ne) en imagerie	TEC IMAG	00137	R541
Infanterie	INF	00180	R23
Fantassin	FANT	00010	R031
Renseignements	RENS	00213	R82
Spécialiste du renseignement	S RENS	00099	R111
Technicien(ne) de systèmes d'information et de communications terrestres	TEC SICT	00110	R227
Génie électrique et mécanique — terre	GEM	00187	R43
Droit	DROIT	00204	R67
Poseur de lignes	PL	00015	R052
Mécanicien diesel	MEC DIESEL	00225	R315
Opérations maritimes de surface et sous-marines	MARS SS	00207	R71
Médecine	MED	00196	R55
Services paramédicaux	S PARAM	00150	R711
Technicien(ne) médical(e) — (réserve aérienne)	TEC MED (RA)		R731
Technicien(ne) médical(e) — milice	TEC MED (M)		R731
Technicien(ne) médical(e) — adjoint(e) médical(e) — réserve aérienne	TEC MED - AM (RA)	00150	R711
Technicien(ne) médical(e) — adjoint(e) médical(e) — milice	TEC MED - AM (M)	00150	R711
Médecin spécialiste	MED-SPEC	00196	R55
Météorologiste	MET	00209	R73
Police militaire	PM	00161	R811
Officier de police militaire	O PM	00214	R81
Conducteur de matériel mobile de soutien	CONDUCTEUR MMS	00171	R935
Musique	MUS	00210	R75
Musicien(ne)	MUSCN	00166	R871
Opérateur(trice) d'équipement d'information de combat	OP EIC	00114	R275
Communicateur(trice) naval(e)	COMM N	00299	R277
Contrôle naval de la navigation commerciale	CNNC	00215	R86
Soins infirmiers	S INFIRM	00195	R57
Administration du personnel	A PERS	00205	R68
Sélection du personnel	S PERS	00208	R72
Pharmacie	PHARM	00194	R54
Pilote	PIL	00183	R32

Titre	Abréviation	MOS ID	Code
Technicien(ne) en plomberie et en chauffage	TEC PC	00304	R646
Affaires publiques	AFF P	00203	R66
Radiotélétypiste	RADIO T	00280	R214
Technicien(ne) en réfrigération et mécanique	TEC REFR MEC	00301	R641
Commis de soutien à la gestion des ressources	COMMIS SGR	00298	R836
Opérateur(trice) de transmission	OP TRANS	00329	R215
Technicien(ne) en approvisionnement	TEC APPR	00168	R911
Technicien(ne) des mouvements	TEC MOUV	00170	R933
Technicien(ne) de véhicules	TEC V	00129	R411
Technicien(ne) de l'eau, des produits pétroliers et de l'environnement	TEC EPPE	00305	R647
Technicien d'armement (terre)	TEC A (T)	00130	R421