
Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 1

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------|---|------|
| ADM : Administration | | |
| ADMB_RNO | Numéro d'enregistrement séquentiel | 1 |
| AGP : Agoraphobie | | |
| AGPB_01A | Peur - être seul à la maison | 399 |
| AGPB_01B | Peur - être dans des foules | 400 |
| AGPB_01C | Peur - voyager loin de chez soi | 400 |
| AGPB_01D | Peur - voyager/être seul loin de chez soi | 401 |
| AGPB_01E | Peur - utiliser les transports en commun | 401 |
| AGPB_01F | Peur - conduire une voiture | 402 |
| AGPB_01G | Peur - attendre en ligne dans un lieu public | 402 |
| AGPB_01H | Peur - être dans un magasin | 403 |
| AGPB_01I | Peur - être dans un cinéma, auditorium, église | 403 |
| AGPB_01J | Peur - être dans un restaurant/autres lieux publics | 404 |
| AGPB_01K | Peur - être dans un grand espace ouvert/grande rue | 404 |
| AGPB_02 | Peur agora déjà causée par peur sociale/de performance | 405 |
| AGPB_02A | Peur agora toujours causée par peur sociale/de performance | 405 |
| AGPB_031 | A remémoré l'âge exact de la première fois eu peur agora | 406 |
| AGPB_04A | Type de peur - être seul ou séparé des personnes chères | 409 |
| AGPB_04B | Type de peur - un danger réel comme être volé ou agressé | 410 |
| AGPB_04C | Type de peur - puisse avoir des nausées/diarrhée | 410 |
| AGPB_04D | Type de peur - puisse avoir une attaque de panique | 411 |
| AGPB_04E | Type de peur - puisse avoir crise cardiaque/autre urgence | 411 |
| AGPB_04F | Type de peur - puisse devenir physiquement malade/sans aide | 412 |
| AGPB_04G | Type de peur - puisse être diff./embarrassant de s'échapper | 412 |
| AGPB_04H | Type de peur - une autre chose terrible puisse arriver | 413 |
| AGPB_061 | Étape de vie lorsque première fois a évité situations agora | 415 |
| AGPB_08 | Incident particulier a déclenché toute 1ère peur agora | 415 |
| AGPB_08A | Eu attaque de panique à la suite de l'incident particulier | 416 |
| AGPB_09A | Symptôme - coeur a battu fort/trop vite | 416 |
| AGPB_09B | Symptôme - eu des sueurs | 417 |
| AGPB_09C | Symptôme - eu des tremblements/frémissements | 417 |
| AGPB_09D | Symptôme - eu la bouche sèche | 418 |
| AGPB_11A | Symptôme - eu du mal à respirer normalement | 418 |
| AGPB_11B | Symptôme - eu l'impression d'étouffer | 419 |
| AGPB_11C | Symptôme - eu de la douleur ou malaise à la poitrine | 419 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 2

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| AGPB_11D | Symptôme - eu des nausées ou mal à l'estomac | 420 |
| AGPB_11E | Symptôme - eu des vertiges ou des étourdissements | 420 |
| AGPB_11F | Symptôme - eu peur perdre le contrôle/devenir fou/s'évanouir | 421 |
| AGPB_11G | Symptôme - eu peur de mourir | 421 |
| AGPB_11H | Symptôme - eu des bouffées de chaleur ou des frissons | 422 |
| AGPB_11I | Symptôme - eu des engourdissements ou des picotements | 422 |
| AGPB_11J | Symptôme - eu l'impression de ne pas vraiment être là | 423 |
| AGPB_11K | Symptôme - senti que choses autour n'étaient pas réelles | 423 |
| AGPB_13 | Incapable quitter maison pendant journée entière dû à peur | 424 |
| AGPB_14 | Incapable de quitter la maison sans accompagnement | 426 |
| AGPB_15 | Peur/évitement troublé travail/social/relations | 426 |
| AGPB_16 | Bouleversé/inquiet à cause de la peur/évitement | 427 |
| AGPB_17 | Eu peur ou évité intensivement situations agora - 12 m. | 427 |
| AGPB_17A | Période de référence plus récente peur/évitement agora- 12m. | 428 |
| AGPB_18 | Intensité de la peur hypothétique | 430 |
| AGPB_19 | Fréquence - évité situations agora qui font peur - 12 m. | 430 |
| AGPB_201 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. | 432 |
| AGPB_202 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. | 433 |
| AGPB_20A | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. | 431 |
| AGPB_20C | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. | 434 |
| AGPB_20D | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. | 435 |
| AGPB_22 | Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m. | 436 |
| AGPB_24 | Consulté médecin/autre prof. pour peur agora | 436 |
| AGPB_35 | A reçu traitement qui a aidé pour peur agora | 438 |
| AGPB_37 | Reçu traitement professionnel pour peur agora - 12 m. | 441 |
| AGPB_38 | Hospitalisé pour une nuit ou plus pour peur agora - vie | 442 |
| AGPB_3B1 | Étape de vie quand toute première fois eu peur agora | 409 |
| AGPBDA | Critère A, partie 1 et 2 - (D) | 443 |
| AGPBDAP | Algorithme agoraphobie - vie - (D) | 445 |
| AGPBDAPP | Algorithme agoraphobie sans panique - vie - (D) | 446 |
| AGPBDB | Critère B -(D) | 445 |
| AGPBDB1 | Critère B, partie 1 - (D) | 444 |
| AGPBDB2 | Critère B, partie 2 - (D) | 444 |
| AGPBDB3 | Critère B, partie 3 - (D) | 444 |
| AGPBDINT | Trouble occasionné par l'agoraphobie - moyenne - (D) | 453 |
| AGPBDDPA | Critère A, partie 1 et 2 - (D) | 446 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 3

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|------------------------------------|--|------|
| AGPBDA2 | Critère A, partie 2 - (D) | 445 |
| AGPBDPB | Critère B - (D) | 446 |
| AGPBDPY | Algorithme agoraphobie - 12 m. - (D) | 452 |
| AGPBDPYP | Algorithme agora. sans trouble de panique - 12 m. - (D) | 453 |
| AGPBFINT | Indicateur : trouble par agoraphobie | 454 |
| AGPBG03A | Âge - exact première fois eu peur agora - (G) | 407 |
| AGPBG03B | Âge - approximatif première fois eu peur agora - (G) | 408 |
| AGPBG06 | Âge - 1ère fois commencé à éviter situations agora - (G) | 414 |
| AGPBG17B | Âge - dernière fois intensivement eu peur/évitè situat - (G) | 429 |
| AGPBG24A | Âge - première fois consulté prof. au sujet peur agora - (G) | 437 |
| AGPBG35A | Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé peur agora - (G) | 439 |
| AGPBG35B | Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé peur | 440 |
| AGPBG35C | Nbre total de prof. consulté au sujet peur agora - vie - (G) | 441 |
| AGPBG381 | Nombre de proches parents avec peurs intenses d'agora. - (G) | 443 |
| AGPBG38A | Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur agora - (G) | 442 |
| AGPBGON | Âge à l'apparation de l'agoraphobie - (D,G) | 447 |
| AGPBGONP | Âge à l'apparation de l'agoraphobie (sans panique) - (D,G) | 450 |
| AGPBGPER | Le plus long épisode relatif à l'agoraphobie - (D,G) | 449 |
| AGPBGPRP | Nbre d'ans de persistance de l'agora.(sans panique) - (D,G) | 452 |
| AGPBGRCP | Âge au plus récent épisode d'agora. (sans panique) - (D,G) | 451 |
| AGPBGREC | Âge au plus récent épisode d'agoraphobie - (D,G) | 448 |
| ALC : Consommation d'alcool | | |
| ALCB_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 459 |
| ALCB_10 | Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - vie | 466 |
| ALCB_2 | Fréquence - consommation d'alcool - 12 m. | 459 |
| ALCB_3 | Fréquence - consommation de 5 verres ou plus - 12 m. | 460 |
| ALCB_4 | Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - 12 m. | 460 |
| ALCB_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine passée | 461 |
| ALCB_5A1 | Nombre de verres bus - Dimanche | 461 |
| ALCB_5A2 | Nombre de verres bus - Lundi | 462 |
| ALCB_5A3 | Nombre de verres bus - Mardi | 462 |
| ALCB_5A4 | Nombre de verres bus - Mercredi | 463 |
| ALCB_5A5 | Nombre de verres bus - Jeudi | 463 |
| ALCB_5A6 | Nombre de verres bus - Vendredi | 464 |
| ALCB_5A7 | Nombre de verres bus - Samedi | 464 |
| ALCB_5B | A déjà pris un verre d'alcool - vie | 465 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 4

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|--|------|
| ALCB_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 466 |
| ALCB_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 467 |
| ALCB_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 467 |
| ALCB_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 468 |
| ALCB_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 468 |
| ALCB_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 469 |
| ALCB_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 469 |
| ALCB_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 470 |
| ALCB_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 470 |
| ALCB_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 471 |
| ALCB_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 471 |
| ALCB_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 472 |
| ALCB_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 472 |
| ALCB_8 | Âge commencé à boire de l'alcool | 473 |
| ALCB_9 | Période 1 an où bu 5 verres ou + chaque mois/occasion - vie | 465 |
| ALCBDTYP | Genre de buveur - (D) | 473 |
| ALCBDWKY | Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D) | 474 |
| ALCBGDLY | Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D,G) | 474 |
| ALD : Dépendance à l'égard de l'alcool | | |
| ALDB_01 | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - 12 m. | 475 |
| ALDB_01A | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie | 475 |
| ALDB_01L | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie | 493 |
| ALDB_02 | Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - 12 m. | 476 |
| ALDB_02L | Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - vie | 493 |
| ALDB_03 | Être soûl augmentait les chances de se blesser - 12 m. | 476 |
| ALDB_03A | Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie | 477 |
| ALDB_03L | Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie | 494 |
| ALDB_04 | Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alc - 12 m. | 477 |
| ALDB_04A | Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie | 478 |
| ALDB_04L | Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie | 494 |
| ALDB_05 | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - 12 m. | 478 |
| ALDB_05A | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie | 479 |
| ALDB_05L | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie | 495 |
| ALDB_06 | A passé un mois ou plus à s'enivrer - 12 m. | 479 |
| ALDB_06A | A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie | 480 |
| ALDB_06L | A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie | 495 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 5

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ALDB_07 | A bu beaucoup plus que prévu - 12 m. | 480 |
| ALDB_07A | A bu beaucoup plus que prévu - vie | 481 |
| ALDB_07L | A bu beaucoup plus que prévu - vie | 496 |
| ALDB_08 | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - 12 m. | 481 |
| ALDB_08L | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - vie | 496 |
| ALDB_09 | Devait boire plus pour ressentir le même effet - 12 m. | 482 |
| ALDB_09A | Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie | 482 |
| ALDB_09L | Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie | 497 |
| ALDB_10 | Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - 12 m. | 483 |
| ALDB_10A | Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - vie | 483 |
| ALDB_10L | Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - vie | 497 |
| ALDB_11 | A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - 12 m. | 484 |
| ALDB_11A | A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie | 484 |
| ALDB_11L | A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie | 498 |
| ALDB_12 | A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - 12 m. | 485 |
| ALDB_12A | A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie | 485 |
| ALDB_12L | A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie | 498 |
| ALDB_13 | A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - 12 m. | 486 |
| ALDB_13A | A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie | 486 |
| ALDB_13L | A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie | 499 |
| ALDB_14 | Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - 12 m. | 487 |
| ALDB_14A | Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie | 487 |
| ALDB_14L | Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie | 499 |
| ALDB_15A | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. | 488 |
| ALDB_15C | Niveau de trouble - capacités relations proches - 12 m. | 491 |
| ALDB_15D | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. | 492 |
| ALDB_5B1 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. | 489 |
| ALDB_5B2 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. | 490 |
| ALDBDINT | Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D) | 501 |
| ALDBDPP | Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - 12 m. - (D) | 500 |
| ALDBDSF | Dépendance alcool/marque questionnaire court - 12 m. - (D) | 500 |
| ALDBFINT | Indicateur : trouble occasionné par alcool - 12 m. | 501 |

CCC : Problèmes de santé chroniques

| | | |
|----------|---|----|
| CCCB_011 | A des allergies alimentaires | 26 |
| CCCB_021 | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 26 |
| CCCB_031 | Fait de l'asthme | 27 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 6

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|-------------------------------|--|------|
| CCCB_041 | Souffre de fibromyalgie | 27 |
| CCCB_051 | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 28 |
| CCCB_061 | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 28 |
| CCCB_071 | Fait de l'hypertension | 29 |
| CCCB_081 | A des migraines | 29 |
| CCCB_101 | Est atteint du diabète | 31 |
| CCCB_111 | Est atteint d'épilepsie | 31 |
| CCCB_121 | Souffre d'une maladie cardiaque | 32 |
| CCCB_131 | Souffre d'un cancer | 32 |
| CCCB_141 | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin | 33 |
| CCCB_151 | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 33 |
| CCCB_171 | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite | 34 |
| CCCB_191 | Est atteint de cataracte | 34 |
| CCCB_201 | Est atteint de glaucome | 35 |
| CCCB_211 | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 35 |
| CCCB_251 | Souffre du syndrome de fatigue chronique | 36 |
| CCCB_261 | Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques | 36 |
| CCCB_291 | Souffre d'un trouble obsessionnel-compulsif | 37 |
| CCCB_311 | Souffre du syndrome de stress post-traumatique | 37 |
| CCCB_331 | A des troubles d'apprentissage | 38 |
| CCCB_91A | Est atteint de bronchite chronique | 30 |
| CCCB_91B | Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc. | 30 |
| CCCBF1 | Est atteint d'un problème de santé chronique | 39 |
| CCCBG281 | Est atteint de toutes autres formes de psychose - (G) | 37 |
| CCCBG901 | Autre prob. de santé phys. ou mentale de longue durée - (G) | 38 |
| CPG : Jeu pathologique | | |
| CPGB_01A | Fréquence - dépensé argent pour billets loterie instantanée | 538 |
| CPGB_01B | Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie | 539 |
| CPGB_01C | Fréquence - dépensé argent au bingo | 540 |
| CPGB_01D | Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société | 541 |
| CPGB_01E | Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino) | 542 |
| CPGB_01F | Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (au casino) | 543 |
| CPGB_01G | Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino) | 544 |
| CPGB_01H | Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet | 545 |
| CPGB_01I | Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux | 546 |
| CPGB_01J | Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives | 547 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 7

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|-------------------------|--|------|
| CPGB_01K | Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs | 548 |
| CPGB_01L | Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés | 549 |
| CPGB_01M | Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard | 550 |
| CPGB_01N | Montant d'argent dépensé aux activités de jeu | 551 |
| CPGB_02 | Fréquence - dépensé plus d'argent au jeu que l'intention | 552 |
| CPGB_03 | Fréquence - jouer plus d'argent pour même sentiment | 552 |
| CPGB_04 | Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu | 553 |
| CPGB_05 | Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer | 553 |
| CPGB_06 | Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu | 554 |
| CPGB_07 | Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques | 554 |
| CPGB_08 | Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu | 555 |
| CPGB_09 | Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers | 555 |
| CPGB_10 | Fréquence - senti coupable à propos du jeu | 556 |
| CPGB_11 | Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu | 556 |
| CPGB_12 | Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir | 557 |
| CPGB_13 | Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre | 557 |
| CPGB_14 | Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer; mais incapable | 558 |
| CPGB_15 | Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir | 558 |
| CPGB_16 | Fréquence - activités de jeu causé problème avec famille/ami | 559 |
| CPGB_17 | Autre membre de la famille avec un problème de jeu | 559 |
| CPGB_18 | Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant | 560 |
| CPGBDACT | Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D) | 562 |
| CPGBDSEV | Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D) | 561 |
| CPGBDTYP | Type de joueurs - (D) | 561 |
| CPGBFGAM | Indicateur : activité jeux hasard - Parieurs vs non-parieurs | 560 |
| DEP : Dépression | | |
| DEPB_01 | Période lorsqu'été découragé de ce qui se passait - vie | 113 |
| DEPB_01A | Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie | 113 |
| DEPB_01B | Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie | 114 |
| DEPB_02 | Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie | 114 |
| DEPB_09 | Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie | 115 |
| DEPB_12 | Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie | 115 |
| DEPB_16 | Durée quotidienne - triste/découragé/manqué intérêt - vie | 116 |
| DEPB_17 | Intensité - détresse émotionnelle durant période - vie | 116 |
| DEPB_18 | Fréquence - détresse si sévère, rien ne réjouissait - vie | 117 |
| DEPB_19 | Fréquence - détresse sévère/pas accomplir quotidien - vie | 117 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 8

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DEPB_21 | Eu symptômes semblables à dépression durant épisodes - vie | 118 |
| DEPB_22 | Vécu un épisode particulier nettement pire - vie | 118 |
| DEPB_24A | Symptôme - se sentait triste, vide ou déprimé | 123 |
| DEPB_24B | Symptôme - se sentait si triste que rien ne pouvait réjouir | 123 |
| DEPB_24C | Symptôme - était découragé à propos de ce qui se passait | 124 |
| DEPB_24D | Symptôme - était désespéré quant à l'avenir | 124 |
| DEPB_24E | Symptôme - avait perdu intérêt pour plupart des choses | 125 |
| DEPB_24F | Symptôme - avait impression que rien n'apportait du plaisir | 125 |
| DEPB_261 | Symptôme - poids pris dû à croissance physique/grossesse | 127 |
| DEPB_263 | Symptôme - poids perdu dû à régime/maladie physique | 128 |
| DEPB_265 | Symptôme - incapable faire face responsabilités quotidiennes | 139 |
| DEPB_266 | Symptôme - voulait être seul plutôt que d'être avec amis | 139 |
| DEPB_267 | Symptôme - avait moins envie de parler qu'à l'habitude | 140 |
| DEPB_268 | Symptôme - était souvent en larmes | 140 |
| DEPB_26A | Symptôme - avait beaucoup moins d'appétit qu'à l'habitude | 126 |
| DEPB_26B | Symptôme - avait beaucoup plus d'appétit qu'à l'habitude | 126 |
| DEPB_26C | Symptôme - avait pris du poids sans en avoir l'intention | 127 |
| DEPB_26E | Symptôme - perdait du poids sans en avoir l'intention | 128 |
| DEPB_26G | Symptôme - avait difficulté à s'endormir/rester endormi | 129 |
| DEPB_26H | Symptôme - dormait plus qu'à l'habitude | 129 |
| DEPB_26I | Symptôme - dormait moins qu'à l'habitude/sans fatigué | 130 |
| DEPB_26J | Symptôme - se sentait fatigué/manque d'énergie | 130 |
| DEPB_26K | Symptôme - avait plus d'énergie qu'à l'habitude | 131 |
| DEPB_26L | Symptôme - parlait/déplaçait plus lent qu'à l'habitude | 131 |
| DEPB_26M | Symptôme - autres remarqué répondant parlait/déplaçait lent | 132 |
| DEPB_26N | Symptôme - nerveux/tendu/ne pouvait tenir en place | 132 |
| DEPB_26O | Symptôme - autres ont remarqué répondant était agité | 133 |
| DEPB_26P | Symptôme - pensées étaient plus lentes que d'habitude | 133 |
| DEPB_26Q | Symptôme - pensées sautaient/défilaient rapidement | 134 |
| DEPB_26R | Symptôme - avait plus de difficultés à se concentrer | 134 |
| DEPB_26S | Symptôme - incapable de prendre décision | 135 |
| DEPB_26T | Symptôme - perdu confiance en soi-même | 135 |
| DEPB_26U | Symptôme - se sentait moins bon que les autres | 136 |
| DEPB_26V | Symptôme - se sentait totalement sans valeur | 136 |
| DEPB_26W | Symptôme - se sentait coupable presque tous les jours | 137 |
| DEPB_26X | Symptôme - se sentait irritable/grincheux ou mauvaise humeur | 137 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 9

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DEPB_26Y | Symptôme - se sentait nerveux/anxieux presque tous les jours | 138 |
| DEPB_26Z | Symptôme - avait attaques intenses de peur ou panique | 138 |
| DEPB_28 | Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations | 143 |
| DEPB_281 | Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations | 144 |
| DEPB_28A | Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot. | 145 |
| DEPB_29A | Épisodes dépressifs dus à des causes physiques | 145 |
| DEPB_29B | Causes physiques ont toujours induit épisodes dépressifs | 146 |
| DEPB_30 | Épisodes déjà survenus suite à la mort d'un être proche | 146 |
| DEPB_30A | Épisodes toujours survenus suite à la mort d'un être proche | 147 |
| DEPB_37 | A remémoré l'âge exact du tout premier épisode dépressif | 149 |
| DEPB_371 | Étape de vie quand tout premier épisode dépressif a eu lieu | 152 |
| DEPB_372 | Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste | 152 |
| DEPB_38 | A eu épisode dépressif 2 semaines ou plus - 12 m. | 154 |
| DEPB_38B | Nombre de jours sur 365 était dans un épisode dépressif | 161 |
| DEPB_58 | Déjà eu année entière où avait épisode presque tous les jours | 167 |
| DEPB_64A | Fréquence - se sentait joyeux - 12 m. | 171 |
| DEPB_64B | Fréquence - se sentait au ralenti - 12 m. | 171 |
| DEPB_64C | Fréquence - plaisir à lire/écouter radio/regarder TV - 12 m. | 172 |
| DEPB_65A | Fréquence - pris plaisir aux choses qui plaisaient - 12 m. | 172 |
| DEPB_65B | Fréquence - pouvait rire/voir bon côté des choses - 12 m. | 173 |
| DEPB_65C | Fréquence - était intéressé à son apparence physique - 12 m. | 173 |
| DEPB_65D | Fréquence - se réjouissait d'avance faire des choses - 12 m. | 174 |
| DEPB_661 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. | 176 |
| DEPB_662 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. | 177 |
| DEPB_66A | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. | 175 |
| DEPB_66C | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. | 178 |
| DEPB_66D | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. | 179 |
| DEPB_68 | Nbre de jrs/365 incapable totalement dû aux sentiments | 180 |
| DEPB_6A | Symptôme - pensait souvent à sa propre mort/mort en général | 141 |
| DEPB_6B | Symptôme - pensait qu'il vaudrait mieux être mort | 141 |
| DEPB_72 | A consulté médecin/autre prof. pour sentiments | 180 |
| DEPB_73 | A reçu traitement qui a aidé pour sentiments | 183 |
| DEPB_86 | Reçu traitement professionnel pour sentiments - 12 m. | 186 |
| DEPB_87 | Hospitalisé pour une nuit ou plus pour sentiments - vie | 187 |
| DEPB_8A | Période de référence de l'épisode dépressif - 12 m. | 154 |
| DEPB_8A2 | Mois - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté | 156 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 10

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DEPB_8A3 | Année - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté | 157 |
| DEPB_8A6 | Unique épisode des 12 derniers mois - terminé/se poursuit | 159 |
| DEPB_8A9 | Premier épisode des 12 derniers mois terminé/se poursuit | 161 |
| DEPB_A | Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode | 142 |
| DEPBD664 | Niveau de trouble (clôture à 4) - (D) | 195 |
| DEPBD667 | Critère E, partie 3A1 - Trouble élevé - (D) | 200 |
| DEPBDA | Critère A, partie 1 et 2 - (D) | 194 |
| DEPBDA1 | Critère A, partie 1 - (D) | 191 |
| DEPBDA2 | Critère A, partie 2 - (D) | 194 |
| DEPBDA21 | Critère A, partie 2 - symptôme 1 - (D) | 191 |
| DEPBDA22 | Critère A, partie 2 - symptôme 2 - (D) | 191 |
| DEPBDA23 | Critère A, partie 2 - symptôme 3 - (D) | 192 |
| DEPBDA24 | Critère A, partie 2 - symptôme 4 - (D) | 192 |
| DEPBDA25 | Critère A, partie 2 - symptôme 5 - (D) | 192 |
| DEPBDA26 | Critère A, partie 2 - symptôme 6 - (D) | 193 |
| DEPBDA27 | Critère A, partie 2 - symptôme 7 - (D) | 193 |
| DEPBDA28 | Critère A, partie 2 - symptôme 8 - (D) | 193 |
| DEPBDA29 | Critère A, partie 2 - symptôme 9 - (D) | 194 |
| DEPBDC | Critère C, partie 1 et 2 - (D) | 196 |
| DEPBDC1 | Critère C, partie 1 - (D) | 195 |
| DEPBDC2 | Critère C, partie 2 - (D) | 195 |
| DEPBDDPS | Algorithme épisode dépressif majeur - (D) | 202 |
| DEPBDDY | Algorithme épisode dépressif majeur - 12 m. - (D) | 207 |
| DEPBDE | Critère E, partie 1, 2 et 3 - (D) | 202 |
| DEPBDE1 | Critère E, partie 1 - (D) | 196 |
| DEPBDE2 | Critère E, partie 2 - (D) | 199 |
| DEPBDE21 | Critère E, partie 2.1 - (D) | 196 |
| DEPBDE22 | Critère E, partie 2.2 - (D) | 197 |
| DEPBDE23 | Critère E, partie 2.3 - (D) | 197 |
| DEPBDE24 | Critère E, partie 2.4 - (D) | 198 |
| DEPBDE25 | Critère E, partie 2.5 - (D) | 198 |
| DEPBDE26 | Critère E, partie 2.6 - (D) | 199 |
| DEPBDE3 | Critère E, partie 3 - (D) | 201 |
| DEPBDE3A | Critère E, partie 3A - (D) | 200 |
| DEPBDE3B | Critère E, partie 3B - (D) | 200 |
| DEPBDE3C | Critère E, partie 3C - (D) | 201 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 11

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DEPBDE3E | Critère E, partie 3E - (D) | 201 |
| DEPBDINT | Trouble occasionné par la dépression - Moyenne - (D) | 209 |
| DEPBDYA | Critère A - 12 mois - (D) | 206 |
| DEPBDYB | Critère B - 12 mois - (D) | 206 |
| DEPBDYC | Critère C - 12 mois - (D) | 207 |
| DEPBFINT | Indicateur : trouble occasionné par dépression | 210 |
| DEPBFSLA | Indicateur : suicide - tentative - vie | 208 |
| DEPBFSLT | Indicateur : suicide - pensée - vie | 207 |
| DEPBFSYA | Indicateur : suicide - tentative - 12 m. | 209 |
| DEPBFSYT | Indicateur : suicide - pensée - 12 m. | 208 |
| DEPBG22A | Âge - lorsque pire épisode a commencé - (G) | 119 |
| DEPBG22B | Durée du pire épisode - (G) | 120 |
| DEPBG23A | Âge - lorsque dernier mauvais épisode a eu lieu - (G) | 121 |
| DEPBG23B | Durée du dernier pire épisode - (G) | 122 |
| DEPBG31 | Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie - (G) | 148 |
| DEPBG37A | Âge - exact tout premier épisode dépressif - (G) | 150 |
| DEPBG37B | Âge - approximatif premier épisode dépressif - (G) | 151 |
| DEPBG38C | Âge - lors du dernier épisode dépressif - (G) | 162 |
| DEPBG39A | Durée de l'épisode le plus long - (G) | 163 |
| DEPBG531 | Nbre d'épisodes de 2 semaines résultat d'expériences stress. | 164 |
| DEPBG54 | Nombre d'années eu au moins un épisode dépressif - (G) | 165 |
| DEPBG56 | Plus longue pér. d'an. conséq. eu au moins 1 épis/an - (G) | 166 |
| DEPBG59 | Nbre d'années eu épisode presque tous les jours - vie - (G) | 168 |
| DEPBG59A | Âge - 1ère fois où année eu épis. presque tous les jrs - (G) | 169 |
| DEPBG61 | Plus longue pér d'an. conséq/épis presque tous les jrs - (G) | 170 |
| DEPBG721 | Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de sentiments - (G) | 181 |
| DEPBG72A | Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de sentiments - (G) | 182 |
| DEPBG73A | Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour sent. - (G) | 184 |
| DEPBG73B | Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G) | 185 |
| DEPBG74 | Nbre total prof consulté au sujet des sentiments - vie - (G) | 186 |
| DEPBG7CA | Durée du premier épisode - (G) | 153 |
| DEPBG871 | Âge - 1ère fois hospitalisé de nuit pour sentiments - (G) | 188 |
| DEPBG87A | Âge - 1ère fois hospitalisé de nuit pour sentiments - (G) | 189 |
| DEPBG88 | Nombre de proches parents déjà eu épisode dépressif - (G) | 190 |
| DEPBG8A1 | Nombre d'épisodes différents - 12 m. | 155 |
| DEPBG8AA | Durée de l'épisode unique de 12 mois - (G) | 158 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 12

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|------|
| DEPBG8BA | Durée du premier de plusieurs épisode de 12 m. - (G) | 160 |
| DEPBGON | Âge à l'apparition de l'épisode dépressif majeur - (D,G) | 203 |
| DEPBGPBR | Le plus long épisode relatif à la dépression - (G) | 205 |
| DEPBGREC | Âge plus récent épisode dépressif majeur - (D,G) | 204 |
| DEPBISYA | Code d'imputation pour DEPBFSYA | 209 |
| DEPBISYT | Code d'imputation pour DEPBFSYT | 208 |
| DHH : Variables démographiques et sur les ménages | | |
| DHHB_SEX | Sexe | 3 |
| DHHBDECF | Type de ménage - (D) | 902 |
| DHHBG611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D,G) | 901 |
| DHHBGAGE | Âge - (G) | 3 |
| DHHBGBED | Logement - nombre de chambres à coucher - (G) | 903 |
| DHHBGL12 | Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D,G) | 900 |
| DHHBGLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G) | 901 |
| DHHBGLVG | Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D,G) | 903 |
| DHHBGMS | État matrimonial - (G) | 4 |
| DIS : Détresse | | |
| DISB_10A | Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé | 95 |
| DISB_10B | Fréquence - détresse : senti nerveux - mois passé | 96 |
| DISB_10C | Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé | 96 |
| DISB_10D | Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé | 97 |
| DISB_10E | Fréquence - détresse : senti agité/pas en place - mois passé | 97 |
| DISB_10F | Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé | 98 |
| DISB_10G | Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé | 98 |
| DISB_10H | Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé | 99 |
| DISB_10I | Fréquence - détresse : senti tout était effort - mois passé | 99 |
| DISB_10J | Fréquence - détresse : senti bon à rien - mois passé | 100 |
| DISB_10K | Fréquence - détresse : survenance des sentiments - m. passé | 100 |
| DISB_10L | Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé | 101 |
| DISB_10M | Degré de faible survenance des sentiments - mois passé | 101 |
| DISB_10N | Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé | 102 |
| DISBDCHR | Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D) | 103 |
| DISBDDSX | Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D) | 102 |
| DISBDK6 | Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D) | 103 |

DSM : Troubles figurant au DSM-IV en général

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 13

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|------------------------------------|---|------|
| MHPBFINT | Indicateur : trouble déclaré | 457 |
| MHPBFL | Troubles dépendance sélectionnés - vie | 454 |
| MHPBFLA | Troubles sélectionnés d'anxiété - vie | 455 |
| MHPBFLM | Troubles sélectionnés de l'humeur - vie | 455 |
| MHPBFY | Troubles/toxico-dépendance sélectionnés - 12 m. | 455 |
| MHPBFYA | Troubles sélectionnés d'anxiété - 12 m. | 456 |
| MHPBFYM | Troubles sélectionnés de l'humeur - 12 m. | 456 |
| MHPBFYSA | Toxico-dépendances sélectionnées - 12 m. | 456 |
| MHPBGAON | Âge à l'apparation - Troubles sélectionnés - (D,G) | 458 |
| EDU : Éducation | | |
| EDUBDH04 | Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D) | 899 |
| EDUBDH10 | Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D) | 900 |
| EDUBDR04 | Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D) | 898 |
| EDUBDR10 | Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D) | 899 |
| ETA : Troubles alimentaires | | |
| ETAB_01A | A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie | 562 |
| ETAB_01B | A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m. | 563 |
| ETAB_02 | Fréquence - été terrifié d'être trop gros | 563 |
| ETAB_03 | Fréquence - évité de manger quand avait faim | 564 |
| ETAB_04 | Fréquence - été préoccupé par la nourriture | 564 |
| ETAB_05 | Fréquence - eu des épisodes de glotonnerie | 565 |
| ETAB_06 | Fréquence - découpé les aliments en petits morceaux | 565 |
| ETAB_07 | Fréquence - été conscient de la valeur calorique | 566 |
| ETAB_08 | Fréquence - évité les aliments riches en glucide | 566 |
| ETAB_09 | Fréquence - manger plus serait apprécié par les autres | 567 |
| ETAB_10 | Fréquence - vomis après avoir mangé | 567 |
| ETAB_11 | Fréquence - senti coupable après avoir mangé | 568 |
| ETAB_12 | Fréquence - préoccupé par le désir d'être plus mince | 569 |
| ETAB_13 | Fréquence - préoccupé à brûler calories en faisant exercice | 570 |
| ETAB_14 | Fréquence - répondant trop mince selon les autres personnes | 571 |
| ETAB_15 | Fréquence - préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps | 572 |
| ETAB_16 | Fréquence - pris plus de temps à prendre ses repas | 573 |
| ETAB_17 | Fréquence - évité de manger des aliments contenant du sucre | 574 |
| ETAB_18 | Fréquence - a mangé des aliments diététiques | 575 |
| ETAB_19 | Fréquence - eu impression que la nourriture dominait la vie | 576 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 14

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|---|------|
| ETAB_20 | Fréquence - démontré capacité à contrôler son alimentation | 577 |
| ETAB_21 | Fréquence - autres personnes poussaient à manger | 578 |
| ETAB_22 | Fréquence - accordé trop de temps/pensée à la nourriture | 579 |
| ETAB_23 | Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries | 580 |
| ETAB_24 | Fréquence - mis à la diète | 581 |
| ETAB_25 | Fréquence - aimait avoir l'estomac vide | 582 |
| ETAB_26 | Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas | 583 |
| ETAB_27 | Fréquence - aimait des aliments nouveaux et riches | 584 |
| ETABDIND | Résultat de l'indice du Test d'attitudes alimentaires - (D) | 584 |
| ETABFIND | Indicateur : test d'attitudes alimentaires | 585 |
| GEN : État de santé général | | |
| GENB_01 | Évaluation personnelle de la santé | 4 |
| GENB_02 | Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier | 5 |
| GENB_03 | Nombre d'heures passé à dormir chaque nuit | 6 |
| GENB_04 | Fréquence - problèmes à s'endormir | 7 |
| GENB_05 | Fréquence - sommeil est réparateur | 7 |
| GENB_06 | Fréquence - difficulté à rester éveillé | 8 |
| GENB_07 | Évaluation personnelle du stress | 8 |
| GENB_08 | A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois | 9 |
| GENB_09 | Évaluation personnelle du stress au travail | 9 |
| GENB_10 | Sentiment d'appartenance à la communauté locale | 10 |
| GENBDHDI | Indice de la description de la santé - (D) | 10 |
| GEO : Identificateurs géographiques | | |
| GEOB_PRV | Province | 1 |
| GEOBGHR4 | Région socio-sanitaire - (G) | 2 |
| HWT : Taille et poids | | |
| HWTB_1 | Enceinte actuellement | 39 |
| HWTB_4 | Opinion du répondant à propos de son poids | 40 |
| HWTBGBMI | Indice de la masse corporelle - (D,G) | 42 |
| HWTBGHT | Taille - (G) | 41 |
| HWTBGSW | Poids standard - (D,G) | 42 |
| HWTBGWTK | Poids - kilogrammes - (D,G) | 42 |
| IDG : Drogues illicites | | |
| IDGB_01 | Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie | 502 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 15

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| IDGB_02 | Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m. | 502 |
| IDGB_03 | Fréquence - marijuana, cannabis - 12 m. | 503 |
| IDGB_04 | Consommé - cocaïne ou crack - vie | 503 |
| IDGB_05 | Consommé - cocaïne ou crack - 12 m. | 504 |
| IDGB_06 | Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m. | 504 |
| IDGB_07 | Consommé - speed (amphétamines) - vie | 505 |
| IDGB_08 | Consommé - speed (amphétamines) - 12 m. | 505 |
| IDGB_09 | Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m. | 506 |
| IDGB_10 | Consommé - ecstasy (MDMA) - vie | 506 |
| IDGB_11 | Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m. | 507 |
| IDGB_12 | Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m. | 507 |
| IDGB_13 | Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie | 508 |
| IDGB_14 | Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m. | 508 |
| IDGB_15 | Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m. | 509 |
| IDGB_16 | Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie | 509 |
| IDGB_17 | Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m. | 510 |
| IDGB_18 | Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m. | 510 |
| IDGB_19 | Consommé - héroïne - vie | 511 |
| IDGB_20 | Consommé - héroïne - 12 m. | 511 |
| IDGB_21 | Fréquence - héroïne - 12 m. | 512 |
| IDGB_22 | Consommé - stéroïdes - vie | 512 |
| IDGB_23 | Consommé - stéroïdes - 12 m. | 513 |
| IDGB_24 | Fréquence - stéroïdes - 12 m. | 513 |
| IDGB_25A | Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m. | 514 |
| IDGB_25B | Eu symptôme lors de période diminution/sans drogue - 12 m. | 515 |
| IDGB_25C | Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m. | 516 |
| IDGB_25D | Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - 12 m. | 517 |
| IDGB_25E | A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m. | 518 |
| IDGB_25F | Consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m. | 519 |
| IDGB_25G | A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m. | 520 |
| IDGB_25H | Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - 12 m. | 521 |
| IDGB_26A | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. | 523 |
| IDGB_26C | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. | 526 |
| IDGB_26D | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. | 527 |
| IDGB_5A1 | Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie | 515 |
| IDGB_5AA | Consommé drogues au moins 1 fois/mois pendant 1 an - vie | 514 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 16

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------|--|------|
| IDGB_5AL | Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie | 528 |
| IDGB_5B1 | Eu symptôme lors de période diminution/sans drogue - vie | 516 |
| IDGB_5BL | Eu symptôme lors de période diminution/sans drogue - vie | 528 |
| IDGB_5C1 | Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie | 517 |
| IDGB_5CL | Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie | 529 |
| IDGB_5D1 | Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - vie | 518 |
| IDGB_5DL | Consommé drogues même si promis de ne pas le faire - vie | 529 |
| IDGB_5E1 | A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie | 519 |
| IDGB_5EL | A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie | 530 |
| IDGB_5F1 | Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie | 520 |
| IDGB_5FL | Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie | 530 |
| IDGB_5G1 | A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie | 521 |
| IDGB_5GL | A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie | 531 |
| IDGB_5H1 | Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie | 522 |
| IDGB_5HL | Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie | 531 |
| IDGB_6B1 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. | 524 |
| IDGB_6B2 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. | 525 |
| IDGBDINT | Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D) | 537 |
| IDGBFINT | Indicateur : trouble occasionné par drogues illicites - 12 m | 538 |
| IDGBFLA | Cons. drogues ill. - incluant une seule fois cannabis - vie | 535 |
| IDGBFLAC | Cons. drogues ill. - excluant une seule fois cannabis - vie | 535 |
| IDGBFLAM | Consommation amphétamines (speed) - vie | 533 |
| IDGBFLCA | Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie | 532 |
| IDGBFLCM | Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie | 532 |
| IDGBFLCO | Consommation cocaïne / crack - vie | 533 |
| IDGBFLEX | Consommation MDMA (ecstasy) - vie | 533 |
| IDGBFLGL | Consommation colle, essence ou autres solvants - vie | 534 |
| IDGBFLHA | Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie | 534 |
| IDGBFLHE | Consommation d'héroïne - vie | 534 |
| IDGBFLST | Consommation de stéroïdes - vie | 535 |
| IDGBFYA | Cons. drogues ill. - incl. une seule fois cannabis - 12 m. | 536 |
| IDGBFYAC | Cons. drogues ill. - excl. une seule fois cannabis - 12 m. | 536 |
| IDGBFYCM | Consommation cannabis - excluant une seule fois - 12 m. | 532 |
| IDGBFYDP | Critère - Dépendance aux drogues - 12 m. | 537 |
| INC : Revenu | | |
| INCB DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 923 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 17

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|------|
| INCBDA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 924 |
| INCBDA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 924 |
| INCBG2 | Revenu total du ménage - source principale - (G) | 923 |
| INCBGHH | Revenu total du ménage de toutes sources - (D,G) | 925 |
| INCBGPER | Revenu personnel total de toutes sources - (D,G) | 925 |
| LBF : Population active | | |
| LFBF_31A | Occupation - emploi principal ou entreprise | 907 |
| LFBFDHPW | Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D) | 909 |
| LFBFDMJS | L'état d'emploi multiple - (D) | 909 |
| LFBFDPFT | Heures régulières travaillées - temps plein / temps partiel | 910 |
| LFBFDWSL | L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D) | 908 |
| LFBFDWSS | L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D) | 907 |
| LFBFG31 | État du travail à son compte - emploi / entreprise prin -(G) | 906 |
| LFBFGJST | L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D,G) | 910 |
| LFBFGRNW | Raison principale d'être sans emploi/semaine dern. - (D,G) | 908 |
| MED : Consommation de médicaments | | |
| MEDB_11A | Consommé des médicaments pour aider à dormir - 12 m. | 785 |
| MEDB_11B | Consommé des pilules pour maigrir - 12 m. | 786 |
| MEDB_11C | Consommé médicaments pour réduire l'anxiété - 12 m. | 786 |
| MEDB_11D | Consommé des régulateurs de l'humeur - 12 m. | 787 |
| MEDB_11E | Consommé des antidépresseurs - 12 m. | 787 |
| MEDB_11F | Consommé des méd. traiter comportements psychotiques - 12 m. | 788 |
| MEDB_11G | Consommé des stimulants - 12 m. | 788 |
| MEDB_2 | 2 derniers jours - nombre de médicaments pris | 844 |
| MEDB_3AA | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 1 | 846 |
| MEDB_3BA | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 2 | 848 |
| MEDB_3CA | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 3 | 850 |
| MEDB_3DA | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 4 | 852 |
| MEDB_3EA | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 5 | 854 |
| MEDB_3FA | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 6 | 856 |
| MEDB_3GA | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 7 | 858 |
| MEDB_3HA | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 8 | 860 |
| MEDB_3IA | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 9 | 862 |
| MEDB_3JA | Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 10 | 863 |
| MEDB_3KA | Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 11 | 865 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 18

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MEDB_3LA | Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 12 | 866 |
| MEDB_4 | Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments | 866 |
| MEDB_5 | Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m. | 867 |
| MEDB_6A | Produit pour la santé utilisé - Herbe de Saint-Jean | 867 |
| MEDB_6B | Produit pour la santé utilisé - valériane | 868 |
| MEDB_6C | Produit pour la santé utilisé - camomille | 868 |
| MEDB_6D | Produit pour la santé utilisé - ginseng | 869 |
| MEDB_6E | Produit pour la santé utilisé - kava kava | 869 |
| MEDB_6F | Produit pour la santé utilisé - lavande | 870 |
| MEDB_6G | Produit pour la santé utilisé - poivre des moines | 870 |
| MEDB_6H | Produit pour la santé utilisé - actée à grappe noire | 871 |
| MEDB_6I | Produit pour la santé utilisé - ginkgo biloba | 871 |
| MEDB_6J | Produit pour la santé utilisé - NeuRocover-DA | 872 |
| MEDB_6K | Produit pour la santé utilisé - vitamines | 872 |
| MEDB_6L | Produit pour la santé utilisé - autre | 873 |
| MEDB_7 | Produit pour santé recommandé par un professionnel | 873 |
| MEDB_8A | Produit pour santé recommandé par un psychiatre | 874 |
| MEDB_8B | Produit pour santé recommandé par un médecin/omnipraticien | 874 |
| MEDB_8C | Produit pour santé recommandé par un autre médecin | 875 |
| MEDB_8D | Produit pour santé recommandé par un psychologue | 875 |
| MEDB_8E | Produit pour santé recommandé par un chiropraticien | 876 |
| MEDB_8F | Produit pour santé recommandé par une infirmière | 876 |
| MEDB_8G | Produit pour santé recommandé par un travailleur social | 877 |
| MEDB_8H | Produit pour santé recommandé par un homéopathe/naturopathe | 877 |
| MEDB_8I | Produit pour santé recommandé par un herboriste | 878 |
| MEDB_8J | Produit pour santé recommandé par un relaxologue | 878 |
| MEDB_8K | Produit pour santé recommandé par instructeur de biofeedback | 879 |
| MEDB_8L | Produit pour santé recommandé par autre | 879 |
| MEDB_A1 | Médicaments pour dormir sous supervision professionnelle | 789 |
| MEDB_A2A | Médicaments pour dormir prescrits par un psychiatre | 789 |
| MEDB_A2B | Médicaments pour dormir prescrits par méd. de famille/omni | 790 |
| MEDB_A2C | Médicaments pour dormir prescrits par un autre médecin | 790 |
| MEDB_A2D | Médicaments pour dormir prescrits par autre professionnel | 791 |
| MEDB_A3 | Jours où oublié/pris moins de médicaments pour dormir | 791 |
| MEDB_A4A | Raison pas/moins méd - A oublié | 792 |
| MEDB_A4B | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux | 792 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 19

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MEDB_A4C | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas | 793 |
| MEDB_A4D | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer | 793 |
| MEDB_A4E | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament | 794 |
| MEDB_A4F | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament | 794 |
| MEDB_A4G | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. | 795 |
| MEDB_A4H | Raison pas/moins méd - Effets secondaires | 795 |
| MEDB_A4I | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant | 796 |
| MEDB_A4J | Raison pas/moins méd - Autre raison | 796 |
| MEDB_B1 | Pilules pour maigrir sous supervision professionnelle | 797 |
| MEDB_B2A | Pilules pour maigrir prescrites par un psychiatre | 797 |
| MEDB_B2B | Pilules pour maigrir prescrites par méd. de famille/omni | 798 |
| MEDB_B2C | Pilules pour maigrir prescrites par un autre médecin | 798 |
| MEDB_B2D | Pilules pour maigrir prescrites par autre professionnel | 799 |
| MEDB_B3 | Jours où oublié/pris moins de pilules pour maigrir | 799 |
| MEDB_B4A | Raison pas/moins méd - A oublié | 800 |
| MEDB_B4B | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux | 800 |
| MEDB_B4C | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas | 801 |
| MEDB_B4D | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer | 801 |
| MEDB_B4E | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament | 802 |
| MEDB_B4F | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament | 802 |
| MEDB_B4G | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. | 803 |
| MEDB_B4H | Raison pas/moins méd - Effets secondaires | 803 |
| MEDB_B4I | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant | 804 |
| MEDB_B4J | Raison pas/moins méd - Autre raison | 804 |
| MEDB_C1 | Médicaments contre anxiété sous supervision professionnelle | 805 |
| MEDB_C2A | Médicaments contre anxiété prescrits par un psychiatre | 805 |
| MEDB_C2B | Médicaments contre anxiété prescrits par méd. famille/omni | 806 |
| MEDB_C2C | Médicaments contre anxiété prescrits par un autre médecin | 806 |
| MEDB_C2D | Médicaments contre anxiété prescrits par autre professionnel | 807 |
| MEDB_C3 | Jours où oublié/pris moins de médicaments contre anxiété | 807 |
| MEDB_C4A | Raison pas/moins méd - A oublié | 808 |
| MEDB_C4B | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux | 808 |
| MEDB_C4C | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas | 809 |
| MEDB_C4D | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer | 809 |
| MEDB_C4E | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament | 810 |
| MEDB_C4F | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament | 810 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 20

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MEDB_C4G | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. | 811 |
| MEDB_C4H | Raison pas/moins méd - Effets secondaires | 811 |
| MEDB_C4I | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant | 812 |
| MEDB_C4J | Raison pas/moins méd - Autre raison | 812 |
| MEDB_D1 | Régulateurs de l'humeur sous supervision professionnelle | 813 |
| MEDB_D2A | Régulateurs de l'humeur prescrits par un psychiatre | 813 |
| MEDB_D2B | Régulateurs de l'humeur prescrits par méd. de famille/omni | 814 |
| MEDB_D2C | Régulateurs de l'humeur prescrits par un autre médecin | 814 |
| MEDB_D2D | Régulateurs de l'humeur prescrits par autre professionnel | 815 |
| MEDB_D3 | Jours où oublié/pris moins de régulateurs de l'humeur | 815 |
| MEDB_D4A | Raison pas/moins méd - A oublié | 816 |
| MEDB_D4B | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux | 816 |
| MEDB_D4C | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas | 817 |
| MEDB_D4D | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer | 817 |
| MEDB_D4E | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament | 818 |
| MEDB_D4F | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament | 818 |
| MEDB_D4G | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. | 819 |
| MEDB_D4H | Raison pas/moins méd - Effets secondaires | 819 |
| MEDB_D4I | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant | 820 |
| MEDB_D4J | Raison pas/moins méd - Autre raison | 820 |
| MEDB_E1 | Antidépresseurs sous supervision professionnelle | 821 |
| MEDB_E2A | Antidépresseurs prescrits par un psychiatre | 821 |
| MEDB_E2B | Antidépresseurs prescrits par méd. de famille/omni | 822 |
| MEDB_E2C | Antidépresseurs prescrits par un autre médecin | 822 |
| MEDB_E2D | Antidépresseurs prescrits par autre professionnel | 823 |
| MEDB_E3 | Jours où oublié/pris moins de antidépresseurs | 823 |
| MEDB_E4A | Raison pas/moins méd - A oublié | 824 |
| MEDB_E4B | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux | 824 |
| MEDB_E4C | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas | 825 |
| MEDB_E4D | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer | 825 |
| MEDB_E4E | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament | 826 |
| MEDB_E4F | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament | 826 |
| MEDB_E4G | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. | 827 |
| MEDB_E4H | Raison pas/moins méd - Effets secondaires | 827 |
| MEDB_E4I | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant | 828 |
| MEDB_E4J | Raison pas/moins méd - Autre raison | 828 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 21

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MEDB_F1 | Méd. antipsychotique sous supervision professionnelle | 829 |
| MEDB_F2A | Méd. antipsychotiques prescrits par un psychiatre | 829 |
| MEDB_F2B | Méd. antipsychotiques prescrits par méd. de famille/omni | 830 |
| MEDB_F2C | Méd. antipsychotiques prescrits par un autre médecin | 830 |
| MEDB_F2D | Méd. antipsychotiques prescrits par autre professionnel | 831 |
| MEDB_F3 | Jours où oublié/pris moins de méd. antipsychotiques | 831 |
| MEDB_F4A | Raison pas/moins méd - A oublié | 832 |
| MEDB_F4B | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux | 832 |
| MEDB_F4C | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas | 833 |
| MEDB_F4D | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer | 833 |
| MEDB_F4E | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament | 834 |
| MEDB_F4F | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament | 834 |
| MEDB_F4G | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. | 835 |
| MEDB_F4H | Raison pas/moins méd - Effets secondaires | 835 |
| MEDB_F4I | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant | 836 |
| MEDB_F4J | Raison pas/moins méd - Autre raison | 836 |
| MEDB_G1 | Stimulants sous supervision professionnelle | 837 |
| MEDB_G2A | Stimulants prescrits par un psychiatre | 837 |
| MEDB_G2B | Stimulants prescrits par méd. de famille/omni | 838 |
| MEDB_G2C | Stimulants prescrits par un autre médecin | 838 |
| MEDB_G2D | Stimulants prescrits par autre professionnel | 839 |
| MEDB_G3 | Jours où oublié/pris moins de stimulants | 839 |
| MEDB_G4A | Raison pas/moins méd - A oublié | 840 |
| MEDB_G4B | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux | 840 |
| MEDB_G4C | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas | 841 |
| MEDB_G4D | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer | 841 |
| MEDB_G4E | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament | 842 |
| MEDB_G4F | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament | 842 |
| MEDB_G4G | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. | 842 |
| MEDB_G4H | Raison pas/moins méd - Effets secondaires | 843 |
| MEDB_G4I | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant | 843 |
| MEDB_G4J | Raison pas/moins méd - Autre raison | 844 |
| MEDBG03A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 845 |
| MEDBG03B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 847 |
| MEDBG03C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 849 |
| MEDBG03D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 851 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 22

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| MEDBG03E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 853 |
| MEDBG03F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 855 |
| MEDBG03G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 857 |
| MEDBG03H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 859 |
| MEDBG03I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 861 |
| MEDBG03J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 862 |
| MEDBG03K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 864 |
| MEDBG03L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 865 |
| MIA : Manie | | |
| MIAB_01 | Changements cognitifs/comportements périodes excitées | 210 |
| MIAB_03 | Épisode excité avec plus grand nombre de changements | 211 |
| MIAB_04 | Symptôme - irritable/grincheux durant épisode où excité | 216 |
| MIAB_05 | Changements cognitifs/comportements durant période irritable | 216 |
| MIAB_06 | Épisode irritable avec plus grand nombre de changements | 217 |
| MIAB_07A | Symptôme - devenu nerveux ou agité | 222 |
| MIAB_07B | Symptôme - devenu trop amical / trop familier avec les gens | 222 |
| MIAB_07C | Symptôme - agissait de manière inappropriée | 223 |
| MIAB_07D | Symptôme - avait plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude | 223 |
| MIAB_07E | Symptôme - essayait des choses impossibles à réaliser | 224 |
| MIAB_07F | Symptôme - parlait beaucoup plus que d'habitude | 224 |
| MIAB_07G | Symptôme - changeait constamment projets / activités | 225 |
| MIAB_07H | Symptôme - était facilement distrait | 225 |
| MIAB_07I | Symptôme - pensées passaient d'une chose à l'autre | 226 |
| MIAB_07J | Symptôme - dormait beaucoup moins qu'à l'hab. sans fatigue | 226 |
| MIAB_07K | Symptôme - impliqué dans projets insensés pour gagner \$ | 227 |
| MIAB_07L | Symptôme - dépensait plus d'argent que d'habitude | 227 |
| MIAB_07M | Symptôme - faisait des choses risquées pour le plaisir | 228 |
| MIAB_07N | Symptôme - avait une confiance en soi grandement exagérée | 228 |
| MIAB_07O | Symptôme - pensait être quelqu'un d'autre | 229 |
| MIAB_09 | Épisode de manie troublé travail/social/relations | 231 |
| MIAB_09A | Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot. | 231 |
| MIAB_09B | Gens se sont inquiétés des agissements du répondant | 232 |
| MIAB_10A | Épisode de manie dû à des causes physiques | 232 |
| MIAB_10B | Causes physiques ont toujours induit épisodes de manie | 233 |
| MIAB_18 | A remémoré l'âge exact du tout premier épisode de manie | 233 |
| MIAB_181 | Étape de vie quand tout premier épisode de manie a eu lieu | 235 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 23

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MIAB_18C | Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste | 236 |
| MIAB_19 | A eu un épisode de manie - 12 m. | 238 |
| MIAB_191 | A eu un seul épisode de manie - 12 m. | 238 |
| MIAB_19A | Période de référence de l'épisode de manie - 12 m. | 239 |
| MIAB_202 | Épisode d'une semaine + dû à expérience stress./improviste | 245 |
| MIAB_212 | Épisode de moins une semaine dû à exp. stress./improviste | 248 |
| MIAB_24 | Épisode unique de vie suite à expérience stress./improviste | 251 |
| MIAB_271 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. | 253 |
| MIAB_272 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. | 254 |
| MIAB_27A | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. | 252 |
| MIAB_27C | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. | 255 |
| MIAB_27D | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. | 256 |
| MIAB_29 | Nbre de jrs/365 incapable totalement dû à manie - 12 m. | 257 |
| MIAB_33 | A consulté médecin/autre prof. pour épisode manie | 257 |
| MIAB_45 | A reçu traitement qui a aidé pour épisode de manie | 259 |
| MIAB_47 | Reçu traitement professionnel pour épisode de manie - 12 m. | 262 |
| MIAB_48 | Hospitalisé pour une nuit ou plus épisode de manie - vie | 263 |
| MIABD277 | Critère D, partie 1A - Trouble occasionné - (D) | 268 |
| MIABDA | Critère A, partie 1 et 2 - (D) | 265 |
| MIABDA1 | Critère A, partie 1 - (D) | 264 |
| MIABDA2 | Critère A, partie 2 - (D) | 265 |
| MIABDB | Critère B - (Symptômes combinés1 à 7) - (D) | 268 |
| MIABDB1 | Critère B - symptôme 1 - (D) | 265 |
| MIABDB2 | Critère B - symptôme 2 - (D) | 266 |
| MIABDB3 | Critère B - symptôme 3 - (D) | 266 |
| MIABDB4 | Critère B - symptôme 4 - (D) | 266 |
| MIABDB5 | Critère B - symptôme 5 - (D) | 267 |
| MIABDB6 | Critère B - symptôme 6 - (D) | 267 |
| MIABDB7 | Critère B - symptôme 7 - (D) | 267 |
| MIABDBI | Critère B - irritable - (D) | 268 |
| MIABDD | Critère D - (D) | 270 |
| MIABDD1 | Critère D, partie 1 - (D) | 269 |
| MIABDD2 | Critère D, partie 2 - (D) | 269 |
| MIABDD3 | Critère D, partie 3 - (D) | 269 |
| MIABDEPS | Algorithme de manie - vie - (D) | 270 |
| MIABDEY | Algorithme de manie - 12 mois -(D) | 275 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 24

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| MIABDINT | Trouble occasionné par manie - moyenne - (D) | 275 |
| MIABDYA | Critère A - 12 mois - (D) | 274 |
| MIABDYB | Critère B - 12 mois - (D) | 274 |
| MIABDYC | Critère C - Trouble occasionné - (D) | 274 |
| MIABFINT | Indicateur : trouble occasionné par manie | 276 |
| MIABG03A | Âge lors épisode excité avec + de changements - (G) | 212 |
| MIABG03C | Âge - quand plus récent épisode excité est survenu | 214 |
| MIABG06A | Âge - lors épi. irritable/grincheux avec + changements - (G) | 218 |
| MIABG06C | Âge - quand plus récent épisode irritable est survenu - (G) | 220 |
| MIABG08 | Nombre d'épisodes où était excité / irritable - vie - (G) | 230 |
| MIABG18A | Âge - exact tout premier épisode de manie - (G) | 234 |
| MIABG18B | Âge - approximatif premier épisode de manie - (G) | 235 |
| MIABG18D | Durée du tout premier épisode de manie - (G) | 237 |
| MIABG19B | Nombre d'épisodes de manie - 12 m. - (G) | 240 |
| MIABG19C | Nombre de semaines eu épisode de manie - 12 m. - (G) | 241 |
| MIABG19D | Âge - dernière fois eu épisode de manie - (G) | 242 |
| MIABG20 | Nombre d'épisodes de manie d'une semaine ou plus - vie - (G) | 243 |
| MIABG201 | Nbre d'épisodes d'une semaine + dûs à exp. stressante - (G) | 244 |
| MIABG21 | Nombre d'épis. de manie de moins d'une semaine - vie - (G) | 246 |
| MIABG211 | Nbre d'épis. moins d'une semaine dûs à exp. stressante - (G) | 247 |
| MIABG22 | Durée du plus long épisode de manie - vie - (G) | 249 |
| MIABG23 | Nombre d'années distinctes où eu au moins un épisode - (G) | 250 |
| MIABG33A | Âge - première fois consulté prof. au sujet épis manie - (G) | 258 |
| MIABG3B | Durée épisode le plus excité - (G) | 213 |
| MIABG3D | Durée du plus récent épisode où excité - (G) | 215 |
| MIABG45A | Âge - 1ère fois traitement qui a aidé pour épis. manie - (G) | 260 |
| MIABG45B | Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G) | 261 |
| MIABG45C | Nbre total prof. consulté au sujet épisode manie - vie - (G) | 262 |
| MIABG481 | Nombre de proches parents - déjà eu épisodes de manie - (G) | 264 |
| MIABG48A | Âge - première fois été hospitalisé pour épisode manie - (G) | 263 |
| MIABG6B | Durée épisode irritable avec + de changements - (G) | 219 |
| MIABG6D | Durée du plus récent épisode où irritable - (G) | 221 |
| MIABGON | Âge à l'apparition de l'épisode de la manie - (D,G) | 271 |
| MIABGPER | La plus longue période relative à la manie - (G, D) | 273 |
| MIABGREC | Âge au plus récent épisode de manie - (D,G) | 272 |

PAC : Activités physiques

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 25

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PACB_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 43 |
| PACB_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur | 43 |
| PACB_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 44 |
| PACB_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 44 |
| PACB_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale | 45 |
| PACB_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 45 |
| PACB_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 46 |
| PACB_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 46 |
| PACB_1I | Activité / 3 derniers mois - patin roues alignées | 47 |
| PACB_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 47 |
| PACB_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 48 |
| PACB_1L | Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie | 48 |
| PACB_1M | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige | 49 |
| PACB_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 49 |
| PACB_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 50 |
| PACB_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 50 |
| PACB_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 51 |
| PACB_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 51 |
| PACB_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 52 |
| PACB_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball | 52 |
| PACB_1U | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | 53 |
| PACB_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité | 53 |
| PACB_1W | Activité / 3 derniers mois - autre (#2) | 54 |
| PACB_1X | Activité / 3 derniers mois - autre (#3) | 54 |
| PACB_2A | Nombre de fois participé - marche pour l'exercice | 55 |
| PACB_2B | Nombre de fois participé - jardinage | 56 |
| PACB_2C | Nombre de fois participé - natation | 57 |
| PACB_2D | Nombre de fois participé - bicyclette | 58 |
| PACB_2E | Nombre de fois participé - danse moderne / sociale | 59 |
| PACB_2F | Nombre de fois participé - exercices à la maison | 60 |
| PACB_2G | Nombre de fois participé - hockey sur glace | 61 |
| PACB_2H | Nombre de fois participé - patinage sur glace | 62 |
| PACB_2I | Nombre de fois participé - patin à roues alignées | 63 |
| PACB_2J | Nombre de fois participé - jogging / course | 64 |
| PACB_2K | Nombre de fois participé - golf | 65 |
| PACB_2L | Nombre de fois participé - classe d'exercices / aérobie | 66 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 26

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PACB_2M | Nombre de fois participé - ski alpin ou planche à neige | 67 |
| PACB_2N | Nombre de fois participé - quilles | 68 |
| PACB_2O | Nombre de fois participé - baseball / balle molle | 69 |
| PACB_2P | Nombre de fois participé - tennis | 70 |
| PACB_2Q | Nombre de fois participé - poids et haltères | 71 |
| PACB_2R | Nombre de fois participé - pêche | 72 |
| PACB_2S | Nombre de fois participé - volleyball | 73 |
| PACB_2T | Nombre de fois participé - basketball | 74 |
| PACB_2U | Nombre de fois participé - autre activité (#1) | 75 |
| PACB_2W | Nombre de fois participé - autre activité (#2) | 76 |
| PACB_2X | Nombre de fois participé - autre activité (#3) | 77 |
| PACB_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 55 |
| PACB_3B | Temps consacré - jardinage | 56 |
| PACB_3C | Temps consacré - natation | 57 |
| PACB_3D | Temps consacré - bicyclette | 58 |
| PACB_3E | Temps consacré - danse moderne / sociale | 59 |
| PACB_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 60 |
| PACB_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 61 |
| PACB_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 62 |
| PACB_3I | Temps consacré - patins à roues alignées | 63 |
| PACB_3J | Temps consacré - jogging / course | 64 |
| PACB_3K | Temps consacré - golf | 65 |
| PACB_3L | Temps consacré - classe d'exercices / aérobie | 66 |
| PACB_3M | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige | 67 |
| PACB_3N | Temps consacré - quilles | 68 |
| PACB_3O | Temps consacré - baseball / balle molle | 69 |
| PACB_3P | Temps consacré - tennis | 70 |
| PACB_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 71 |
| PACB_3R | Temps consacré - pêche | 72 |
| PACB_3S | Temps consacré - volleyball | 73 |
| PACB_3T | Temps consacré - basketball | 74 |
| PACB_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 75 |
| PACB_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 76 |
| PACB_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 77 |
| PACB_4A | Nbre d'heures de marche - se rendre au travail / à l'école | 78 |
| PACB_4B | Nbre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/à l'école | 78 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 27

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|------------------------------|--|------|
| PACB_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 79 |
| PACBDEE | Dépense d'énergie - (D) | 79 |
| PACBDFM | Fréquence mensuelle - activité phys. durant > 15 min.- (D) | 80 |
| PACBDFR | Fréquence de toutes activités physiques - (D) | 81 |
| PACBDPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 82 |
| PACBFD | Participation à des activités physiques - > 15 minutes | 81 |
| PACBFLEI | Participation à des activités de loisirs | 80 |
| PAD : Trouble panique | | |
| PADB_01A | Symptôme - coeur battait fort / trop vite | 276 |
| PADB_01B | Symptôme - avait le souffle court | 277 |
| PADB_01C | Symptôme - avait des nausées / mal à l'estomac | 277 |
| PADB_01D | Symptôme - avait des vertiges / étourdissements | 278 |
| PADB_01E | Symptôme - avait des sueurs | 278 |
| PADB_01F | Symptôme - avait des frémissements / tremblements | 279 |
| PADB_01G | Symptôme - avait la bouche sèche | 279 |
| PADB_01H | Symptôme - avait l'impression d'étouffer | 280 |
| PADB_01I | Symptôme - avait la douleur / malaise à la poitrine | 280 |
| PADB_01J | Symptôme - avait peur de perdre le contrôle / devenir fou | 281 |
| PADB_01K | Symptôme - avait l'impression de ne pas vraiment être là | 281 |
| PADB_01L | Symptôme - avait impression que choses n'étaient pas réelles | 282 |
| PADB_01M | Symptôme - avait peur de s'évanouir | 282 |
| PADB_01N | Symptôme - avait peur de mourir | 283 |
| PADB_01O | Symptôme - avait des bouffées de chaleur / frissons | 283 |
| PADB_01P | Symptôme - avait été engourdi / a eu des picotements | 284 |
| PADB_03 | Problèmes débutés subitement/atteint + fort niveau <= 10 min | 284 |
| PADB_06 | Unique attaque de panique au cours des 12 derniers mois | 285 |
| PADB_07 | A remémoré l'âge exact de l'unique attaque de panique | 286 |
| PADB_071 | Étape de vie quand unique attaque de panique a eu lieu | 289 |
| PADB_08 | Type de situations décrivant comment attaque est survenue | 289 |
| PADB_09 | A remémoré l'âge exact de la première attaque de panique | 290 |
| PADB_091 | Étape de vie quand toute première attaque a eu lieu | 293 |
| PADB_10 | A eu attaque de panique - 12 m. | 293 |
| PADB_10A | Période de référence de l'attaque de panique - 12 m. | 294 |
| PADB_10B | Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m. | 294 |
| PADB_13A | Un mois ou plus - craint d'avoir une autre attaque | 298 |
| PADB_13B | Un mois ou plus - craint que qqc de terrible puisse arriver | 299 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 28

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PADB_13C | Un mois ou plus - changé activités quotidiennes | 299 |
| PADB_13D | Un mois ou plus - évité situations par peur d'avoir attaque | 300 |
| PADB_16 | Eu 1 mois de crainte / changement dans les activités - 12 m. | 302 |
| PADB_16A | Période de référence du mois de perturbation - 12 m. | 302 |
| PADB_16B | Nombre de mois de crainte/changement d'activité - 12 m. | 303 |
| PADB_16C | Fréquence - préoccupation d'avoir une autre attaque - 12 m. | 303 |
| PADB_16D | Sévérité de la crainte d'avoir une autre attaque - 12 m. | 304 |
| PADB_17 | Eu attaque inattendue - vie | 306 |
| PADB_21A | Étape de vie quand attaque inattendue est survenue | 310 |
| PADB_22 | Attaque inattendue troublé travail/social/relations | 310 |
| PADB_24 | Attaque inattendue a eu lieu durant sommeil - vie | 311 |
| PADB_25A | Attaques de panique dûes à des causes physiques | 312 |
| PADB_25B | Causes physiques ont toujours induit attaques de panique | 312 |
| PADB_37B | Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m. | 314 |
| PADB_38 | Période de référence de la plus récente attaque - 12 m. | 315 |
| PADB_40 | Intensité de détresse émotionnelle durant attaque - 12 m. | 315 |
| PADB_41 | Bouleversé par sensation physique rappelant attaque - 12 m. | 316 |
| PADB_41A | Niveau de dérangement dû aux sensations physiques - 12 m. | 316 |
| PADB_42 | Fréquence - évité situations causant sensations - 12 m. | 317 |
| PADB_43 | Évitement troublé travail/sociale/relations | 317 |
| PADB_441 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. | 319 |
| PADB_442 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. | 320 |
| PADB_44A | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. | 318 |
| PADB_44C | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. | 321 |
| PADB_44D | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. | 322 |
| PADB_46 | Nbre de jours/365 incapable totalement dû aux attaques | 323 |
| PADB_50 | A consulté médecin/autre prof. pour attaques | 323 |
| PADB_62 | A reçu traitement qui a aidé pour attaques | 325 |
| PADB_64 | Reçu traitements professionnel pour attaques - 12 m. | 328 |
| PADB_65 | Hospitalisé pour une nuit ou plus pour attaques - vie | 329 |
| PADBD A | Attaque de panique - Critère A - (D) | 331 |
| PADBDATT | Algorithme attaque de panique - vie (D) | 337 |
| PADBDATY | Algorithme attaque de panique - 12 mois - (D) | 343 |
| PADBD B | Attaque de panique - Critère B - (D) | 336 |
| PADBD B01 | Critère B - symptôme 1 - (D) | 332 |
| PADBD B02 | Critère B - symptôme 2 - (D) | 332 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 29

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PADBDB03 | Critère B - symptôme 3 - (D) | 332 |
| PADBDB04 | Critère B - symptôme 4 - (D) | 333 |
| PADBDB05 | Critère B - symptôme 5 - (D) | 333 |
| PADBDB06 | Critère B - symptôme 6 - (D) | 333 |
| PADBDB07 | Critère B - symptôme 7 - (D) | 334 |
| PADBDB08 | Critère B - symptôme 8 - (D) | 334 |
| PADBDB09 | Critère B - symptôme 9 - (D) | 334 |
| PADBDB10 | Critère B - symptôme 10 - (D) | 335 |
| PADBDB11 | Critère B - symptôme 11 - (D) | 335 |
| PADBDB12 | Critère B - symptôme 12 - (D) | 335 |
| PADBDB13 | Critère B - symptôme 13 - (D) | 336 |
| PADBDB14 | Critère B - symptôme 14 - (D) | 336 |
| PADBDC | Attaque de panique - Critère C - (D) | 337 |
| PADBDDA | Trouble panique - Critère A, partie 1 et 2 - (D) | 339 |
| PADBDDA1 | Trouble panique - Critère A, partie 1 - (D) | 337 |
| PADBDDA2 | Trouble panique - Critère A, partie 2 - (D) | 339 |
| PADBDDAA | Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 1 - (D) | 338 |
| PADBDDAB | Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 2 - (D) | 338 |
| PADBDDAC | Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 3 - (D) | 338 |
| PADBDDY | Algorithme trouble panique - 12 m. - (D) | 345 |
| PABDINT | Trouble occasionné par trouble de panique - moyenne - (D) | 345 |
| PABDPDS | Algorithme trouble panique - vie - (D) | 339 |
| PABDYA | Trouble panique - Critère A - 12 m. - (D) | 344 |
| PABDYB | Trouble panique - Critère B - 12 m. - (D) | 344 |
| PABDYC | Trouble panique - Critère C - 12 m. - (D) | 344 |
| PABFINT | Indicateur : trouble occasionné par trouble de panique | 346 |
| PABG04 | Nombre d'attaques soudaines - vie - (G) | 285 |
| PABG07A | Âge - exact quand unique attaque panique est survenue - (G) | 287 |
| PABG07B | Âge - approx. quand unique attaque panique est survenu - (G) | 288 |
| PABG09A | Âge - exact toute première attaque panique est survenue - (G) | 291 |
| PABG09B | Âge - approx. quand toute première attaque est survenue - (G) | 292 |
| PABG10C | Nombre total d'attaques - 12 m. - (G) | 295 |
| PABG10D | Âge - dernière fois eu attaque de panique - (G) | 296 |
| PABG11 | Plus grand nbre d'attaques durant une même année - vie - (G) | 297 |
| PABG12 | Nbre d'années distinctes eu au moins une attaque - vie - (G) | 298 |
| PABG15 | Âge - 1ère fois eu 1 mois où avait crainte / a évité - (G) | 301 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 30

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------------|--|------|
| PADBG16E | Âge - approx. dern. fois 1 m. de crainte avoir attaque - (G) | 305 |
| PADBG17A | Nombre d'attaques inattendues - vie - (G) | 306 |
| PADBG18 | Nombre d'attaques « pas réellement en danger » - vie - (G) | 307 |
| PADBG19 | Nombre d'attaques « danger réel » - vie - (G) | 308 |
| PADBG21 | Âge - 1ère fois eu attaque inattendue - (G) | 309 |
| PADBG24A | Nombre d'attaques inattendues survenus durant sommeil - vie | 311 |
| PADBG36 | Nombre d'attaques inattendues - 12 m. - (G) | 313 |
| PADBG37A | Âge - dernière fois eu attaque inattendue - (G) | 314 |
| PADBG50A | Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet d'attaques - (G) | 324 |
| PADBG62A | Âge - 1ère fois reçu trait. qui a aidé pour attaques - (G) | 326 |
| PADBG62B | Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G) | 327 |
| PADBG62C | Nbre total prof consulté au sujet des attaques - vie - (G) | 328 |
| PADBG651 | Nombre de proches parents avec attaques - (G) | 331 |
| PADBG65A | Âge - première fois hospitalisé une nuit pour attaques - (G) | 330 |
| PADBGON | Âge à l'apparition du trouble de la panique - (D,G) | 341 |
| PADBGONA | Âge du premier attaque de panique - (D,G) | 340 |
| PADBGPER | Nbre d'années de persévérance du trouble de panique - (D,G) | 343 |
| PADBGREC | Âge à la plus récente attaque de panique - (D,G) | 342 |
| PWB : Échelle de bien-être | | |
| PWBB_01 | Fréquence - se sentait en confiance - mois passé | 82 |
| PWBB_02 | Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois passé | 83 |
| PWBB_03 | Fréquence - entrepris plein de choses - mois passé | 83 |
| PWBB_04 | Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois passé | 84 |
| PWBB_05 | Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois passé | 84 |
| PWBB_06 | Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois passé | 85 |
| PWBB_07 | Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois passé | 85 |
| PWBB_08 | Fréquence - se sentait utile - mois passé | 86 |
| PWBB_09 | Fréquence - souriait facilement - mois passé | 86 |
| PWBB_10 | Fréquence - était égal à soi-même - mois passé | 87 |
| PWBB_11 | Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois passé | 87 |
| PWBB_12 | Fréquence - était intéressé et curieux - mois passé | 88 |
| PWBB_13 | Fréquence - faisait la part des choses - mois passé | 88 |
| PWBB_14 | Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé | 89 |
| PWBB_15 | Fréquence - vie bien équilibrée - mois passé | 89 |
| PWBB_16 | Fréquence - était plutôt calme et posé - mois passé | 90 |
| PWBB_17 | Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois passé | 90 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 31

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------------------|--|------|
| PWBB_18 | Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois passé | 91 |
| PWBB_19 | Fréquence - vivait avec modération - mois passé | 91 |
| PWBB_20 | Fréquence - impression de jouir de la vie - mois passé | 92 |
| PWBB_21 | Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé | 92 |
| PWBB_22 | Fréquence - était en paix avec soi-même - mois passé | 93 |
| PWBB_23 | Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois passé | 93 |
| PWBB_24 | Fréquence - affronter situations positivement - mois passé | 94 |
| PWBB_25 | Fréquence - avait bon moral - mois passé | 94 |
| PWBBDPWB | Échelle de bien-être psychologique - mois passé - (D) | 95 |
| RAC : Limitation des activités | | |
| RACB_1 | A de la difficulté à faire des activités | 585 |
| RACB_2A | Réduit genre/quantité d'activités - maison | 586 |
| RACB_2B1 | Réduit genre/quantité d'activités - à l'école | 586 |
| RACB_2B2 | Réduit genre/quantité d'activités - au travail | 587 |
| RACB_2C | Réduit genre/quantité d'activités - autres activités | 587 |
| RACB_5A1 | Gêne à cause de l'état ou problème de santé - vie | 588 |
| RACB_5A2 | Gêne à cause de l'état ou problème de santé - 12 m. | 589 |
| RACB_5B1 | Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie | 589 |
| RACB_5B2 | Discrimination à cause de l'état / problème de santé - 12 m. | 590 |
| RACB_6A | A besoin de l'aide - pour préparer les repas | 590 |
| RACB_6B1 | A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions | 591 |
| RACB_6C | A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères | 591 |
| RACB_6D | A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien | 592 |
| RACB_6E | A besoin de l'aide - pour les soins personnels | 592 |
| RACB_6F | A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison | 593 |
| RACB_6G | A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles | 593 |
| RACB_7A | Difficulté - à faire des nouveaux amis | 594 |
| RACB_7B | Difficulté - à échanger avec gens inconnus | 594 |
| RACB_7C | Difficulté - à commencer/entretenir une conversation | 595 |
| RACB_8A | Cause des difficultés - santé physique | 595 |
| RACB_8B | Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale | 596 |
| RACB_8C | Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues | 596 |
| RACB_8D | Cause des difficultés - autre raison | 597 |
| RACBDIMP | Répercussion des problèmes de santé - (D) | 597 |
| RACBDPAL | Participation et activité limitée - (D) | 598 |
| RACBF6R | Indicateur : besoin d'aide pour de multiples tâches | 598 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 32

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|------|
| RACBF7 | Indicateur : difficulté avec les situations sociales | 599 |
| RACBG5 | Cause du problème de santé - (G) | 588 |
| SCR : Questions filtres pour les troubles mentaux | | |
| SCRB_01 | Satisfaction face à la vie en général | 11 |
| SCRB_081 | Évaluation personnelle de la santé physique | 11 |
| SCRB_082 | Évaluation personnelle de la santé mentale | 12 |
| SCRB_20 | Filtre : a eu peur ou eu attaque de panique - vie | 12 |
| SCRB_20A | Filtre : a eu attaque lorsque subitement mal à l'aise - vie | 13 |
| SCRB_21 | Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie | 13 |
| SCRB_22 | Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie | 14 |
| SCRB_23 | Filtre : perdu intérêt dans les choses plusieurs jours - vie | 14 |
| SCRB_24 | Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours -vie | 15 |
| SCRB_25 | Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie | 15 |
| SCRB_25A | Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie | 16 |
| SCRB_26 | Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie | 16 |
| SCRB_26A | Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie | 17 |
| SCRB_26B | Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie | 17 |
| SCRB_29 | Filtre : eu peur intense ou été vraiment gêné avec gens -vie | 18 |
| SCRB_291 | Filtre : très bouleversé/nerveux dans situation sociale -vie | 19 |
| SCRB_292 | Filtre : tenu loin de situations sociales - vie | 19 |
| SCRB_293 | Filtre : peur sociale plus grande qu'aurait dû l'être - vie | 20 |
| SCRB_29A | Filtre : eu peur intense/mal à l'aise devant un groupe - vie | 18 |
| SCRB_30 | Filtre : très mal à l'aise/peur d'être dans foule, etc - vie | 20 |
| SCRB_301 | Filtre : devenu très bouleversé/nerveux ds foules/etc. - vie | 21 |
| SCRB_302 | Filtre : tenu loin des situations quand pouvait faire - vie | 21 |
| SCRB_303 | Filtre : peur plus grande qu'elle n'aurait dû l'être - vie | 22 |
| SCRBDMEN | Auto-évaluation la santé mentale - (D) | 23 |
| SCRBDPHY | Auto-évaluation de la santé physique - (D) | 23 |
| SCRBDSAT | Satisfaction face à la vie - (D) | 22 |
| SCRBFAGP | Indicateur : répondant filtré dans module d'agoraphobie | 25 |
| SCRBFDEP | Indicateur : répondant filtré dans le module de dépression | 24 |
| SCRBFGAD | Indicateur : répondant filtré dans le module de TAG | 25 |
| SCRBFMIA | Indicateur : répondant filtré dans le module de manie | 24 |
| SCRBFPAD | Indicateur : répondant filtré dans le module trouble panique | 24 |
| SCRBFSOP | Indicateur : répondant filtré dans le module phobie sociale | 25 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 33

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|------|
| SDC : Renseignements socio-démographiques | | |
| SDCB_8 | Fréquente actuellement une école, collègue ou université | 895 |
| SDCB_9 | Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel | 896 |
| SDCBFIMM | Statut d'immigrant | 897 |
| SDCBGCBG | Pays de naissance - (G) | 896 |
| SDCBGLNG | Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D,G) | 898 |
| SDCBGRES | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G) | 897 |
| SER : Utilisation des services de santé mentale | | |
| SERB_02 | Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - vie | 615 |
| SERB_05A | Période de référence pour l'unique hospitalisation de la vie | 616 |
| SERB_08 | Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m. | 619 |
| SERB_10A | Consulté prof. - psychiatre | 621 |
| SERB_10B | Consulté prof. - médecin de famille ou omnipraticien | 622 |
| SERB_10C | Consulté prof. - autre médecin | 622 |
| SERB_10D | Consulté prof. - psychologue | 623 |
| SERB_10E | Consulté prof. - infirmière (infirmier) | 623 |
| SERB_10F | Consulté prof. - travailleur social/conseiller/etc | 624 |
| SERB_10G | Consulté prof. - conseiller religieux/spirituel | 624 |
| SERB_10H | Consulté prof. - autre professionnel | 625 |
| SERB_10I | Consulté prof. - aucun | 625 |
| SERB_12 | A eu session de 15 minutes ou plus de thérapie/counselling | 626 |
| SERB_21 | Dernière fois consulté psychiatre | 629 |
| SERB_24A | Consulté psychiatre - hospitalisé pendant nuit ou plus | 631 |
| SERB_24B | Consulté psychiatre - bureau du professionnel de la santé | 632 |
| SERB_24C | Consulté psychiatre - salle d'urgence d'un hôpital | 632 |
| SERB_24L | Consulté psychiatre - à la maison | 634 |
| SERB_24M | Consulté psychiatre - consultation téléphonique uniquement | 634 |
| SERB_24N | Consulté psychiatre - église ou autre lieu religieux | 635 |
| SERB_25 | Psychiatre - satisfaction avec traitements/services | 636 |
| SERB_26 | Psychiatre - perception du niveau d'aide reçu du prof. | 636 |
| SERB_27 | Psychiatre - arrêté de consulter ce professionnel | 637 |
| SERB_28A | Raison d'arrêt - se sentait mieux | 637 |
| SERB_28B | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé | 638 |
| SERB_28C | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas | 638 |
| SERB_28D | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide | 639 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 34

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SERB_28E | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer | 639 |
| SERB_28F | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. | 640 |
| SERB_28G | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. | 640 |
| SERB_28H | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant | 641 |
| SERB_28I | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible | 641 |
| SERB_28J | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. | 642 |
| SERB_28K | Raison d'arrêt - autre raison | 642 |
| SERB_29 | Psychiatre - recommandé autre professionnel | 643 |
| SERB_31 | Dernière fois consulté médecin de famille | 645 |
| SERB_34A | Consulté méd. famille - hospitalisé pendant nuit ou plus | 647 |
| SERB_34B | Consulté méd. famille - bureau du professionnel de la santé | 648 |
| SERB_34C | Consulté méd. famille - salle d'urgence d'un hôpital | 648 |
| SERB_34L | Consulté méd. famille - à la maison | 650 |
| SERB_34M | Consulté méd. famille - consultation téléphonique uniquement | 650 |
| SERB_34N | Consulté méd. famille - église ou autre lieu religieux | 651 |
| SERB_35 | Méd. de famille - satisfaction avec traitements/services | 652 |
| SERB_36 | Méd. de famille - perception du niveau d'aide reçu du prof. | 652 |
| SERB_37 | Médecin de famille - arrêté de consulter ce professionnel | 653 |
| SERB_38A | Raison d'arrêt - se sentait mieux | 653 |
| SERB_38B | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé | 654 |
| SERB_38C | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas | 654 |
| SERB_38D | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide | 655 |
| SERB_38E | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer | 655 |
| SERB_38F | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. | 656 |
| SERB_38G | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. | 656 |
| SERB_38H | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant | 657 |
| SERB_38I | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible | 657 |
| SERB_38J | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. | 658 |
| SERB_38K | Raison d'arrêt - autre raison | 658 |
| SERB_39 | Médecin de famille - recommandé autre professionnel | 659 |
| SERB_40A | Autre médecin - cardiologue | 659 |
| SERB_40B | Autre médecin - gynécologue | 660 |
| SERB_40C | Autre médecin - urologue | 660 |
| SERB_40D | Autre médecin - allergologue | 661 |
| SERB_40E | Autre médecin - autre | 661 |
| SERB_41 | Autre médecin consulté le plus souvent - 12 m. | 662 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 35

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SERB_44A | Consulté autre médecin - hospitalisé pendant nuit ou plus | 664 |
| SERB_44B | Consulté autre médecin - bureau du professionnel de la santé | 665 |
| SERB_44C | Consulté autre médecin - salle d'urgence d'un hôpital | 665 |
| SERB_44L | Consulté autre médecin - à la maison | 667 |
| SERB_44M | Consulté autre méd. - consultation téléphonique uniquement | 667 |
| SERB_44N | Consulté autre médecin - église ou autre lieu religieux | 668 |
| SERB_45 | Autre médecin - satisfaction avec traitements/services | 669 |
| SERB_46 | Autre médecin - perception du niveau d'aide reçu du prof. | 669 |
| SERB_47 | Autre médecin - arrêté de consulter ce professionnel | 670 |
| SERB_48A | Raison d'arrêt - se sentait mieux | 670 |
| SERB_48B | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé | 671 |
| SERB_48C | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas | 671 |
| SERB_48D | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide | 672 |
| SERB_48E | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer | 672 |
| SERB_48F | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. | 673 |
| SERB_48G | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. | 673 |
| SERB_48H | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant | 674 |
| SERB_48I | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible | 674 |
| SERB_48J | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. | 675 |
| SERB_48K | Raison d'arrêt - autre raison | 675 |
| SERB_49 | Autre médecin - recommandé autre professionnel | 676 |
| SERB_51 | Dernière fois consulté psychologue | 678 |
| SERB_54A | Consulté psychologue - hospitalisé pendant nuit ou plus | 680 |
| SERB_54B | Consulté psychologue - bureau du professionnel de la santé | 681 |
| SERB_54C | Consulté psychologue - salle d'urgence d'un hôpital | 681 |
| SERB_54L | Consulté psychologue - à la maison | 683 |
| SERB_54M | Consulté psychologue - consultation téléphonique uniquement | 683 |
| SERB_54N | Consulté psychologue - église ou autre lieu religieux | 684 |
| SERB_55 | Psychologue - satisfaction avec traitements/services - 12 m. | 685 |
| SERB_56 | Psychologue - perception du niveau d'aide reçu du prof. | 685 |
| SERB_57 | Psychologue - arrêté de consulter ce professionnel | 686 |
| SERB_58A | Raison d'arrêt - se sentait mieux | 686 |
| SERB_58B | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé | 687 |
| SERB_58C | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas | 687 |
| SERB_58D | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide | 688 |
| SERB_58E | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer | 688 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 36

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SERB_58F | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. | 689 |
| SERB_58G | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. | 689 |
| SERB_58H | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant | 690 |
| SERB_58I | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible | 690 |
| SERB_58J | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. | 691 |
| SERB_58K | Raison d'arrêt - autre raison | 691 |
| SERB_59 | Assurance couvre tout/partiellement les coûts du psychologue | 692 |
| SERB_59A | Psychologue - recommandé autre professionnel | 692 |
| SERB_61 | Dernière fois consulté infirmière | 694 |
| SERB_64A | Consulté infirmière - hospitalisé pendant nuit ou plus | 696 |
| SERB_64B | Consulté infirmière - bureau du professionnel de la santé | 697 |
| SERB_64C | Consulté infirmière - salle d'urgence d'un hôpital | 697 |
| SERB_64L | Consulté infirmière - à la maison | 699 |
| SERB_64M | Consulté infirmière - consultation téléphonique uniquement | 699 |
| SERB_64N | Consulté infirmière - église ou autre lieu religieux | 700 |
| SERB_65 | Infirmière - satisfaction avec traitements/services - 12 m. | 701 |
| SERB_66 | Infirmière - perception du niveau d'aide reçu du prof. | 701 |
| SERB_67 | Infirmière - arrêté de consulter ce professionnel | 702 |
| SERB_68A | Raison d'arrêt - se sentait mieux | 702 |
| SERB_68B | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé | 703 |
| SERB_68C | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas | 703 |
| SERB_68D | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide | 704 |
| SERB_68E | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer | 704 |
| SERB_68F | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. | 705 |
| SERB_68G | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. | 705 |
| SERB_68H | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant | 706 |
| SERB_68I | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible | 706 |
| SERB_68J | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. | 707 |
| SERB_68K | Raison d'arrêt - autre raison | 707 |
| SERB_69 | Assurance couvre tout/partiellement les coûts infirmière | 708 |
| SERB_69A | Infirmière - recommandé autre professionnel | 708 |
| SERB_71 | Dernière fois consulté travailleur social | 710 |
| SERB_74A | Consulté trav. social - hospitalisé pendant nuit ou plus | 712 |
| SERB_74B | Consulté trav. social - bureau du professionnel de la santé | 713 |
| SERB_74C | Consulté trav. social - salle d'urgence d'un hôpital | 713 |
| SERB_74L | Consulté trav. social - à la maison | 715 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 37

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SERB_74M | Consulté trav. social - consultation téléphonique uniquement | 715 |
| SERB_74N | Consulté trav. social - église ou autre lieu religieux | 716 |
| SERB_75 | Travailleur social - satisfaction avec traitements/services | 717 |
| SERB_76 | Trav. social - perception du niveau d'aide reçu du prof. | 717 |
| SERB_77 | Travailleur social - arrêté de consulter ce professionnel | 718 |
| SERB_78A | Raison d'arrêt - se sentait mieux | 718 |
| SERB_78B | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé | 719 |
| SERB_78C | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas | 719 |
| SERB_78D | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide | 720 |
| SERB_78E | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer | 720 |
| SERB_78F | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. | 721 |
| SERB_78G | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. | 721 |
| SERB_78H | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant | 722 |
| SERB_78I | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible | 722 |
| SERB_78J | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. | 723 |
| SERB_78K | Raison d'arrêt - autre raison | 723 |
| SERB_79 | Assurance couvre tout/partiellement les coûts trav. social | 724 |
| SERB_79A | Travailleur social - recommandé autre professionnel | 724 |
| SERB_81 | Dernière fois consulté conseiller religieux | 726 |
| SERB_84A | Consulté conseiller relig - hospitalisé pendant nuit ou plus | 728 |
| SERB_84B | Consulté conseiller religieux - bureau du prof. de la santé | 729 |
| SERB_84C | Consulté conseiller religieux - salle d'urgence d'un hôpital | 729 |
| SERB_84L | Consulté conseiller religieux - à la maison | 731 |
| SERB_84M | Consulté cons relig - consultation téléphonique uniquement | 731 |
| SERB_84N | Consulté cons relig - église ou autre lieu religieux | 732 |
| SERB_85 | Conseiller relig - satisfaction avec traitements/services | 733 |
| SERB_86 | Cons religieux - perception du niveau d'aide reçu du prof. | 733 |
| SERB_87 | Conseiller religieux - arrêté de consulter ce professionnel | 734 |
| SERB_88A | Raison d'arrêt - se sentait mieux | 734 |
| SERB_88B | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé | 735 |
| SERB_88C | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas | 735 |
| SERB_88D | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide | 736 |
| SERB_88E | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer | 736 |
| SERB_88F | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. | 737 |
| SERB_88G | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. | 737 |
| SERB_88H | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant | 738 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 38

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SERB_88I | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible | 738 |
| SERB_88J | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. | 739 |
| SERB_88K | Raison d'arrêt - autre raison | 739 |
| SERB_89 | Conseiller religieux - recommandé autre professionnel | 740 |
| SERB_90A | Autre professionnel - acuponcteur | 740 |
| SERB_90B | Autre professionnel - instructeur de biofeedback | 741 |
| SERB_90C | Autre professionnel - chiropraticien | 741 |
| SERB_90D | Autre professionnel - spécialiste de l'équilibre énergétique | 742 |
| SERB_90E | Autre professionnel - thérapeute du mouvement/l'exercice | 742 |
| SERB_90F | Autre professionnel - herboriste | 743 |
| SERB_90G | Autre professionnel - homéopathe ou naturopathe | 743 |
| SERB_90H | Autre professionnel - hypnotiseur | 744 |
| SERB_90I | Autre professionnel - spécialiste en imagerie | 744 |
| SERB_90J | Autre professionnel - masso-thérapeute | 745 |
| SERB_90K | Autre professionnel - relaxation, yoga ou méditation | 745 |
| SERB_90L | Autre professionnel - diététicien | 746 |
| SERB_90M | Autre professionnel - autre | 746 |
| SERB_91 | Autre professionnel consulté le plus souvent - 12 m. | 747 |
| SERB_94A | Consulté autre prof. - hospitalisé pendant nuit ou plus | 749 |
| SERB_94B | Consulté autre prof. - bureau du professionnel de la santé | 750 |
| SERB_94C | Consulté autre prof. - salle d'urgence d'un hôpital | 750 |
| SERB_94L | Consulté autre prof. - à la maison | 752 |
| SERB_94M | Consulté autre prof. - consultation téléphonique uniquement | 752 |
| SERB_94N | Consulté autre prof. - église ou autre lieu religieux | 753 |
| SERB_95 | Autre prof. - satisfaction avec traitements/services - 12 m. | 754 |
| SERB_96 | Autre prof. - perception du niveau d'aide reçu du prof. | 754 |
| SERB_97 | Autre prof. - arrêté de consulter ce professionnel | 755 |
| SERB_98A | Raison d'arrêt - se sentait mieux | 755 |
| SERB_98B | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé | 756 |
| SERB_98C | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas | 756 |
| SERB_98D | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide | 757 |
| SERB_98E | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer | 757 |
| SERB_98F | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. | 758 |
| SERB_98G | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. | 758 |
| SERB_98H | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant | 759 |
| SERB_98I | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible | 759 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 39

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SERB_98J | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. | 760 |
| SERB_98K | Raison d'arrêt - autre raison | 760 |
| SERB_98L | Raison d'arrêt - aucune | 761 |
| SERB_99 | Assurance couvre tout/partiellement les coûts de autre prof. | 761 |
| SERB_99A | Autre professionnel - recommandé autre professionnel | 762 |
| SERB_A0A | Utilisé groupe de soutien/discussion sur internet - vie | 762 |
| SERB_A0B | Dernière fois utilisé groupe de soutien/discussion internet | 763 |
| SERB_A1A | Groupe d'entraide pour recevoir aide pour émotions - vie | 764 |
| SERB_A1C | Dernière fois allé à groupe d'entraide | 766 |
| SERB_A2A | Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale - vie | 767 |
| SERB_A2C | Dernière fois utilisé ligne d'aide téléphonique | 768 |
| SERB_A3 | Eu besoin d'aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue | 769 |
| SERB_A4A | Aide requise - info sur troubles émotionnels/traitements | 769 |
| SERB_A4B | Aide requise - info sur les services disponibles | 770 |
| SERB_A4C | Aide requise - médicaments | 770 |
| SERB_A4D | Aide requise - thérapie ou counselling | 771 |
| SERB_A4E | Aide requise - pour des problèmes financiers | 771 |
| SERB_A4F | Aide requise - pour problèmes relatifs aux logements | 772 |
| SERB_A4G | Aide requise - au niveau des relations interpersonnelles | 772 |
| SERB_A4H | Aide requise - pour statut d'emploi / situation au travail | 773 |
| SERB_A4I | Aide requise - autre | 773 |
| SERB_A5A | Raison sans aide - préférerait s'en occuper soi-même | 774 |
| SERB_A5B | Raison sans aide - pensait que rien ne pouvait aider | 774 |
| SERB_A5C | Raison sans aide - ne savait pas où aller chercher de l'aide | 775 |
| SERB_A5D | Raison sans aide - peur demander aide/ce que autres pensent | 775 |
| SERB_A5E | Raison sans aide - ne pouvait pas payer | 776 |
| SERB_A5F | Raison sans aide - prob comme transport/garde enfant/horaire | 776 |
| SERB_A5G | Raison sans aide - aide prof. non disponible dans la région | 777 |
| SERB_A5H | Raison sans aide - aide prof. non disponible à ce moment-là | 777 |
| SERB_A5I | Raison sans aide - temps d'attente trop long | 778 |
| SERB_A5J | Raison sans aide - ne s'en est pas occupé / indifférent | 778 |
| SERB_A5K | Raison sans aide - problème de langue | 779 |
| SERB_A5L | Raison sans aide - responsabilités personnelles/familiales | 779 |
| SERB_A5M | Raison sans aide - autre | 780 |
| SERBDRCT | Nombre de ressources utilisées pour santé mentale -vie - (D) | 783 |
| SERBDYCT | Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo | 783 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 40

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SERBFACP | Indicateur : barrières d'acceptation - santé mentale | 784 |
| SERBFACS | Indicateur : barrières d'accessibilité - santé mentale | 784 |
| SERBFAVA | Indicateur : barrières de disponibilité - santé mentale | 785 |
| SERBFHYR | Indicateur : hospitalisation pour santé mentale - 12 m. | 782 |
| SERBFLAP | Indicateur : consultations prof. pour santé mentale - vie | 782 |
| SERBFLHO | Indicateur : hospitalisation pour santé mentale - vie | 781 |
| SERBFLRU | Indicateur : Ressources utilisées pour santé mentale - vie | 782 |
| SERBFYRU | Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo | 783 |
| SERBG03 | Nbre de fois hosp. pour santé mentale/alcool/drogues - vie | 615 |
| SERBG05B | Âge - de l'unique hospitalisation datant plus d'un an - (G) | 617 |
| SERBG06 | Âge - lors de première admission pour santé mentale - (G) | 618 |
| SERBG08A | Âge - dernière fois hospitalisé - (G) | 620 |
| SERBG09 | Durée totale hôpital à cause de la santé ment. - 12 m. - (G) | 621 |
| SERBG13 | Âge - 1ère fois eu session de thérapie/counselling - (G) | 627 |
| SERBG20 | Âge - première fois consulté psychiatre - (G) | 628 |
| SERBG22 | Âge - dernière fois consulté psychiatre - (G) | 630 |
| SERBG23 | Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m. - (G) | 631 |
| SERBG24F | Consulté psychiatre - clinique externe - (G) | 633 |
| SERBG24I | Consulté psychiatre - autre clinique - (G) | 633 |
| SERBG24O | Consulté psychiatre - travail, école, autre - (G) | 635 |
| SERBG30 | Âge - première fois consulté médecin de famille - (G) | 644 |
| SERBG32 | Âge - dernière fois consulté médecin de famille - (G) | 646 |
| SERBG33 | Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m. - (G) | 647 |
| SERBG34F | Consulté médecin de famille - clinique externe - (G) | 649 |
| SERBG34I | Consulté médecin de famille - autre clinique - (G) | 649 |
| SERBG34O | Consulté méd. famille - travail, école, autre - (G) | 651 |
| SERBG42 | Âge - dernière fois consulté autre médecin - (G) | 663 |
| SERBG43 | Nombre de fois consulté autre médecin - 12 m. - (G) | 664 |
| SERBG44F | Consulté autre médecin - clinique externe - (G) | 666 |
| SERBG44I | Consulté autre médecin - autre clinique - (G) | 666 |
| SERBG44O | Consulté autre médecin - travail, école, autre - (G) | 668 |
| SERBG50 | Âge - première fois consulté psychologue - (G) | 677 |
| SERBG52 | Âge - dernière fois consulté psychologue - (G) | 679 |
| SERBG53 | Nombre de fois consulté psychologue - 12 m. - (G) | 680 |
| SERBG54F | Consulté psychologue - clinique externe - (G) | 682 |
| SERBG54I | Consulté psychologue - autre clinique - (G) | 682 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 41

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------|--|------|
| SERBG54O | Consulté psychologue - travail, école, autre - (G) | 684 |
| SERBG60 | Âge - première fois consulté infirmière - (G) | 693 |
| SERBG62 | Âge - dernière fois consulté infirmière - (G) | 695 |
| SERBG63 | Nombre de fois consulté cette infirmière - 12 m. - (G) | 696 |
| SERBG64F | Consulté infirmière - clinique externe - (G) | 698 |
| SERBG64I | Consulté infirmière - autre clinique - (G) | 698 |
| SERBG64O | Consulté infirmière - travail, école, autre - (G) | 700 |
| SERBG70 | Âge - première fois consulté travailleur social - (G) | 709 |
| SERBG72 | Âge - dernière fois consulté travailleur social - (G) | 711 |
| SERBG73 | Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m. - (G) | 712 |
| SERBG74F | Consulté trav. social - clinique externe - (G) | 714 |
| SERBG74I | Consulté trav. social - autre clinique - (G) | 714 |
| SERBG74O | Consulté trav. social - travail, école, autre - (G) | 716 |
| SERBG80 | Âge - première fois consulté conseiller religieux - (G) | 725 |
| SERBG82 | Âge - dernière fois consulté conseiller religieux - (G) | 727 |
| SERBG83 | Nombre de fois consulté conseiller religieux - 12 m. - (G) | 728 |
| SERBG84F | Consulté conseiller relig - clinique externe - (G) | 730 |
| SERBG84I | Consulté conseiller religieux - autre clinique - (G) | 730 |
| SERBG84O | Consulté conseiller religieux - travail, école, autre - (G) | 732 |
| SERBG92 | Âge - dernière fois consulté autre professionnel - (G) | 748 |
| SERBG93 | Nombre de fois consulté autre professionnel - 12 m. - (G) | 749 |
| SERBG94F | Consulté autre prof. - clinique externe - (G) | 751 |
| SERBG94I | Consulté autre prof. - autre clinique - (G) | 751 |
| SERBG94O | Consulté autre prof. - travail, école, autre - (G) | 753 |
| SERBGA0C | Nbre fois groupe soutien/discussion internet - 12 m. - (G) | 763 |
| SERBGA1B | Âge - première fois allé à groupe d'entraide - (G) | 765 |
| SERBGA1D | Nbre fois allé à réunion groupe d'entraide - 12 m. - (G) | 766 |
| SERBGA2B | Âge - première fois utilisé ligne d'aide téléphonique - (G) | 767 |
| SERBGA2D | Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m. - (G) | 768 |
| SERBGA7 | Montant dépensé services/produits santé ment. - 12 m. - (G) | 780 |
| SERBGHDY | Durée de temps hospitalisé pour santé ment. - vie - (D,G) | 781 |
| SOP : Phobie sociale | | |
| AGPBG13A | Période plus longue incapable quitter maison - (G) | 425 |
| SOPB_01A | Troublé - rencontrer nouvelles personnes | 346 |
| SOPB_01B | Troublé - parler à des personnes qui détiennent autorité | 347 |
| SOPB_01C | Troublé - prendre la parole à une réunion / en classe | 347 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 42

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SOPB_01D | Troublé - se rendre à des fêtes / rencontres sociales | 348 |
| SOPB_01E | Troublé - faire présentation / exposé | 348 |
| SOPB_01F | Troublé - passer un examen / entrevue pour un emploi | 349 |
| SOPB_01G | Troublé - travailler lorsque quelqu'un regarde | 349 |
| SOPB_01H | Troublé - entrer dans une pièce quand autres déjà présents | 350 |
| SOPB_01I | Troublé - parler à des personnes moins bien connues | 350 |
| SOPB_01J | Troublé - exprimer désaccord à personnes moins bien connues | 351 |
| SOPB_01K | Troublé - écrire, manger, boire lorsque quelqu'un regarde | 351 |
| SOPB_01L | Troublé - utiliser toilette publique | 352 |
| SOPB_01M | Troublé - sorties amoureuses | 352 |
| SOPB_01N | Troublé - autre situation sociale où objet de l'attention | 353 |
| SOPB_031 | A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale | 353 |
| SOPB_032 | A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale | 354 |
| SOPB_08A | Symptôme - a rougi ou tremblé | 359 |
| SOPB_08B | Symptôme - eu peur de perdre contrôle des intestins/vessie | 360 |
| SOPB_08C | Symptôme - eu peur de vomir | 360 |
| SOPB_09A | Symptôme - coeur battait fort / trop vite | 361 |
| SOPB_09B | Symptôme - eu des sueurs | 361 |
| SOPB_09C | Symptôme - eu des tremblements | 362 |
| SOPB_09D | Symptôme - eu mal à l'estomac | 362 |
| SOPB_09E | Symptôme - eu une bouche sèche | 363 |
| SOPB_09F | Symptôme - eu des bouffées de chaleur / frissons | 363 |
| SOPB_09G | Symptôme - se senti engourdi / eu des picotements | 364 |
| SOPB_09H | Symptôme - eu du mal à respirer normalement | 364 |
| SOPB_09I | Symptôme - eu l'impression d'étouffer | 365 |
| SOPB_09J | Symptôme - eu de la douleur / malaise à la poitrine | 365 |
| SOPB_09K | Symptôme - eu des vertiges / étourdissements | 366 |
| SOPB_09L | Symptôme - eu peur de mourir | 366 |
| SOPB_09M | Symptôme - eu peur de perdre contrôle/devenir fou/s'évanouir | 367 |
| SOPB_09N | Symptôme - eu impression ne pas « vraiment être là » | 367 |
| SOPB_09O | Symptôme - eu impression que choses n'étaient pas réelles | 368 |
| SOPB_10 | Symptôme - eu peur d'avoir attaque de panique | 368 |
| SOPB_10A | Symptôme - eu attaque de panique durant cette situation | 369 |
| SOPB_11 | Symptôme - eu peur d'être piégé / incapable d'échapper | 369 |
| SOPB_12 | Symptôme - eu peur de faire quelque chose d'embarrassant | 370 |
| SOPB_12A | Symptôme - eu peur d'embarrasser d'autres personnes | 370 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 43

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SOPB_13 | Symptôme - eu peur que gens pensent choses négatives | 371 |
| SOPB_14 | Symptôme - eu peur d'être centre d'attention | 371 |
| SOPB_14A | Type de raison associée à la peur sociale | 372 |
| SOPB_15 | Peur liée à la gêne à propos d'un problème physique/mental | 372 |
| SOPB_16 | Peur sociale troublé travail/social/relations | 373 |
| SOPB_17 | Senti bouleversé / inquiet / déçu à cause de peur sociale | 373 |
| SOPB_18 | Dernière fois eu peur / évité situation sociale | 374 |
| SOPB_19 | Intensité de peur si devait faire face situation aujourd'hui | 376 |
| SOPB_211 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. | 378 |
| SOPB_212 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. | 379 |
| SOPB_21A | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. | 377 |
| SOPB_21C | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. | 380 |
| SOPB_21D | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. | 381 |
| SOPB_23 | Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m. | 382 |
| SOPB_25 | Consulté médecin/autre prof. pour peur sociale | 382 |
| SOPB_36 | A reçu traitement qui a aidé pour peur sociale | 384 |
| SOPB_38 | Reçu traitement professionnel pour peur sociale - 12 m. | 387 |
| SOPB_39 | Hospitalisé pour nuit ou plus pour peur sociale - vie | 388 |
| SOPB_3B1 | Étape de vie quand toute première peur sociale | 357 |
| SOPB_6A1 | Étape de vie quand commencé à éviter situation sociale | 359 |
| SOPBD09 | Critère D, partie 2B - (D) | 391 |
| SOPBD215 | Critère E, partie 1A - (D) | 392 |
| SOPBDA | Critère A, partie 1 et 2 - (D) | 390 |
| SOPBDA1 | Critère A, partie 1 - (D) | 389 |
| SOPBDA2 | Critère A, partie 2 - (D) | 390 |
| SOPBDB | Critère B - (D) | 390 |
| SOPBDC | Critère C - (D) | 391 |
| SOPBDD | Critère D, partie 1 et 2 - (D) | 392 |
| SOPBDD1 | Critère D, partie 1 - (D) | 391 |
| SOPBDD2 | Critère D, partie 2 - (D) | 392 |
| SOPBDE | Critère E, partie 1 et 2 - (D) | 393 |
| SOPBDF | Critère F, partie 1 et 2 - (D) | 394 |
| SOPBDF1 | Critère F, partie 1 - (D) | 393 |
| SOPBDF2 | Critère F, partie 2 - (D) | 393 |
| SOPBDINT | Trouble occasionné par phobie sociale - moyenne - (D) | 398 |
| SOPBDPY | Algorithme phobie sociale - 12 mois - (D) | 398 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 44

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------------|--|------|
| SOPBDSP | Algorithme phobie sociale - vie (D) | 394 |
| SOPBDYA | Critère A - 12 mois - (D) | 397 |
| SOPBDYB | Critère B - 12 mois - (D) | 397 |
| SOPBDYC | Critère C - trouble - (D) | 397 |
| SOPBFINT | Indicateur : Trouble occasionné par phobie sociale | 399 |
| SOPBG03A | Âge - exactement première fois avait peur sociale - (G) | 355 |
| SOPBG03B | Âge - approximatif première fois avait peur sociale - (G) | 356 |
| SOPBG06A | Âge - première fois commencé à éviter situation soc - (G) | 358 |
| SOPBG18A | Âge - dernière fois eu peur / évité situation sociale - (G) | 375 |
| SOPBG25A | Âge - première fois consulté prof au sujet de peur soc - (G) | 383 |
| SOPBG36A | Âge - 1ère fois reçu traitem. qui a aidé pour peur soc - (G) | 385 |
| SOPBG36B | Nbre prof.consulté avant traitement qui a aidé pr peur - (G) | 386 |
| SOPBG36C | Nbre total de prof consulté au sujet de peur soc - vie - (G) | 387 |
| SOPBG391 | Nombre de proches parents avec peurs sociales intenses - (G) | 389 |
| SOPBG39A | Âge - 1ère fois hospitalisé nuit pour peur sociale - (G) | 388 |
| SOPBGON | Âge à l'apparation de la phobie sociale - (D,G) | 395 |
| SOPBGREC | Âge au plus récent épisode de phobie sociale - (D,G) | 396 |
| SPV : Valeurs spirituelles | | |
| SPVB_1 | Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie | 904 |
| SPVB_2 | Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie | 904 |
| SPVB_3 | Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes | 905 |
| SPVB_4 | Valeurs spirituelles - aident comprendre difficultés de vie | 905 |
| SPVB_6 | Fréquence - Assiste services religieux ou rencontres | 906 |
| SSM : Soutien social | | |
| SSMB_01 | Nombre de parents et d'amis proches | 880 |
| SSMB_02 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 880 |
| SSMB_03 | A quelqu'un pour l'écouter | 881 |
| SSMB_04 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 881 |
| SSMB_05 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 882 |
| SSMB_06 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 882 |
| SSMB_07 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 883 |
| SSMB_08 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 883 |
| SSMB_09 | A un confident | 884 |
| SSMB_10 | A quelqu'un pour serrer dans ses bras | 884 |
| SSMB_11 | A quelqu'un avec qui se détendre | 885 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 45

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------|--|------|
| SSMB_12 | A quelqu'un pour préparer les repas | 885 |
| SSMB_13 | A quelqu'un qui donne des conseils | 886 |
| SSMB_14 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 886 |
| SSMB_15 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 887 |
| SSMB_16 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 887 |
| SSMB_17 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 888 |
| SSMB_18 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 888 |
| SSMB_19 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 889 |
| SSMB_20 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 889 |
| SSMB_21A | A reçu soutien social tangible - 12 m. | 890 |
| SSMB_21B | Fréquence du soutien social tangible - 12 m. | 890 |
| SSMB_22A | A reçu soutien affectif - 12 m. | 891 |
| SSMB_22B | Fréquence du soutien affectif - 12 m. | 891 |
| SSMB_23A | A reçu soutien interactif social positif - 12 m. | 892 |
| SSMB_23B | Fréquence du soutien interactif social positif - 12 m. | 892 |
| SSMB_24A | A reçu soutien émotionnel ou d'information - 12 m. | 893 |
| SSMB_24B | Fréquence du soutien émotionnel ou d'information - 12 m. | 893 |
| SSMBDAFF | Affection - sous-échelle EIM - (D) | 894 |
| SSMBDEMO | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D) | 895 |
| SSMBDSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D) | 894 |
| SSMBDTNG | Support social tangible - sous-échelle EIM - (D) | 894 |
| STR : Stress | | |
| STRB_1 | Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue | 104 |
| STRB_2 | Auto-évaluation capacité faire face demandes quotidiennes | 104 |
| STRB_3 | Plus importante source des sentiments de stress | 105 |
| STRB_61 | Fréquence - coping - résolution de problème | 106 |
| STRB_610 | Fréquence - coping - se blâmer | 112 |
| STRB_611 | Fréquence - coping - espérer que la situation disparaisse | 112 |
| STRB_62 | Fréquence - coping - parler aux autres | 106 |
| STRB_63 | Fréquence - coping - éviter d'être avec des gens | 107 |
| STRB_64 | Fréquence - coping - dormir plus qu'à l'habitude | 107 |
| STRB_65A | Fréquence - coping - manger plus ou moins qu'à l'habitude | 108 |
| STRB_65B | Fréquence - coping - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude | 108 |
| STRB_65C | Fréquence - coping - consommer de l'alcool | 109 |
| STRB_65D | Fréquence - coping - consommer des drogues ou médicaments | 109 |
| STRB_66 | Fréquence - coping - jogging ou autres exercices | 110 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 46

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|------|
| STRB_67 | Fréquence - coping - prier ou chercher de l'aide spirituelle | 110 |
| STRB_68 | Fréquence - coping - faire quelque chose d'agréable | 111 |
| STRB_69 | Fréquence - coping - regarder le bon coté des choses | 111 |
| TWD : Incapacité au cours des deux dernières semaines | | |
| TWDB_1 | Gardé le lit - à cause de maladie ou de blessure | 599 |
| TWDB_2 | Gardé le lit - nombre de jours | 600 |
| TWDB_2A | Journée unique au lit à cause de la santé mentale | 601 |
| TWDB_2B | Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale | 601 |
| TWDB_3 | Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure | 602 |
| TWDB_4 | Activités limitées - nombre de jours | 603 |
| TWDB_4A | Journée unique où activité limitée est due à santé mentale | 604 |
| TWDB_4B | Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale | 605 |
| TWDB_5A | Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure | 606 |
| TWDB_6 | Nombre de jours où il a fallu plus d'effort | 607 |
| TWDB_6A | Journée unique où extra effort est dû à santé mentale | 608 |
| TWDB_6B | Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale | 609 |
| TWDBDDDY | Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D) | 610 |
| TWDBDMH | Nbre de jours d'incapacité à cause de la santé mentale - (D) | 614 |
| TWDBDMQ2 | Nombre de jours resté au lit dû à la santé mentale - (D) | 611 |
| TWDBDMQ4 | Nbre de jours d'activité limitée due à la santé mentale -(D) | 612 |
| TWDBDMQ6 | Nbre de jours d'extra effort dû à la santé mentale - (D) | 613 |
| WST : Stress au travail | | |
| WSTB_401 | Stress au trav. - devait acquérir de nouvelles connaissances | 911 |
| WSTB_402 | Stress au travail - niveau élevé de compétences | 911 |
| WSTB_403 | Stress au travail - liberté de décider | 912 |
| WSTB_404 | Stress au travail - tâches répétitives | 912 |
| WSTB_405 | Stress au travail - travail frénétique | 913 |
| WSTB_406 | Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles. | 913 |
| WSTB_407 | Stress au travail - bonne sécurité d'emploi | 914 |
| WSTB_408 | Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques | 914 |
| WSTB_409 | Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail | 915 |
| WSTB_410 | Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues | 915 |
| WSTB_411 | Stress au travail - surveillant facilitait le travail | 916 |
| WSTB_412 | Stress au travail - collègues facilitaient le travail | 916 |
| WSTB_413 | Stress au travail - satisfait de son travail | 917 |

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet
Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 47

SEPTEMBRE 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| WSTBDAUT | Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D) | 919 |
| WSTBDJIN | Stress au travail - insécurité d'emploi - (D) | 920 |
| WSTBDPHY | Stress au travail - effort physique - (D) | 921 |
| WSTBDPSY | Stress au travail - demandes psychologiques - (D) | 920 |
| WSTBDSKI | Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D) | 918 |
| WSTBDSOC | Stress au travail - soutien social - (D) | 922 |
| WTS : Poids | | |
| WTSB_M | Poids échan. - poids maître | 926 |